

# Communauté Germanophone

Enquête de santé 2018

---

F. BERETE • E. BRAEKMAN • R. CHARAFEDDINE • S. DEMAREST  
• S. DRIESKENS • L. GISLE • J. VAN DER HEYDEN

# Sciensano

Epidémiologie et santé publique - Mode de vie et maladies chroniques

HIS 2019

Novembre 2020 • Bruxelles • Belgique



## Auteurs (par ordre alphabétique)

**Finaba Berete**

**Elise Braekman**

**Rana Charafeddine**

**Stefaan Demarest**

**Sabine Drieskens**

**Lydia Gisle**

**Johan Van der Heyden**

Personne de contact : Sabine Drieskens • T+32 2 642 50 25 • [sabine.drieskens@sciensano.be](mailto:sabine.drieskens@sciensano.be)

Merci de citer cette publication comme suit :

F. Berete, E. Braekman, R. Charafeddine, S.Demarest, S.Drieskens, L. Gisle, J. Van der Heyden. Enquête de Santé 2018 : Communauté Germanophone. Bruxelles, Belgique. Sciensano.

## REMERCIEMENTS

### **Nous tenons à remercier les personnes suivantes:**

Ledia Jani et Tadek Krzywania de Sciensano pour la mise en page et le support administratif

Sandrine de Waleffe et l'équipe de Statbel pour l'organisation du travail de terrain ainsi que

L'équipe des enquêteurs pour la collecte des données

Et toutes les personnes qui ont volontairement participé à l'enquête

## COMMANDITAIRES

### **Cette enquête est réalisée à l'initiative du:**

Gouvernement fédéral, Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique

Gouvernement flamand, Ministère du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale (COCOM), Politique de la Santé

Communauté française, Ministère de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des chances

Gouvernement wallon, Ministère de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances

Communauté Germanophone, Ministère de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

# TABLE DES MATIÈRES

<b>SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE</b> .....	<b>7</b>
<b>1. Santé subjective</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Maladies chroniques</b> .....	<b>10</b>
2.1. Maladies chroniques en général .....	10
2.2. Maladies chroniques spécifiques .....	10
2.3. Multimorbidité .....	12
<b>3. Fragilité chez les personnes âgées</b> .....	<b>53</b>
<b>4. Limitations fonctionnelles de longue durée</b> .....	<b>56</b>
<b>5. Douleur physique</b> .....	<b>81</b>
<b>6. Qualité de vie liée à la santé</b> .....	<b>84</b>
6.1. Score de qualité de vie liée à la santé .....	84
6.2. Dimensions de qualité de vie .....	84
<b>7. Arrêt de travail pour cause de problèmes personnels de santé</b> .....	<b>99</b>
<b>STYLE DE VIE</b> .....	<b>104</b>
<b>1. Etat nutritionnel</b> .....	<b>104</b>
1.1. Surpoids .....	104
1.2. Obésité .....	104
<b>2. Activité physique</b> .....	<b>109</b>
2.1. Activité physique (non liée au travail) bénéfique pour la santé selon l'oMS .....	109
2.2. Activité physique (liée ou non au travail) bénéfique pour la santé selon l'oMS .....	109
2.3. Comportements sédentaires .....	110
2.4. Activités physiques de loisir .....	110
<b>3. Habitudes alimentaires</b> .....	<b>119</b>
3.1. Consommation de fruits .....	119
3.2. Consommation de légumes .....	119
3.3. Allergie ou intolérance alimentaire .....	119
<b>4. Consommation d'alcool</b> .....	<b>128</b>
4.1. Consommation d'alcool .....	128
4.2. Consommation quotidienne .....	128
4.3. Consommation excessive .....	128
4.4. Hyper-alcoolisation .....	129
4.5. Binge drinking .....	129
4.6. Consommation problématique .....	129
<b>5. L'Usage du tabac</b> .....	<b>142</b>
5.1. Usage du tabac .....	142
<b>6. Usage de la cigarette électronique</b> .....	<b>147</b>
<b>7. Consommation de drogues</b> .....	<b>154</b>
7.1. L'Usage récent de cannabis .....	154
7.2. L'usage problématique de cannabis .....	154
7.3. L'usage d'une drogue autre que le cannabis .....	154
<b>8. Les jeux de hasard et d'argent</b> .....	<b>164</b>
8.1. Nombre de joueurs actifs, en ligne, hors ligne .....	164
8.2. Joueurs hebdomadaires .....	165
8.3. Dépense 40 € / mois ou plus .....	165
8.4. Joueurs pathologiques .....	165
<b>CONNAISSANCES ET PRATIQUES PRÉVENTIVES</b> .....	<b>178</b>
<b>1. Connaissances et comportements face au VIH/SIDA</b> .....	<b>178</b>
<b>2. Littératie en santé</b> .....	<b>191</b>

<b>3. Dépistage du cancer colorectal</b> .....	<b>196</b>
3.1. Test de détection du sang fécal occulte .....	196
3.2. Colonoscopie .....	196
<b>4. Vaccination contre la grippe</b> .....	<b>201</b>
<b>5. Dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire et du diabète</b> .....	<b>204</b>
<b>6. Le bien-être subjectif</b> .....	<b>211</b>
6.1. Satisfaction de vie.....	211
6.2. Energie vitale .....	212
6.3. Bien-être / mal-être psychologique.....	212
<b>7. Les troubles de la santé mentale</b> .....	<b>213</b>
7.1. trouble anxieux.....	213
7.2. Troubles dépressifs.....	213
7.3. Troubles du comportement alimentaire .....	214
7.4. IDÉES SUICIDAIRES .....	214
7.5. Tentatives de suicide .....	215
<b>8. Consommation de médicaments psychotropes</b> .....	<b>215</b>
<b>9. Contacts avec un médecin généraliste</b> .....	<b>241</b>
<b>10. Consultations chez un médecin spécialiste</b> .....	<b>244</b>
<b>11. Consultations chez un dentiste</b> .....	<b>247</b>
<b>12. Contacts avec des services paramédicaux</b> .....	<b>252</b>
12.1. Consultation chez un/e kinéthérapeute .....	252
12.2. Consultation chez un/e diéticien(ne) .....	252
12.3. Consultation chez un/e psychologue, psychothérapeute ou psychiatre .....	252
<b>13. Contacts avec des prestataires de thérapies non-conventionnelles</b> .....	<b>260</b>
<b>14. Hospitalisation</b> .....	<b>263</b>
<b>15. Services à domicile et d'aide à domicile</b> .....	<b>268</b>
<b>16. Consommation de médicaments</b> .....	<b>271</b>
<b>17. Accessibilité financière aux soins de santé</b> .....	<b>276</b>
<b>SANTÉ ET SOCIÉTÉ</b> .....	<b>281</b>
<b>1. Environnement, logement et tabagisme passif</b> .....	<b>281</b>
1.1. Qualité du milieu de vie local .....	281
1.2. Qualité du logement.....	281
<b>2. Accidents</b> .....	<b>317</b>
<b>3. Violence</b> .....	<b>320</b>
<b>4. Santé sociale</b> .....	<b>323</b>
4.1. Insatisfaction vis-à-vis des contacts sociaux.....	323
4.2. Contacts sociaux peu fréquents (moins d'une fois par semaine) .....	323
4.3. Niveau du soutien social perçu.....	323
<b>5. Soins informels</b> .....	<b>331</b>
<b>LISTE DES TABLEAUX</b> .....	<b>334</b>

# SANTÉ ET QUALITÉ DE VIE

## 1. Santé subjective

En Communauté Germanophone en 2018, 17,3% des personnes âgées de 15 ans et plus déclarent être en mauvaise santé. Ce pourcentage est significativement moins élevé que les taux dans les provinces de Flandre occidentale (23,6%), Limbourg (24,9%), Bruxelles (21,6%), Brabant Wallon (23,7%), Hainaut (29,0%), Liège (24,5%) et Namur (26,2%).

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Par contre, ce pourcentage augmente significativement avec l'âge : on observe des taux de moins de 10% parmi les 44 ans et moins, un taux de 19,0% chez les 45-64 ans et 30,9% chez les 65 ans et plus.

Le pourcentage de personnes qui déclarent être en mauvaise santé varie en fonction du niveau d'éducation, avec un taux significativement moins élevé parmi les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (9,6%) par rapport aux personnes moins diplômées (taux entre 27,4% et 40,7%).

Tableau B 1. Pourcentage de la population (âgée de 15 ans ou plus) avec une mauvaise (très mauvaise à moyenne) santé subjective, Enquête de santé 2018 - Belgique

SH01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	21,2	(19,4-23,1)	19,5	(17,6-21,7)	3783
	<b>Femme</b>	24,7	(22,9-26,4)	22,2	(20,5-24,1)	4214
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	8,2	(5,1-11,4)	8,2	(5,6-12,0)	724
	<b>25 - 44</b>	14,8	(12,6-16,9)	14,8	(12,7-17,1)	2337
	<b>45 - 64</b>	27,2	(24,9-29,5)	27,2	(24,9-29,6)	2931
	<b>65 +</b>	35,1	(32,3-37,9)	34,9	(32,2-37,8)	2005
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	48,2	(42,2-54,2)	40,8	(34,6-47,2)	489
	<b>Secondaire inférieur</b>	35,3	(31,1-39,4)	29,5	(25,7-33,6)	996
	<b>Secondaire supérieur</b>	26,5	(23,9-29,1)	24,9	(22,2-27,9)	2401
	<b>Enseignement supérieur</b>	14,7	(13,1-16,3)	14,0	(12,5-15,6)	3957
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	21,1	(17,8-24,4)	18,9	(16,0-22,3)	864
	<b>Brabant Flamand</b>	19,1	(15,0-23,3)	17,0	(13,6-21,0)	519
	<b>Flandre Occidentale</b>	23,6	(20,1-27,1)	20,1	(17,0-23,6)	832
	<b>Flandre Orientale</b>	20,5	(16,8-24,3)	18,4	(15,0-22,4)	710
	<b>Limbourg</b>	24,9	(19,1-30,8)	21,7	(16,9-27,3)	293
	<b>Bruxelles</b>	21,6	(19,5-23,8)	21,1	(18,9-23,5)	1848
	<b>Brabant Wallon</b>	23,7	(17,1-30,2)	21,9	(16,6-28,3)	256
	<b>Hainaut</b>	29,0	(24,7-33,4)	27,7	(23,4-32,5)	801
	<b>Liège</b>	24,5	(19,2-29,7)	21,9	(16,9-28,0)	476
	<b>Luxembourg</b>	21,9	(16,2-27,7)	19,9	(15,3-25,6)	352
	<b>Namur</b>	26,2	(19,9-32,6)	23,7	(18,3-30,2)	321
	<b>Communauté Germanophone</b>	17,3	(14,1-20,5)	15,3	(12,6-18,5)	725
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	21,7	(20,3-23,1)	22,9	(21,4-24,4)	7949
	<b>2001</b>	23,8	(22,5-25,0)	22,8	(21,6-24,1)	9366
	<b>2004</b>	23,1	(21,8-24,3)	22,0	(20,7-23,3)	9423
	<b>2008</b>	23,2	(21,9-24,6)	21,7	(20,3-23,0)	7656
	<b>2013</b>	22,1	(20,7-23,4)	19,6	(18,3-21,0)	6555
	<b>2018</b>	23,0	(21,7-24,4)	20,3	(19,0-21,7)	7997

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 2. Pourcentage de la population (âgée de 15 ans ou plus) avec une mauvaise (très mauvaise à moyenne) santé subjective, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

SH01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	14,6	(10,6-18,6)	12,9	(9,6-17,3)	361
	Femme	19,9	(15,2-24,5)	17,2	(12,9-22,6)	364
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,1	(1,0-11,2)	6,1	(2,6-13,3)	83
	25 - 44	9,4	(4,3-14,5)	9,4	(5,4-15,8)	162
	45 - 64	19,0	(13,5-24,6)	18,9	(13,9-25,1)	278
	65 +	30,9	(23,6-38,2)	30,5	(23,8-38,1)	202
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	40,7	(27,5-54,0)	33,0	(21,5-47,0)	67
	Secondaire inférieur	27,4	(16,7-38,1)	21,9	(13,4-33,6)	124
	Secondaire supérieur	13,9	(8,6-19,1)	13,5	(8,9-20,0)	205
	Enseignement supérieur	9,6	(6,1-13,2)	9,6	(6,6-13,9)	280
ANNEE	1997	17,1	(11,3-22,9)	19,6	(13,9-26,9)	239
	2001	25,1	(17,8-32,4)	24,0	(18,1-31,0)	222
	2004	20,6	(14,0-27,2)	19,4	(13,3-27,4)	194
	2008	27,8	(20,1-35,4)	23,7	(17,6-31,1)	186
	2013	22,8	(14,9-30,7)	20,3	(13,6-29,1)	226
	2018	17,3	(14,1-20,5)	15,2	(12,3-18,6)	725

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 2. Maladies chroniques

L'enquête de santé permet d'examiner dans quelle mesure les maladies chroniques constituent un problème au niveau de la population générale âgée de 15 et plus. Une première question porte sur la présence d'une maladie ou d'une affection chronique. Dans un deuxième temps, les questions s'intéressent à différentes maladies chroniques spécifiques ou des maladies qui ont un caractère aigu mais qui entraînent des problèmes chroniques. Finalement nous évoquons aussi la problématique de la multimorbidité.

### 2.1. MALADIES CHRONIQUES EN GÉNÉRAL

Au sein de la Communauté Germanophone, 25,1% de la population âgée de 15 ans et plus rapporte souffrir d'une maladie ou d'une affection chronique. En contraste avec ce que l'on observe en Belgique dans son ensemble, le pourcentage de la population souffrant d'une maladie ou d'une affection chronique en Communauté Germanophone n'est pas significativement différent entre les hommes (26,1%) et les femmes (24,2%). Bien qu'en Communauté Germanophone ce pourcentage augmente avec l'âge, il n'y a pas de différence significative entre les personnes de 45-64 ans (32,3%) et les plus de 65 ans (34,3%). Le pourcentage de personnes atteintes d'une maladie ou d'une affection chronique augmente à mesure que le niveau d'éducation diminue, mais après ajustement pour l'âge et le sexe, les différences ne sont pas significatives. L'augmentation progressive et significative du pourcentage de personnes atteintes d'une maladie ou d'une affection chronique observée en Belgique entre 2001 et 2018 n'est pas observée au sein de la Communauté Germanophone.

### 2.2. MALADIES CHRONIQUES SPÉCIFIQUES

Le tableau 1 offre un aperçu des 10 maladies qui ont été le plus souvent rapportées par les hommes âgés de 15 ans et plus de la Communauté Germanophone, en comparaison avec la population masculine de Belgique dans son ensemble. Le Tableau 2 donne les résultats correspondants pour les femmes.

**Tableau 1. Pourcentage des hommes de 15 ans et plus qui ont souffert d'une affection chronique spécifique au cours de l'année qui a précédé l'enquête. Top 10 des problèmes les plus fréquents au sein de la Communauté Germanophone. Enquête de santé 2018 - Belgique**

	Communauté Germanophone	Belgique
Allergie	23,4%	17,0%
Arthrose	21,2%	14,3%
Problèmes au bas du dos	20,7%	23,2%
Hypertension artérielle	19,0%	17,2%
Hypercholestérolémie	16,4%	18,9%
Problème au niveau du cou	11,5%	10,6%
Arthrite	8,9%	5,9%
Diabète	6,1%	6,1%
Asthme	5,5%	5,0%
Cataracte	5,1%	2,8%

**Tableau 2. Pourcentage des femmes de 15 ans et plus qui ont souffert d'une affection chronique spécifique au cours de l'année qui a précédé l'enquête. Top 10 des problèmes les plus fréquents au sein de la Communauté. Enquête de santé 2018 - Belgique**

	Communauté Germanophone	Belgique
Allergie	29,1%	20,3%
Problèmes au bas du dos	25,8%	26,4%
Arthrose	25,5%	22,7%
Maux de tête sérieux – migraine	21,3%	13,4%
Problème au niveau du cou	19,7%	18,9%
Hypertension artérielle	18,7%	17,9%
Troubles thyroïdiens	15,8%	11,0%
Hypercholestérolémie	15,0%	17,1%
Dépression sérieuse	9,1%	9,1%
Ostéoporose	8,0%	5,7%

Des tableaux de base à la fin de ce chapitre présentent les résultats pour toutes les maladies figurant dans le top 10 chez les hommes et chez les femmes. C'est aussi le cas pour d'autres problèmes chroniques avec une prévalence supérieure à 4% en Communauté Germanophone (soit chez les hommes, soit chez les femmes) : fatigue chronique, incontinence urinaire, bronchite chronique ou emphysème, troubles digestifs depuis plus de 3 mois et troubles prostatiques.

Les maladies les plus fréquentes aussi bien chez les hommes que chez les femmes sont discutés plus en détail ci-dessous. Il s'agit des :

- Allergies
- Pathologies de l'appareil locomoteur : problèmes au bas du dos, arthrose, problème au niveau du cou
- Facteurs de risque cardiovasculaires : hypertension artérielle, hypercholestérolémie

### 2.2.1. Allergie

L'allergie est le problème chronique le plus fréquent en Communauté Germanophone : plus qu'une personne sur 4 de 15 ans et plus (26,4%) souffre de ce problème. Ce pourcentage est plus élevé que ce que l'on observe pour l'ensemble de la Belgique (18,7%).

L'allergie est aussi fréquente chez les hommes que chez les femmes et il n'y a pas de différences en termes de niveau d'éducation. Le pourcentage de personnes allergiques est le plus élevé parmi les 15-24 ans (37,5%) et le plus faible chez les plus de 65 ans (18,4%). C'est une différence significative. Au fil des années d'enquête, le pourcentage de personnes souffrant d'allergies est passé de 16,3% en 1997 à 26,4% en 2018.

### 2.2.2. Pathologies de l'appareil locomoteur

Au sein de la Communauté Germanophone, 26,0% des personnes âgées de 15 ans et plus déclarent avoir souffert des douleurs lombaires (au bas du dos) ; 21,8% souffrent d'arthrose et 19,2% souffrent de problèmes au niveau du cou. Ces pourcentages sont comparables à ceux au niveau de la population de Belgique dans son ensemble, où ils atteignent respectivement 26,4%, 22,7% et 18,9%.

Les différences dans le pourcentage de personnes souffrant de problèmes de l'appareil locomoteur entre les hommes et les femmes sont moins importantes en Communauté Germanophone que dans la population belge en général, à l'exception des problèmes de cou, qui sont également nettement plus fréquents chez les femmes (19,7%) que chez les hommes (11,5%). La prévalence de ces problèmes locomoteurs augmente avec l'âge. Toutefois, cette prévalence n'est pas beaucoup plus élevée chez les plus de 65 ans que dans la tranche d'âge 45-64 ans. Les personnes ayant un faible niveau d'éducation sont plus susceptibles d'avoir des problèmes locomoteurs que celles ayant un niveau d'éducation élevé. Cela se manifeste le plus clairement pour les problèmes de cou : 22,6% des personnes les moins éduquées souffrent de problèmes de cou, alors que ce chiffre n'est que de 9,9% pour les personnes les plus éduquées. Bien que les problèmes liés à l'appareil locomoteur soient très fréquents, ils n'augmentent pas dans le temps. Aucun de ces troubles mentionnés n'a augmenté de manière significative en 2018 par rapport à 2013.

### **2.2.3. Facteurs de risque cardiovasculaires**

18,8% des personnes âgées de 15 ans et plus au sein de la Communauté Germanophone rapporte des problèmes d'hypertension artérielle et 18,0% indique souffrir d'hypercholestérolémie. En comparaison avec les résultats obtenus au niveau provincial, le pourcentage de personnes souffrant d'hypertension artérielle et le pourcentage de personnes ayant des taux élevés de cholestérol dans le sang dans la Communauté Germanophone est du même ordre de grandeur que dans le reste de la Belgique.

On n'observe pas de différence significative entre les hommes et les femmes de la Communauté pour ces deux indicateurs, mais ils varient clairement en fonction de l'âge : l'hypertension artérielle concerne 42,5% des personnes âgées de 65 ans et plus, et l'hypercholestérolémie touche 32,6% des personnes âgées de 65 ans et plus. Des différences en fonction du niveau d'éducation ne sont pas observées. Le pourcentage de personnes souffrant d'hypertension artérielle a plus que doublé depuis 1997. Cette différence n'est pas significative après ajustement pour l'âge et le sexe, ce qui indique que l'augmentation observée est en relation avec le vieillissement de la population.

### **2.3. MULTIMORBIDITÉ**

La multimorbidité est définie ici comme le fait de souffrir d'au moins deux des six maladies chroniques suivantes : maladie cardiaque, maladie respiratoire chronique, diabète, cancer, arthrite et/ou arthrose, et hypertension.

En Communauté Germanophone, le taux de prévalence de la multimorbidité dans la population s'élève à 16,3%. C'est comparable avec ce que l'on observe en Belgique dans son ensemble (15,2%). Le pourcentage de personnes souffrant de multimorbidité est plus ou moins similaire pour les hommes (16,9%) et les femmes (15,8%), mais la prévalence de la multimorbidité augmente fortement avec l'âge : de négligeable chez les 15-24 ans jusqu'à 39,0% chez les 65 ans et plus.

Le pourcentage de personnes souffrant de multimorbidité est le plus élevé chez les personnes sans diplôme ou ayant au plus un diplôme d'études primaires (31,3%). Au fur et à mesure que le niveau d'instruction augmente, ce pourcentage ayant une multimorbidité diminue jusqu'à 9,7% pour les personnes les plus instruites. Après ajustement pour l'âge et le sexe, les différences sont réduites, mais restent significatives entre les personnes les plus instruites et les moins instruites.

Le pourcentage de personnes souffrant de multimorbidité est passé de 4,4% en 1997 à 16,3% en 2018. Cette augmentation s'explique en grande partie par le vieillissement de la population, car après ajustement pour l'âge et le sexe, cette augmentation devient moins importante mais reste quand même significative.

**Tableau B 3. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare souffrir d'une maladie ou d'une affection chronique, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA_SH02		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	27,2	(25,2-29,1)	26,1	(24,2-28,1)	3762
	<b>Femme</b>	31,3	(29,4-33,2)	29,5	(27,5-31,6)	4183
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	14,1	(10,4-17,8)	14,1	(10,8-18,3)	720
	<b>25 - 44</b>	21,3	(19,0-23,7)	21,3	(19,1-23,7)	2330
	<b>45 - 64</b>	33,3	(30,7-35,8)	33,3	(30,8-35,8)	2910
	<b>65 +</b>	41,7	(38,9-44,5)	41,5	(38,7-44,3)	1985
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	45,0	(39,1-50,9)	37,5	(31,5-43,8)	486
	<b>Secondaire inférieur</b>	32,8	(28,7-36,8)	27,4	(23,8-31,3)	989
	<b>Secondaire supérieur</b>	30,6	(27,9-33,2)	29,5	(26,8-32,3)	2387
	<b>Enseignement supérieur</b>	25,6	(23,6-27,6)	25,4	(23,4-27,5)	3931
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	28,3	(24,6-31,9)	26,7	(23,2-30,6)	859
	<b>Brabant Flamand</b>	26,1	(21,4-30,8)	24,4	(20,1-29,3)	515
	<b>Flandre Occidentale</b>	26,8	(23,3-30,4)	24,1	(21,0-27,5)	829
	<b>Flandre Orientale</b>	28,1	(23,7-32,5)	26,5	(22,3-31,2)	708
	<b>Limbourg</b>	28,1	(22,2-34,0)	25,6	(20,4-31,4)	291
	<b>Bruxelles</b>	28,7	(26,2-31,1)	28,8	(26,4-31,3)	1831
	<b>Brabant Wallon</b>	28,8	(22,4-35,2)	27,7	(21,7-34,6)	255
	<b>Hainaut</b>	33,9	(29,5-38,2)	33,3	(29,1-37,7)	795
	<b>Liège</b>	32,6	(26,8-38,3)	30,8	(25,3-36,9)	473
	<b>Luxembourg</b>	30,9	(25,0-36,8)	29,6	(24,1-35,8)	351
	<b>Namur</b>	34,4	(27,8-41,0)	32,7	(26,8-39,2)	321
	<b>Communauté Germanophone</b>	25,1	(21,4-28,9)	23,6	(20,2-27,4)	717
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	25,1	(23,9-26,3)	24,6	(23,3-25,9)	9069
	<b>2004</b>	25,7	(24,4-27,0)	25,0	(23,6-26,3)	8842
	<b>2008</b>	28,1	(26,6-29,6)	26,9	(25,5-28,3)	7386
	<b>2013</b>	28,6	(27,0-30,2)	26,6	(25,0-28,2)	6299
	<b>2018</b>	29,3	(27,9-30,8)	27,2	(25,8-28,7)	7945

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 4. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare souffrir d'une maladie ou d'une affection chronique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA_SH02		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	26,1	(20,9-31,4)	23,8	(19,2-29,2)	359
	<b>Femme</b>	24,2	(19,2-29,2)	21,2	(16,5-26,8)	358
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,2	(2,0-12,3)	7,1	(3,4-14,2)	83
	<b>25 - 44</b>	16,4	(10,3-22,5)	16,4	(11,2-23,3)	161
	<b>45 - 64</b>	32,3	(26,0-38,6)	32,3	(26,4-38,9)	276
	<b>65 +</b>	34,3	(26,6-42,1)	34,4	(27,2-42,5)	197
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	37,5	(21,2-53,8)	30,3	(17,3-47,4)	65
	<b>Secondaire inférieur</b>	28,6	(18,2-38,9)	22,1	(14,6-32,1)	122
	<b>Secondaire supérieur</b>	19,7	(13,5-25,9)	18,8	(13,4-25,8)	202
	<b>Enseignement supérieur</b>	22,0	(16,7-27,3)	21,2	(16,2-27,3)	279
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	26,7	(18,7-34,7)	26,1	(18,7-35,1)	212
	<b>2004</b>	27,3	(19,5-35,0)	26,2	(18,8-35,1)	188
	<b>2008</b>	32,7	(24,9-40,5)	30,4	(23,8-38,0)	181
	<b>2013</b>	29,5	(20,5-38,5)	27,6	(19,3-37,8)	218
	<b>2018</b>	25,1	(21,4-28,9)	23,6	(20,0-27,5)	717

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 5. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec allergie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

MA15_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	17,0	(15,4-18,6)	16,8	(15,3-18,4)	4674
	Femme	20,2	(18,7-21,8)	20,2	(18,7-21,8)	5078
GROUPE D'AGE	15 - 24	21,0	(17,5-24,4)	21,0	(17,7-24,6)	1059
	25 - 44	21,0	(18,9-23,1)	21,0	(19,0-23,2)	2916
	45 - 64	17,4	(15,7-19,1)	17,3	(15,7-19,1)	3395
	65 +	15,9	(13,9-17,8)	15,6	(13,8-17,7)	2382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	16,4	(12,2-20,6)	17,3	(13,3-22,2)	723
	Secondaire inférieur	14,9	(12,1-17,6)	15,2	(12,6-18,3)	1275
	Secondaire supérieur	18,7	(16,6-20,9)	18,6	(16,6-20,7)	2892
	Enseignement supérieur	19,9	(18,3-21,4)	19,4	(17,9-21,0)	4681
PROVINCE	Anvers	19,4	(16,5-22,4)	19,3	(16,5-22,5)	984
	Brabant Flamand	20,3	(16,4-24,1)	20,1	(16,5-24,1)	568
	Flandre Occidentale	17,2	(14,2-20,2)	17,3	(14,5-20,5)	933
	Flandre Orientale	19,5	(16,0-23,0)	19,4	(16,1-23,1)	791
	Limbourg	22,3	(16,9-27,7)	22,3	(17,4-28,1)	363
	Bruxelles	17,8	(15,9-19,7)	17,1	(15,3-19,1)	2513
	Brabant Wallon	19,8	(14,2-25,4)	19,6	(14,6-25,8)	313
	Hainaut	16,1	(13,3-18,9)	15,8	(13,2-18,8)	962
	Liège	22,4	(18,4-26,5)	22,1	(18,4-26,4)	600
	Luxembourg	13,6	(9,8-17,5)	13,4	(10,0-17,6)	488
	Namur	8,4	(4,7-12,1)	8,3	(5,3-12,7)	429
	Communauté Germanophone	26,4	(22,8-29,9)	26,3	(22,9-29,9)	808
ANNEE	1997	12,7	(11,7-13,8)	11,8	(10,8-12,8)	8542
	2001	13,9	(13,0-14,8)	13,3	(12,4-14,2)	10047
	2004	13,4	(12,4-14,4)	12,8	(11,9-13,7)	11130
	2008	13,3	(12,2-14,3)	12,7	(11,8-13,8)	9517
	2013	14,2	(13,1-15,3)	13,7	(12,7-14,8)	9112
	2018	18,7	(17,6-19,8)	18,3	(17,2-19,4)	9752

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 6. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec allergie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA15_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	23,4	(18,8-28,0)	22,7	(18,4-27,6)	400
	<b>Femme</b>	29,1	(24,0-34,1)	28,8	(24,0-34,0)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	37,5	(26,1-49,0)	37,5	(27,1-49,2)	96
	<b>25 - 44</b>	25,2	(18,4-31,9)	25,1	(19,0-32,3)	185
	<b>45 - 64</b>	27,8	(22,4-33,3)	27,8	(22,6-33,5)	296
	<b>65 +</b>	18,4	(13,0-23,8)	18,0	(13,2-24,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	22,4	(11,8-33,0)	26,2	(15,7-40,5)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	19,3	(11,7-27,0)	19,4	(12,5-28,8)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	25,3	(18,6-32,0)	23,7	(18,0-30,5)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	31,0	(24,9-37,2)	29,4	(23,5-35,9)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	16,3	(10,7-21,9)	14,2	(9,8-20,2)	246
	<b>2001</b>	15,1	(9,2-21,0)	14,1	(9,5-20,4)	238
	<b>2004</b>	21,1	(13,8-28,4)	20,0	(14,1-27,7)	235
	<b>2008</b>	13,6	(8,0-19,2)	13,0	(8,4-19,5)	208
	<b>2013</b>	19,5	(14,3-24,7)	18,5	(13,9-24,1)	264
	<b>2018</b>	26,4	(22,8-29,9)	25,3	(21,9-29,0)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 7. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au (bas du) dos au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA12_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	23,2	(21,5-24,9)	22,4	(20,7-24,2)	4671
	<b>Femme</b>	26,3	(24,6-28,0)	24,9	(23,1-26,7)	5076
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,7	(7,1-12,2)	9,7	(7,4-12,6)	1056
	<b>25 - 44</b>	19,6	(17,5-21,8)	19,6	(17,6-21,9)	2916
	<b>45 - 64</b>	30,2	(28,0-32,4)	30,2	(28,1-32,4)	3392
	<b>65 +</b>	33,3	(30,6-35,9)	33,1	(30,5-35,8)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	32,8	(27,3-38,2)	27,7	(22,6-33,3)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	27,3	(24,0-30,6)	23,6	(20,7-26,9)	1275
	<b>Secondaire supérieur</b>	27,8	(25,5-30,2)	27,2	(24,8-29,6)	2890
	<b>Enseignement supérieur</b>	21,0	(19,3-22,7)	20,7	(19,0-22,5)	4678
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	28,2	(24,9-31,4)	26,8	(23,5-30,3)	982
	<b>Brabant Flamand</b>	26,3	(21,3-31,2)	25,0	(20,6-29,9)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	24,6	(21,1-28,0)	22,5	(19,3-25,9)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	29,1	(25,3-32,8)	27,7	(24,2-31,6)	791
	<b>Limbourg</b>	28,1	(22,6-33,5)	26,2	(21,3-31,8)	362
	<b>Bruxelles</b>	17,5	(15,8-19,2)	17,5	(15,8-19,3)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	19,1	(13,8-24,4)	18,2	(13,8-23,6)	313
	<b>Hainaut</b>	20,8	(17,4-24,2)	20,0	(16,8-23,6)	962
	<b>Liège</b>	29,3	(24,6-33,9)	28,4	(23,8-33,4)	600
	<b>Luxembourg</b>	24,6	(19,3-30,0)	23,9	(19,0-29,6)	486
	<b>Namur</b>	13,4	(9,2-17,5)	12,3	(9,0-16,6)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	23,3	(19,8-26,8)	21,8	(18,7-25,4)	808
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	20,5	(19,3-21,7)	19,6	(18,5-20,8)	9408
	<b>2013</b>	20,8	(19,6-22,0)	19,6	(18,4-20,9)	9110
	<b>2018</b>	24,8	(23,6-26,0)	23,4	(22,2-24,7)	9747

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 8. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au (bas du) dos au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA12_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	20,7	(16,1-25,2)	18,9	(14,9-23,6)	400
	<b>Femme</b>	25,8	(20,8-30,8)	23,6	(18,6-29,4)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,1	(2,9-15,3)	9,0	(4,6-17,1)	96
	<b>25 - 44</b>	14,6	(8,5-20,8)	14,6	(9,5-21,7)	185
	<b>45 - 64</b>	30,5	(24,2-36,8)	30,5	(24,5-37,1)	296
	<b>65 +</b>	31,1	(24,7-37,5)	30,7	(24,8-37,3)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	26,0	(16,2-35,8)	21,9	(13,9-32,9)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	42,8	(32,7-52,8)	37,1	(27,1-48,3)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	19,9	(13,4-26,3)	19,0	(13,8-25,7)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	15,9	(11,3-20,5)	15,5	(11,2-21,0)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	21,6	(14,2-29,0)	19,0	(13,2-26,5)	207
	<b>2013</b>	26,2	(19,4-33,0)	24,6	(18,7-31,7)	264
	<b>2018</b>	23,3	(19,8-26,8)	21,9	(18,6-25,6)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 9. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrose (dégénérescence des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

MA11_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	14,2	(12,8-15,6)	9,1	(7,7-10,6)	4671
	<b>Femme</b>	22,7	(21,1-24,2)	14,8	(12,8-17,0)	5075
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,0	(0,2-1,9)	1,0	(0,4-2,3)	1057
	<b>25 - 44</b>	5,0	(3,8-6,2)	4,9	(3,8-6,2)	2916
	<b>45 - 64</b>	23,3	(21,2-25,4)	23,0	(20,9-25,3)	3391
	<b>65 +</b>	41,1	(38,4-43,7)	40,1	(37,5-42,8)	2382
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	32,8	(27,8-37,8)	14,4	(11,1-18,6)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	26,3	(23,0-29,6)	13,0	(10,5-15,9)	1275
	<b>Secondaire supérieur</b>	19,2	(17,2-21,1)	13,1	(11,1-15,4)	2889
	<b>Enseignement supérieur</b>	14,0	(12,5-15,6)	10,1	(8,7-11,8)	4678
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	16,7	(13,9-19,6)	10,0	(7,8-12,8)	981
	<b>Brabant Flamand</b>	16,7	(13,0-20,4)	10,0	(7,6-13,0)	567
	<b>Flandre Occidentale</b>	19,5	(16,2-22,8)	10,7	(8,5-13,4)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	18,9	(15,7-22,1)	11,8	(9,4-14,7)	790
	<b>Limbourg</b>	21,9	(16,6-27,2)	13,2	(9,7-17,7)	362
	<b>Bruxelles</b>	12,3	(10,9-13,8)	8,8	(7,5-10,3)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	16,2	(11,3-21,1)	10,0	(7,1-13,9)	313
	<b>Hainaut</b>	19,8	(16,3-23,2)	13,3	(10,4-16,9)	962
	<b>Liège</b>	25,8	(21,2-30,4)	18,2	(14,5-22,7)	600
	<b>Luxembourg</b>	19,3	(14,5-24,1)	12,8	(9,6-17,0)	488
	<b>Namur</b>	13,8	(10,2-17,5)	7,7	(5,5-10,7)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	23,4	(20,1-26,8)	15,1	(12,3-18,5)	808
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	12,1	(11,0-13,2)	9,4	(8,3-10,5)	8542
	<b>2001</b>	14,4	(13,4-15,4)	9,5	(8,7-10,3)	10059
	<b>2004</b>	12,6	(11,8-13,5)	8,0	(7,3-8,8)	11097
	<b>2008</b>	15,9	(14,8-17,0)	10,5	(9,6-11,4)	9430
	<b>2013</b>	16,7	(15,6-17,8)	10,6	(9,7-11,6)	9107
	<b>2018</b>	18,5	(17,4-19,6)	11,8	(10,8-12,9)	9746

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 10. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrose (dégénérescence des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA11_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	21,2	(16,7-25,8)	14,0	(9,9-19,4)	400
	<b>Femme</b>	25,5	(20,8-30,2)	16,9	(12,0-23,2)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	2,9	(0,0-7,1)	2,9	(0,7-11,3)	96
	<b>25 - 44</b>	4,6	(0,9-8,3)	4,5	(2,0-10,0)	185
	<b>45 - 64</b>	33,6	(27,5-39,6)	33,6	(27,8-39,9)	296
	<b>65 +</b>	42,7	(35,0-50,4)	42,4	(35,0-50,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	35,9	(22,7-49,0)	18,6	(10,9-29,7)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	35,9	(25,9-45,9)	19,8	(12,8-29,3)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	19,9	(14,1-25,8)	15,0	(10,5-21,1)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	17,3	(12,5-22,1)	13,8	(8,9-20,9)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	9,9	(5,9-13,8)	7,3	(4,4-11,8)	246
	<b>2001</b>	15,4	(9,0-21,9)	9,3	(5,8-14,6)	238
	<b>2004</b>	14,3	(8,3-20,2)	7,5	(4,5-12,4)	233
	<b>2008</b>	21,2	(14,0-28,3)	10,4	(6,9-15,5)	202
	<b>2013</b>	26,8	(19,6-34,1)	16,4	(11,4-23,0)	264
	<b>2018</b>	23,4	(20,1-26,8)	13,8	(10,4-18,0)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 11. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au niveau de la nuque ou du cou au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA13_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,6	(9,4-11,9)	9,9	(8,7-11,3)	4670
	<b>Femme</b>	18,9	(17,3-20,4)	17,6	(16,0-19,4)	5078
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,4	(3,1-7,7)	5,2	(3,4-8,0)	1056
	<b>25 - 44</b>	11,1	(9,3-12,9)	10,8	(9,1-12,7)	2916
	<b>45 - 64</b>	19,5	(17,5-21,4)	19,0	(17,2-21,0)	3394
	<b>65 +</b>	19,1	(16,9-21,3)	18,0	(15,9-20,3)	2382
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	16,7	(12,7-20,6)	13,3	(10,1-17,2)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	17,3	(14,5-20,1)	14,2	(11,8-17,0)	1276
	<b>Secondaire supérieur</b>	15,4	(13,6-17,2)	14,3	(12,6-16,3)	2890
	<b>Enseignement supérieur</b>	13,4	(11,8-15,0)	12,5	(10,9-14,3)	4679
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	15,1	(12,4-17,8)	13,6	(11,2-16,3)	982
	<b>Brabant Flamand</b>	15,6	(11,3-19,9)	14,0	(10,4-18,6)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	17,2	(14,0-20,4)	15,1	(12,3-18,4)	932
	<b>Flandre Orientale</b>	15,7	(12,4-18,9)	14,1	(11,2-17,6)	791
	<b>Limbourg</b>	17,9	(13,4-22,4)	15,9	(12,2-20,6)	363
	<b>Bruxelles</b>	10,2	(8,9-11,5)	9,6	(8,4-11,0)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	12,8	(8,0-17,6)	11,7	(7,9-16,8)	313
	<b>Hainaut</b>	13,0	(10,3-15,7)	11,8	(9,5-14,6)	962
	<b>Liège</b>	17,9	(14,0-21,7)	16,3	(12,7-20,6)	600
	<b>Luxembourg</b>	18,1	(13,1-23,1)	16,9	(12,6-22,3)	487
	<b>Namur</b>	8,0	(5,2-10,8)	7,0	(4,9-9,9)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	15,7	(12,8-18,6)	13,9	(11,5-16,8)	808
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	11,5	(10,6-12,3)	10,1	(9,3-11,0)	9496
	<b>2013</b>	11,8	(10,8-12,7)	10,3	(9,4-11,2)	9111
	<b>2018</b>	14,9	(13,8-15,9)	13,1	(12,0-14,2)	9748

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 12. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au niveau de la nuque ou du cou au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA13_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	11,5	(8,0-15,0)	10,2	(7,4-14,0)	400
	<b>Femme</b>	19,7	(15,4-23,9)	17,8	(13,8-22,8)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,4	(0,1-8,7)	4,2	(1,6-10,8)	96
	<b>25 - 44</b>	12,3	(7,0-17,6)	11,9	(7,7-17,9)	185
	<b>45 - 64</b>	21,2	(15,9-26,4)	20,7	(15,9-26,6)	296
	<b>65 +</b>	18,1	(12,6-23,6)	17,1	(12,4-23,2)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	22,6	(12,9-32,2)	20,7	(12,0-33,4)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	19,9	(11,6-28,3)	16,1	(10,1-24,7)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,3	(11,4-23,1)	15,3	(10,7-21,4)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,9	(6,2-13,6)	8,7	(5,7-13,1)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	16,2	(9,9-22,5)	14,0	(9,1-20,9)	207
	<b>2013</b>	16,6	(11,7-21,5)	15,1	(10,9-20,5)	264
	<b>2018</b>	15,7	(12,8-18,6)	14,4	(11,8-17,4)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 13. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrite rhumatoïde (inflammation des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique

MA10_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,9	(5,0-6,8)	4,7	(3,9-5,6)	4668
	Femme	9,5	(8,5-10,5)	7,2	(6,1-8,4)	5075
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,6	(0,5-2,8)	1,6	(0,8-3,2)	1057
	25 - 44	2,9	(2,0-3,7)	2,8	(2,1-3,8)	2916
	45 - 64	9,4	(8,1-10,7)	9,3	(8,0-10,7)	3388
	65 +	15,9	(13,9-17,9)	15,3	(13,5-17,3)	2382
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	13,7	(10,2-17,2)	7,4	(5,4-10,0)	722
	Secondaire inférieur	11,5	(9,2-13,8)	7,0	(5,3-9,1)	1275
	Secondaire supérieur	8,0	(6,7-9,3)	6,4	(5,2-7,8)	2888
	Enseignement supérieur	5,7	(4,8-6,6)	4,9	(4,0-5,8)	4677
PROVINCE	Anvers	9,4	(7,3-11,4)	7,1	(5,3-9,3)	981
	Brabant Flamand	9,0	(6,4-11,7)	6,8	(5,0-9,2)	568
	Flandre Occidentale	10,4	(8,0-12,8)	7,2	(5,6-9,3)	932
	Flandre Orientale	9,4	(7,0-11,7)	7,1	(5,4-9,3)	791
	Limbourg	9,8	(6,3-13,3)	7,0	(4,7-10,5)	363
	Bruxelles	4,3	(3,4-5,2)	3,7	(3,0-4,6)	2512
	Brabant Wallon	4,3	(2,1-6,5)	3,2	(1,9-5,4)	313
	Hainaut	7,4	(5,6-9,2)	5,7	(4,4-7,5)	962
	Liège	3,5	(2,0-5,1)	2,6	(1,6-4,0)	600
	Luxembourg	8,0	(4,8-11,2)	6,2	(4,1-9,5)	484
	Namur	5,8	(3,3-8,2)	4,1	(2,6-6,5)	429
	Communauté Germanophone	8,2	(6,2-10,2)	6,0	(4,6-7,9)	808
ANNEE	1997	6,6	(5,7-7,4)	5,7	(4,9-6,5)	8538
	2001	7,8	(7,0-8,5)	5,7	(5,2-6,4)	10070
	2004	7,1	(6,4-7,8)	5,2	(4,6-5,8)	11091
	2008	7,3	(6,6-8,0)	5,2	(4,7-5,8)	9527
	2013	8,1	(7,3-8,9)	5,7	(5,0-6,4)	9111
	2018	7,8	(7,0-8,5)	5,3	(4,7-5,9)	9743

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 14. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrite rhumatoïde (inflammation des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

MA10_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	8,9	(5,7-12,2)	4,9	(2,3-10,0)	400
	Femme	7,5	(5,1-10,0)	3,8	(2,0-7,2)	408
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,6	(0,0-1,7)	0,6	(0,1-4,1)	96
	25 - 44	1,2	(0,0-3,6)	1,2	(0,2-8,0)	185
	45 - 64	10,9	(7,0-14,8)	10,8	(7,5-15,3)	296
	65 +	17,1	(12,1-22,2)	17,2	(12,7-22,9)	231
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	15,5	(7,8-23,1)	6,0	(2,5-13,7)	79
	Secondaire inférieur	10,7	(5,1-16,4)	4,3	(1,9-9,5)	140
	Secondaire supérieur	8,3	(4,5-12,0)	5,3	(2,7-10,1)	218
	Enseignement supérieur	5,2	(2,3-8,2)	3,5	(1,4-8,3)	318
ANNEE	1997	2,1	(0,8-3,5)	2,0	(1,0-3,7)	246
	2001	6,4	(2,5-10,4)	4,7	(2,6-8,4)	238
	2004	7,4	(3,0-11,7)	5,2	(2,2-11,9)	235
	2008	8,9	(4,5-13,3)	5,3	(3,0-9,0)	209
	2013	8,2	(3,9-12,4)	5,5	(3,1-9,5)	264
	2018	8,2	(6,2-10,2)	5,6	(3,8-8,0)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 15. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec tension artérielle élevée (hypertension) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

MA06_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	17,2	(15,8-18,6)	12,1	(10,6-13,7)	4671
	<b>Femme</b>	17,9	(16,5-19,3)	11,6	(10,3-13,0)	5075
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,0	(0,4-1,7)	1,0	(0,5-2,0)	1057
	<b>25 - 44</b>	5,8	(4,6-6,9)	5,8	(4,7-7,0)	2915
	<b>45 - 64</b>	22,0	(20,0-23,9)	22,0	(20,1-24,0)	3392
	<b>65 +</b>	37,6	(35,0-40,2)	37,6	(35,1-40,3)	2382
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	28,6	(23,9-33,3)	13,3	(10,6-16,4)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	25,2	(22,0-28,4)	13,6	(11,4-16,1)	1274
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,4	(15,6-19,2)	12,3	(10,7-14,2)	2890
	<b>Enseignement supérieur</b>	13,9	(12,5-15,3)	10,7	(9,4-12,1)	4678
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	17,6	(14,9-20,3)	11,6	(9,5-13,9)	982
	<b>Brabant Flamand</b>	16,6	(13,2-20,0)	10,8	(8,4-13,9)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	19,1	(16,0-22,1)	11,4	(9,4-13,9)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	17,8	(14,5-21,1)	11,8	(9,5-14,6)	790
	<b>Limbourg</b>	19,1	(14,4-23,8)	12,0	(8,9-16,1)	363
	<b>Bruxelles</b>	13,2	(11,8-14,6)	10,3	(9,0-11,8)	2512
	<b>Brabant Wallon</b>	18,9	(13,5-24,4)	13,1	(9,2-18,2)	313
	<b>Hainaut</b>	19,1	(16,2-22,1)	13,8	(11,5-16,5)	962
	<b>Liège</b>	19,5	(15,7-23,3)	13,7	(10,8-17,3)	600
	<b>Luxembourg</b>	14,6	(10,6-18,7)	9,9	(7,2-13,6)	486
	<b>Namur</b>	13,2	(9,4-17,1)	8,2	(5,9-11,3)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	18,8	(15,6-22,1)	12,4	(10,0-15,1)	808
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	10,9	(10,0-11,9)	9,3	(8,4-10,3)	8543
	<b>2001</b>	14,1	(13,0-15,1)	10,5	(9,7-11,5)	10055
	<b>2004</b>	15,0	(14,0-15,9)	11,2	(10,4-12,2)	11123
	<b>2008</b>	15,7	(14,7-16,8)	11,6	(10,7-12,5)	9524
	<b>2013</b>	16,5	(15,3-17,6)	11,9	(10,9-12,9)	9112
	<b>2018</b>	17,6	(16,5-18,6)	12,5	(11,6-13,4)	9746

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 16. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec tension artérielle élevée (hypertension) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA06_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	19,0	(14,6-23,3)	12,9	(9,0-18,1)	400
	<b>Femme</b>	18,7	(14,4-23,1)	11,7	(8,3-16,4)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,3	(0,0-3,3)	1,3	(0,3-5,8)	96
	<b>25 - 44</b>	5,5	(1,9-9,0)	5,5	(2,9-10,2)	185
	<b>45 - 64</b>	21,0	(15,3-26,7)	21,0	(15,9-27,3)	296
	<b>65 +</b>	42,4	(35,2-49,5)	42,5	(35,6-49,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	29,9	(18,6-41,2)	10,9	(6,3-18,2)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	21,4	(12,9-29,9)	9,9	(5,4-17,6)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	14,9	(8,7-21,0)	11,6	(7,2-18,3)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	14,6	(10,2-18,9)	12,8	(8,7-18,3)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	8,3	(4,5-12,2)	8,2	(4,8-13,6)	246
	<b>2001</b>	14,0	(8,2-19,8)	11,1	(7,2-16,6)	238
	<b>2004</b>	18,5	(12,6-24,5)	14,3	(9,6-20,7)	234
	<b>2008</b>	15,1	(9,7-20,4)	9,7	(6,4-14,4)	208
	<b>2013</b>	19,5	(13,3-25,7)	14,5	(9,9-20,8)	264
	<b>2018</b>	18,8	(15,6-22,1)	14,0	(11,2-17,4)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 17. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec hypercholestérolémie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

MA07_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	18,9	(17,4-20,5)	14,2	(12,4-16,2)	4648
	Femme	17,1	(15,8-18,5)	11,6	(10,1-13,2)	5070
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,3	(0,3-2,4)	1,3	(0,6-2,9)	1051
	25 - 44	6,8	(5,5-8,1)	6,7	(5,6-8,1)	2906
	45 - 64	22,5	(20,6-24,5)	22,4	(20,5-24,5)	3381
	65 +	37,1	(34,4-39,8)	37,4	(34,7-40,1)	2380
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	28,1	(23,4-32,9)	14,0	(11,0-17,7)	720
	Secondaire inférieur	25,4	(22,2-28,6)	14,6	(12,2-17,4)	1272
	Secondaire supérieur	17,6	(15,6-19,6)	13,0	(11,1-15,3)	2881
	Enseignement supérieur	14,7	(13,2-16,2)	11,8	(10,3-13,6)	4665
PROVINCE	Anvers	17,6	(14,7-20,5)	12,1	(9,9-14,8)	981
	Brabant Flamand	17,6	(13,3-21,8)	12,3	(9,5-15,7)	568
	Flandre Occidentale	22,5	(19,1-25,9)	14,9	(12,3-18,0)	929
	Flandre Orientale	17,7	(14,7-20,8)	12,4	(10,0-15,3)	786
	Limbourg	20,8	(15,9-25,7)	14,1	(10,3-19,0)	361
	Bruxelles	13,2	(11,7-14,6)	10,7	(9,2-12,4)	2501
	Brabant Wallon	15,1	(10,2-19,9)	10,5	(7,2-14,9)	312
	Hainaut	19,3	(16,1-22,5)	14,6	(11,9-17,9)	962
	Liège	18,8	(15,1-22,5)	13,8	(11,0-17,3)	600
	Luxembourg	16,9	(12,1-21,6)	12,3	(9,0-16,5)	481
	Namur	13,6	(9,8-17,4)	9,0	(6,5-12,3)	429
	Communauté Germanophone	15,7	(12,7-18,7)	10,5	(8,3-13,1)	808
ANNEE	2013	16,8	(15,6-17,9)	12,2	(11,0-13,4)	9097
	2018	18,0	(16,9-19,1)	12,9	(11,8-14,1)	9718

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 18. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec hypercholestérolémie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA07_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,4	(12,4-20,4)	10,0	(6,7-14,6)	400
	<b>Femme</b>	15,0	(11,3-18,8)	8,5	(5,6-12,6)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,6	(0,0-1,7)	0,6	(0,1-4,1)	96
	<b>25 - 44</b>	4,2	(1,0-7,4)	4,2	(2,0-8,8)	185
	<b>45 - 64</b>	19,7	(14,1-25,3)	19,7	(14,7-25,8)	296
	<b>65 +</b>	32,5	(25,3-39,6)	32,6	(25,9-40,2)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	17,8	(9,1-26,6)	6,2	(3,0-12,3)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	24,7	(16,5-32,9)	11,6	(6,9-18,8)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	11,5	(6,2-16,8)	7,9	(4,5-13,5)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	12,6	(8,5-16,8)	9,7	(6,2-14,9)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	15,3	(9,2-21,4)	10,2	(6,2-16,4)	263
	<b>2018</b>	15,7	(12,7-18,7)	10,6	(7,9-14,1)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 19. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec dépression sérieuse au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA21_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,5	(4,6-6,5)	5,3	(4,4-6,3)	4673
	<b>Femme</b>	9,1	(8,0-10,2)	8,7	(7,7-9,8)	5077
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	3,0	(1,7-4,3)	2,9	(1,9-4,5)	1059
	<b>25 - 44</b>	7,4	(6,0-8,9)	7,3	(5,9-8,9)	2916
	<b>45 - 64</b>	9,2	(8,0-10,5)	9,0	(7,8-10,4)	3393
	<b>65 +</b>	7,2	(5,8-8,6)	6,8	(5,6-8,3)	2382
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	11,6	(8,2-15,0)	11,6	(8,5-15,5)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	11,3	(8,9-13,6)	10,6	(8,4-13,2)	1276
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,5	(6,1-8,8)	7,0	(5,7-8,5)	2891
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,5	(4,5-6,4)	4,9	(4,1-5,8)	4679
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	6,2	(4,4-8,1)	5,7	(4,2-7,7)	984
	<b>Brabant Flamand</b>	5,5	(2,6-8,4)	5,0	(3,0-8,4)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	8,0	(5,9-10,2)	7,4	(5,6-9,7)	932
	<b>Flandre Orientale</b>	6,2	(4,2-8,3)	5,7	(4,1-8,0)	791
	<b>Limbourg</b>	8,4	(5,6-11,3)	7,7	(5,5-10,8)	363
	<b>Bruxelles</b>	7,7	(6,6-8,9)	7,2	(6,2-8,5)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	7,5	(3,1-11,9)	7,1	(3,9-12,5)	313
	<b>Hainaut</b>	8,9	(6,8-11,1)	8,3	(6,4-10,6)	962
	<b>Liège</b>	8,8	(6,0-11,7)	8,2	(5,7-11,5)	600
	<b>Luxembourg</b>	6,9	(4,2-9,6)	6,5	(4,4-9,5)	487
	<b>Namur</b>	6,9	(4,0-9,9)	6,4	(4,2-9,7)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	7,1	(4,9-9,2)	6,5	(4,7-8,7)	808
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	6,5	(5,7-7,2)	6,2	(5,5-7,0)	8545
	<b>2001</b>	6,3	(5,6-6,9)	5,8	(5,3-6,5)	10068
	<b>2004</b>	5,9	(5,2-6,6)	5,5	(4,9-6,2)	11114
	<b>2008</b>	6,0	(5,3-6,7)	5,6	(5,0-6,3)	9527
	<b>2013</b>	6,7	(5,9-7,4)	6,2	(5,5-6,9)	9112
	<b>2018</b>	7,4	(6,6-8,1)	6,8	(6,1-7,6)	9750

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 20. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec dépression sérieuse au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

MA21_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,9	(2,5-7,2)	4,8	(3,0-7,6)	400
	<b>Femme</b>	9,1	(5,7-12,5)	8,9	(6,0-13,1)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,3	(0,0-8,7)	4,1	(1,6-10,5)	96
	<b>25 - 44</b>	7,5	(2,6-12,4)	7,2	(3,7-13,6)	185
	<b>45 - 64</b>	7,8	(4,3-11,3)	7,5	(4,7-11,8)	296
	<b>65 +</b>	7,1	(3,6-10,6)	6,6	(4,0-10,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,5	(1,6-19,5)	10,7	(4,1-25,4)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,4	(3,9-14,9)	8,9	(4,5-16,8)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,8	(3,5-12,0)	6,9	(3,9-11,8)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,2	(1,3-7,1)	3,7	(1,9-7,3)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	4,6	(1,6-7,5)	4,3	(2,3-7,9)	246
	<b>2001</b>	4,0	(1,0-7,0)	3,5	(1,7-7,0)	238
	<b>2004</b>	5,8	(2,2-9,4)	4,7	(2,6-8,4)	235
	<b>2008</b>	2,9	(0,6-5,2)	2,1	(0,9-4,7)	208
	<b>2013</b>	7,6	(3,7-11,6)	6,1	(3,4-10,8)	264
	<b>2018</b>	7,1	(4,9-9,2)	5,7	(3,9-8,2)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 21. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec maux de tête grave (p,e, migraine) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

MA19_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,9	(5,9-7,9)	6,3	(5,4-7,4)	4674
	<b>Femme</b>	13,4	(12,1-14,8)	12,8	(11,6-14,2)	5077
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,0	(7,3-12,7)	9,6	(7,2-12,7)	1059
	<b>25 - 44</b>	13,5	(11,7-15,3)	13,0	(11,4-14,8)	2915
	<b>45 - 64</b>	10,8	(9,4-12,2)	10,3	(9,0-11,8)	3394
	<b>65 +</b>	5,0	(3,8-6,2)	4,5	(3,5-5,8)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,4	(7,4-13,5)	12,5	(9,2-16,8)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,3	(6,8-11,8)	9,5	(7,2-12,4)	1275
	<b>Secondaire supérieur</b>	11,8	(10,1-13,5)	10,5	(8,9-12,2)	2892
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,4	(8,3-10,6)	7,7	(6,7-8,9)	4680
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	11,4	(9,0-13,8)	10,2	(8,2-12,7)	984
	<b>Brabant Flamand</b>	10,1	(7,0-13,1)	8,9	(6,5-12,1)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	9,8	(7,6-12,0)	9,1	(7,2-11,5)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	11,7	(9,2-14,3)	10,5	(8,4-13,2)	790
	<b>Limbourg</b>	13,3	(8,7-17,8)	12,2	(8,6-17,0)	363
	<b>Bruxelles</b>	9,5	(8,1-11,0)	7,9	(6,7-9,3)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	10,1	(5,6-14,5)	9,0	(5,7-13,9)	313
	<b>Hainaut</b>	8,2	(5,8-10,5)	7,1	(5,3-9,5)	962
	<b>Liège</b>	10,9	(7,6-14,2)	9,6	(6,9-13,3)	600
	<b>Luxembourg</b>	8,6	(5,2-12,0)	7,6	(5,0-11,2)	488
	<b>Namur</b>	4,9	(2,6-7,2)	4,3	(2,7-6,9)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	13,3	(10,6-16,1)	12,1	(9,8-14,8)	808
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	11,5	(10,5-12,4)	9,8	(9,0-10,8)	8538
	<b>2001</b>	10,9	(10,1-11,6)	9,5	(8,8-10,3)	10066
	<b>2004</b>	9,3	(8,5-10,1)	8,1	(7,4-8,9)	11117
	<b>2008</b>	9,6	(8,7-10,4)	8,4	(7,6-9,2)	9495
	<b>2013</b>	9,3	(8,4-10,2)	8,2	(7,4-9,0)	9111
	<b>2018</b>	10,2	(9,4-11,1)	9,1	(8,3-10,0)	9751

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 22. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec maux de tête grave (p,e, migraine) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA19_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,8	(2,6-7,1)	4,2	(2,6-6,8)	400
	<b>Femme</b>	21,3	(16,6-25,9)	20,1	(16,1-24,9)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	16,0	(7,1-24,8)	12,9	(7,1-22,3)	96
	<b>25 - 44</b>	19,7	(13,1-26,3)	16,4	(11,0-23,6)	185
	<b>45 - 64</b>	12,6	(8,4-16,7)	10,0	(6,9-14,2)	296
	<b>65 +</b>	5,3	(2,4-8,2)	3,6	(2,0-6,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	13,2	(3,5-23,0)	16,0	(7,4-31,1)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	13,7	(6,7-20,8)	11,6	(6,1-20,8)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	13,6	(8,3-18,8)	8,2	(5,1-12,9)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	12,8	(8,6-17,0)	7,6	(5,1-11,4)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	7,6	(3,7-11,5)	5,8	(3,3-9,9)	246
	<b>2001</b>	9,7	(5,2-14,2)	8,2	(5,0-13,2)	238
	<b>2004</b>	12,6	(7,4-17,8)	10,5	(6,7-16,0)	232
	<b>2008</b>	6,0	(2,6-9,5)	4,9	(2,7-8,7)	206
	<b>2013</b>	15,3	(10,3-20,3)	13,3	(9,2-18,9)	264
	<b>2018</b>	13,3	(10,6-16,1)	11,5	(9,3-14,3)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 23. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec asthme au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

MA01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,0	(4,1-5,8)	5,0	(4,2-5,9)	4673
	Femme	6,5	(5,5-7,5)	6,5	(5,6-7,6)	5079
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,4	(4,4-8,4)	6,4	(4,6-8,7)	1059
	25 - 44	5,6	(4,4-6,8)	5,6	(4,5-6,9)	2916
	45 - 64	5,7	(4,7-6,8)	5,7	(4,7-6,8)	3394
	65 +	5,7	(4,5-6,9)	5,5	(4,5-6,8)	2383
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	8,4	(5,9-10,8)	8,6	(6,3-11,7)	723
	Secondaire inférieur	6,7	(4,6-8,8)	6,8	(4,9-9,2)	1276
	Secondaire supérieur	6,2	(4,9-7,5)	6,1	(5,0-7,5)	2892
	Enseignement supérieur	4,8	(4,0-5,6)	4,7	(4,0-5,6)	4680
PROVINCE	Anvers	3,8	(2,6-5,1)	3,8	(2,7-5,3)	984
	Brabant Flamand	5,9	(3,5-8,3)	5,8	(3,8-8,7)	568
	Flandre Occidentale	3,5	(2,2-4,8)	3,5	(2,4-5,1)	933
	Flandre Orientale	5,4	(3,5-7,4)	5,4	(3,8-7,6)	791
	Limbourg	4,4	(1,7-7,2)	4,4	(2,4-8,0)	363
	Bruxelles	7,1	(5,9-8,4)	7,1	(5,9-8,5)	2513
	Brabant Wallon	4,2	(1,8-6,5)	4,1	(2,3-7,2)	313
	Hainaut	7,6	(5,7-9,5)	7,5	(5,8-9,7)	962
	Liège	9,5	(6,4-12,7)	9,4	(6,7-13,0)	599
	Luxembourg	5,3	(2,4-8,1)	5,2	(3,0-8,9)	489
	Namur	4,3	(2,1-6,5)	4,3	(2,5-7,1)	429
	Communauté Germanophone	5,3	(3,6-7,0)	5,2	(3,8-7,1)	808
ANNEE	2001	4,7	(4,1-5,3)	4,7	(4,2-5,3)	10064
	2004	4,3	(3,8-4,9)	4,3	(3,8-4,9)	11135
	2008	4,2	(3,6-4,8)	4,2	(3,7-4,8)	9589
	2013	4,3	(3,7-4,9)	4,3	(3,7-4,9)	9113
	2018	5,8	(5,1-6,4)	5,7	(5,1-6,4)	9752

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 24. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec asthme au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,5	(3,1-7,9)	5,2	(3,2-8,4)	400
	<b>Femme</b>	5,1	(2,8-7,3)	4,8	(3,1-7,3)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,8	(2,3-13,4)	7,8	(3,8-15,4)	96
	<b>25 - 44</b>	3,2	(0,5-6,0)	3,2	(1,4-7,3)	185
	<b>45 - 64</b>	5,8	(3,0-8,6)	5,8	(3,5-9,3)	296
	<b>65 +</b>	5,3	(2,3-8,3)	5,3	(3,0-9,2)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	4,5	(0,1-8,9)	4,8	(1,6-13,3)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,7	(2,0-11,5)	6,3	(2,7-14,0)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,3	(0,8-7,8)	4,1	(1,8-9,0)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,9	(2,5-7,3)	4,7	(2,8-7,8)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	5,6	(2,1-9,2)	5,5	(2,9-10,0)	238
	<b>2004</b>	5,4	(1,9-9,0)	5,3	(2,7-10,0)	235
	<b>2008</b>	3,7	(0,8-6,5)	3,7	(1,7-7,9)	210
	<b>2013</b>	3,3	(1,0-5,5)	3,2	(1,6-6,3)	264
	<b>2018</b>	5,3	(3,6-7,0)	5,2	(3,7-7,2)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 25. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec bronchite chronique, maladies pulmonaires chroniques obstructives, emphysème au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,7	(3,0-4,4)	3,2	(2,6-3,9)	4671
	<b>Femme</b>	4,6	(3,8-5,4)	3,8	(3,0-4,6)	5077
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,4	(0,4-2,4)	1,4	(0,7-2,8)	1057
	<b>25 - 44</b>	1,9	(1,2-2,6)	1,9	(1,3-2,7)	2916
	<b>45 - 64</b>	4,8	(3,9-5,7)	4,8	(3,9-5,8)	3394
	<b>65 +</b>	8,0	(6,5-9,5)	8,0	(6,6-9,6)	2381
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	11,9	(8,4-15,4)	8,2	(5,8-11,5)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,3	(5,3-9,3)	5,4	(4,0-7,3)	1276
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,1	(3,2-5,1)	3,7	(2,9-4,8)	2890
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,2	(1,6-2,7)	2,1	(1,6-2,7)	4678
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	3,3	(1,9-4,7)	2,7	(1,7-4,2)	981
	<b>Brabant Flamand</b>	2,2	(0,9-3,5)	1,8	(1,0-3,2)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	3,6	(2,3-4,9)	2,7	(1,9-4,0)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	4,0	(2,4-5,6)	3,3	(2,2-5,0)	791
	<b>Limbourg</b>	5,5	(2,8-8,2)	4,3	(2,5-7,3)	363
	<b>Bruxelles</b>	3,7	(2,8-4,6)	3,5	(2,7-4,6)	2512
	<b>Brabant Wallon</b>	5,2	(2,4-8,0)	4,4	(2,5-7,4)	313
	<b>Hainaut</b>	5,2	(3,8-6,7)	4,5	(3,4-6,0)	962
	<b>Liège</b>	6,2	(3,9-8,5)	5,2	(3,5-7,9)	599
	<b>Luxembourg</b>	4,6	(2,6-6,7)	4,0	(2,5-6,2)	489
	<b>Namur</b>	3,2	(1,3-5,1)	2,6	(1,4-4,7)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	3,9	(2,5-5,4)	3,2	(2,2-4,6)	808
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	6,0	(5,4-6,6)	5,6	(5,0-6,2)	10041
	<b>2004</b>	5,8	(5,2-6,4)	5,3	(4,8-5,9)	11132
	<b>2008</b>	4,0	(3,5-4,5)	3,6	(3,2-4,1)	9576
	<b>2013</b>	4,0	(3,4-4,5)	3,5	(3,0-4,0)	9113
	<b>2018</b>	4,2	(3,6-4,7)	3,6	(3,2-4,1)	9748

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 26. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec bronchite chronique, maladies pulmonaires chroniques obstructives, emphysème au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

<b>MA02_1</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	2,5	(1,0-3,9)	0,1	(0,0-0,1)	400
	<b>Femme</b>	5,3	(2,9-7,7)	0,1	(0,1-0,2)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,7	(0,0-10,3)	4,5	(1,4-13,2)	96
	<b>25 - 44</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	185
	<b>45 - 64</b>	3,7	(1,4-5,9)	3,5	(1,9-6,3)	296
	<b>65 +</b>	8,6	(4,7-12,5)	7,9	(4,6-13,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	8,3	(2,8-13,7)	0,1	(0,1-0,3)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,6	(2,2-11,0)	0,1	(0,1-0,3)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,1	(1,3-7,0)	0,1	(0,1-0,2)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,9	(0,0-3,8)	0,1	(0,0-0,1)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	4,0	(1,8-6,3)	3,9	(2,2-6,8)	237
	<b>2004</b>	7,4	(3,7-11,1)	7,0	(4,1-11,6)	234
	<b>2008</b>	3,2	(0,7-5,6)	2,8	(1,2-6,0)	209
	<b>2013</b>	3,3	(1,2-5,3)	3,0	(1,5-5,7)	264
	<b>2018</b>	3,9	(2,5-5,4)	3,6	(2,4-5,3)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 27. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec diabète au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

MA14_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	6,1	(5,2-7,0)	4,4	(3,6-5,5)	4671
	Femme	5,6	(4,8-6,5)	3,7	(3,0-4,6)	5079
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,0	(0,0-2,1)	1,0	(0,4-2,8)	1059
	25 - 44	1,7	(1,1-2,3)	1,7	(1,2-2,4)	2915
	45 - 64	6,5	(5,3-7,6)	6,4	(5,4-7,7)	3393
	65 +	13,8	(12,1-15,5)	13,9	(12,3-15,7)	2383
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	13,3	(10,3-16,3)	6,3	(4,6-8,5)	723
	Secondaire inférieur	9,1	(7,1-11,1)	4,9	(3,7-6,5)	1276
	Secondaire supérieur	6,2	(5,0-7,4)	4,6	(3,5-5,9)	2889
	Enseignement supérieur	3,6	(2,9-4,3)	2,9	(2,3-3,7)	4681
PROVINCE	Anvers	3,9	(2,5-5,2)	2,5	(1,7-3,7)	984
	Brabant Flamand	5,4	(3,4-7,4)	3,6	(2,3-5,5)	568
	Flandre Occidentale	7,2	(5,3-9,1)	4,4	(3,3-5,9)	933
	Flandre Orientale	5,5	(3,7-7,3)	3,7	(2,6-5,3)	790
	Limbourg	6,8	(3,6-9,9)	4,3	(2,4-7,7)	363
	Bruxelles	5,8	(4,9-6,8)	4,9	(3,9-6,0)	2513
	Brabant Wallon	6,4	(3,4-9,4)	4,4	(2,7-7,2)	313
	Hainaut	5,7	(4,2-7,3)	4,1	(3,1-5,5)	962
	Liège	8,2	(5,6-10,9)	5,9	(4,1-8,4)	599
	Luxembourg	5,7	(3,2-8,3)	4,1	(2,6-6,2)	488
	Namur	6,0	(3,2-8,8)	4,0	(2,4-6,5)	429
	Communauté Germanophone	4,6	(2,9-6,4)	3,0	(2,0-4,6)	808
ANNEE	1997	2,7	(2,2-3,2)	2,2	(1,8-2,6)	8544
	2001	3,4	(2,9-3,8)	2,3	(1,9-2,6)	9968
	2004	4,1	(3,6-4,7)	2,8	(2,4-3,3)	11127
	2008	4,2	(3,7-4,7)	2,7	(2,4-3,2)	9545
	2013	5,3	(4,7-6,0)	3,4	(3,0-4,0)	9113
	2018	5,9	(5,3-6,5)	3,7	(3,2-4,3)	9750

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 28. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec diabète au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

MA14_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,1	(2,9-9,3)	0,6	(0,3-1,3)	400
	<b>Femme</b>	3,3	(1,7-5,0)	0,3	(0,1-0,6)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	96
	<b>25 - 44</b>	0,3	(0,0-0,9)	0,3	(0,0-2,2)	185
	<b>45 - 64</b>	4,8	(1,0-8,7)	4,5	(2,2-9,2)	296
	<b>65 +</b>	12,4	(7,9-17,0)	12,3	(8,2-17,9)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,2	(4,0-16,3)	0,7	(0,2-1,9)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,8	(2,3-15,4)	0,7	(0,2-2,3)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	2,9	(0,9-5,0)	0,4	(0,2-0,9)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,1	(0,0-2,2)	0,2	(0,1-0,5)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	1,1	(0,0-2,3)	0,2	(0,1-0,6)	246
	<b>2001</b>	1,6	(0,1-3,1)	0,2	(0,1-0,6)	237
	<b>2004</b>	4,9	(1,4-8,4)	0,6	(0,3-1,3)	235
	<b>2008</b>	3,4	(1,2-5,5)	0,4	(0,2-0,8)	206
	<b>2013</b>	5,8	(1,8-9,8)	0,7	(0,2-1,9)	264
	<b>2018</b>	4,6	(2,9-6,4)	0,5	(0,3-0,9)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 29. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec ostéoporose au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA27_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	0,8	(0,5-1,1)	0,1	(0,0-0,1)	4674
	<b>Femme</b>	5,7	(4,9-6,6)	0,5	(0,4-0,6)	5076
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	1059
	<b>25 - 44</b>	0,3	(0,0-0,6)	0,2	(0,1-0,5)	2916
	<b>45 - 64</b>	3,2	(2,4-4,0)	2,3	(1,7-3,0)	3393
	<b>65 +</b>	9,7	(8,1-11,4)	6,6	(5,3-8,1)	2382
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,5	(4,1-8,9)	0,2	(0,1-0,4)	722
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,0	(4,3-7,7)	0,2	(0,1-0,4)	1276
	<b>Secondaire supérieur</b>	2,9	(2,1-3,7)	0,2	(0,1-0,3)	2891
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,4	(1,9-3,0)	0,2	(0,1-0,3)	4680
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	3,5	(2,3-4,7)	0,2	(0,1-0,3)	984
	<b>Brabant Flamand</b>	1,8	(0,6-3,0)	0,1	(0,0-0,2)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	5,3	(3,5-7,1)	0,3	(0,2-0,4)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	3,5	(2,1-4,9)	0,2	(0,1-0,3)	790
	<b>Limbourg</b>	5,5	(2,6-8,5)	0,3	(0,2-0,6)	363
	<b>Bruxelles</b>	2,8	(2,1-3,5)	0,2	(0,1-0,3)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	2,4	(0,0-5,1)	0,1	(0,0-0,4)	313
	<b>Hainaut</b>	2,2	(1,2-3,1)	0,1	(0,1-0,2)	961
	<b>Liège</b>	3,9	(2,1-5,6)	0,2	(0,1-0,4)	599
	<b>Luxembourg</b>	1,7	(0,4-3,0)	0,1	(0,0-0,2)	489
	<b>Namur</b>	1,8	(0,5-3,0)	0,1	(0,0-0,2)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,0	(3,3-6,7)	0,3	(0,2-0,5)	808
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	2,8	(2,3-3,3)	0,9	(0,7-1,2)	8545
	<b>2001</b>	4,3	(3,7-4,9)	1,1	(0,9-1,4)	10071
	<b>2004</b>	3,9	(3,5-4,4)	1,0	(0,8-1,3)	11067
	<b>2008</b>	4,7	(4,2-5,3)	1,2	(1,0-1,5)	9508
	<b>2013</b>	4,1	(3,6-4,7)	1,0	(0,8-1,3)	9099
	<b>2018</b>	3,3	(2,9-3,8)	0,8	(0,6-1,0)	9750

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 30. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec ostéoporose au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA27_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,8	(0,5-3,2)	0,3	(0,1-0,7)	400
	<b>Femme</b>	8,0	(4,9-11,0)	1,2	(0,8-1,7)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	96
	<b>25 - 44</b>	1,8	(0,0-3,5)	1,4	(0,4-4,6)	185
	<b>45 - 64</b>	4,2	(1,3-7,0)	3,3	(1,6-6,7)	296
	<b>65 +</b>	13,5	(8,2-18,7)	10,6	(7,0-15,8)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	11,9	(2,4-21,5)	0,6	(0,1-2,5)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,2	(1,1-11,2)	0,5	(0,2-1,2)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,3	(1,6-7,1)	0,6	(0,2-1,5)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,3	(1,1-5,5)	0,5	(0,3-1,1)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	3,2	(1,1-5,4)	0,3	(0,1-0,6)	246
	<b>2001</b>	4,7	(1,1-8,3)	0,2	(0,1-0,6)	238
	<b>2004</b>	2,9	(0,9-4,9)	0,1	(0,1-0,4)	235
	<b>2008</b>	8,7	(3,5-13,9)	0,4	(0,2-0,8)	208
	<b>2013</b>	9,3	(2,4-16,2)	0,6	(0,2-1,6)	264
	<b>2018</b>	5,0	(3,3-6,7)	0,3	(0,1-0,5)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 31. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles de la thyroïde au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

MA22_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,8	(2,0-3,5)	2,6	(1,9-3,5)	4672
	Femme	10,9	(9,8-12,0)	10,0	(8,9-11,2)	5075
GROUPE D'AGE	15 - 24	2,9	(1,2-4,7)	2,4	(1,3-4,6)	1056
	25 - 44	4,6	(3,5-5,7)	3,8	(2,9-5,0)	2913
	45 - 64	7,5	(6,4-8,7)	6,3	(5,3-7,4)	3395
	65 +	11,8	(10,1-13,5)	9,4	(7,9-11,1)	2383
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	9,9	(6,9-12,8)	5,6	(3,8-8,3)	723
	Secondaire inférieur	7,9	(5,6-10,3)	4,9	(3,3-7,3)	1274
	Secondaire supérieur	6,7	(5,6-7,8)	5,3	(4,3-6,5)	2890
	Enseignement supérieur	6,4	(5,4-7,3)	5,2	(4,2-6,3)	4679
PROVINCE	Anvers	5,1	(3,6-6,6)	3,7	(2,7-5,1)	982
	Brabant Flamand	3,8	(2,2-5,3)	2,7	(1,7-4,1)	568
	Flandre Occidentale	5,4	(3,6-7,1)	3,6	(2,6-5,1)	933
	Flandre Orientale	4,3	(2,9-5,8)	3,1	(2,2-4,5)	790
	Limbourg	4,2	(2,0-6,4)	2,9	(1,7-4,9)	363
	Bruxelles	7,0	(5,9-8,1)	5,7	(4,7-6,8)	2513
	Brabant Wallon	5,4	(2,7-8,2)	4,1	(2,4-7,0)	313
	Hainaut	8,8	(6,8-10,8)	6,8	(5,2-8,8)	962
	Liège	16,9	(13,1-20,8)	13,5	(9,9-18,2)	600
	Luxembourg	7,0	(4,4-9,6)	5,4	(3,6-8,0)	486
	Namur	7,7	(4,6-10,8)	5,6	(3,7-8,4)	429
	Communauté Germanophone	10,4	(8,1-12,7)	7,8	(6,0-10,1)	808
ANNEE	1997	3,1	(2,5-3,7)	2,4	(2,0-3,0)	8539
	2001	4,1	(3,6-4,7)	3,0	(2,6-3,4)	10072
	2004	4,3	(3,8-4,8)	3,1	(2,7-3,5)	11122
	2008	4,4	(3,9-5,0)	3,1	(2,7-3,6)	9581
	2013	5,8	(5,2-6,5)	4,1	(3,6-4,7)	9110
	2018	7,0	(6,3-7,6)	4,9	(4,3-5,6)	9747

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 32. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles de la thyroïde au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA22_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,7	(2,1-7,3)	3,2	(1,7-5,8)	400
	<b>Femme</b>	15,8	(12,1-19,5)	11,1	(7,8-15,5)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,4	(0,0-1,1)	0,3	(0,0-2,1)	96
	<b>25 - 44</b>	7,5	(3,9-11,0)	6,3	(3,8-10,3)	185
	<b>45 - 64</b>	11,7	(7,1-16,2)	10,2	(6,4-15,8)	296
	<b>65 +</b>	18,3	(13,0-23,6)	15,4	(10,7-21,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	11,5	(4,9-18,2)	3,9	(1,6-9,0)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	15,5	(9,0-22,1)	7,6	(4,1-13,5)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,7	(2,7-8,7)	3,5	(1,8-6,6)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	8,3	(5,1-11,5)	5,8	(3,6-9,0)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	4,2	(1,5-7,0)	3,8	(1,9-7,3)	246
	<b>2001</b>	3,7	(0,3-7,1)	2,8	(1,0-7,9)	238
	<b>2004</b>	4,2	(1,5-7,0)	3,1	(1,6-6,1)	235
	<b>2008</b>	7,2	(2,9-11,4)	4,7	(2,4-8,8)	210
	<b>2013</b>	10,2	(5,2-15,1)	7,7	(4,6-12,5)	264
	<b>2018</b>	10,4	(8,1-12,7)	8,0	(6,1-10,5)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 33. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles intestinaux graves au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

MA29_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,1	(2,4-3,8)	2,9	(2,3-3,7)	4673
	<b>Femme</b>	6,1	(5,1-7,0)	5,7	(4,8-6,7)	5077
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	3,3	(1,8-4,9)	3,2	(2,0-5,1)	1057
	<b>25 - 44</b>	2,7	(1,8-3,6)	2,6	(1,9-3,6)	2916
	<b>45 - 64</b>	5,1	(4,0-6,2)	4,9	(3,9-6,1)	3394
	<b>65 +</b>	7,3	(5,8-8,8)	6,7	(5,4-8,4)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,2	(6,7-13,7)	7,6	(5,2-11,2)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,9	(3,1-6,7)	3,9	(2,7-5,5)	1276
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,7	(3,6-5,9)	4,4	(3,4-5,7)	2891
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,6	(2,9-4,3)	3,5	(2,9-4,2)	4679
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	5,1	(3,4-6,8)	4,6	(3,2-6,4)	982
	<b>Brabant Flamand</b>	5,1	(2,8-7,3)	4,5	(2,9-7,0)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	6,1	(4,2-8,0)	5,2	(3,8-7,2)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	5,6	(3,5-7,7)	5,0	(3,4-7,4)	791
	<b>Limbourg</b>	4,7	(2,4-7,0)	4,1	(2,5-6,7)	363
	<b>Bruxelles</b>	2,7	(2,1-3,4)	2,7	(2,1-3,4)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	4,3	(1,8-6,7)	3,8	(2,2-6,8)	313
	<b>Hainaut</b>	4,1	(2,8-5,4)	3,7	(2,7-5,2)	962
	<b>Liège</b>	4,4	(2,1-6,8)	3,9	(2,3-6,7)	600
	<b>Luxembourg</b>	2,2	(0,8-3,5)	1,9	(1,0-3,7)	488
	<b>Namur</b>	2,7	(1,0-4,5)	2,4	(1,3-4,4)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	3,8	(2,4-5,1)	3,3	(2,3-4,8)	808
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	3,5	(3,0-4,1)	3,6	(3,0-4,2)	8543
	<b>2001</b>	3,5	(2,9-4,0)	3,2	(2,8-3,8)	10054
	<b>2004</b>	3,2	(2,8-3,6)	2,9	(2,6-3,4)	11124
	<b>2008</b>	3,1	(2,6-3,5)	2,8	(2,4-3,3)	9601
	<b>2013</b>	2,8	(2,4-3,3)	2,5	(2,2-3,0)	9112
	<b>2018</b>	4,6	(4,0-5,2)	4,2	(3,6-4,8)	9750

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 34. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles intestinaux graves au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA29_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,4	(1,7-5,0)	3,3	(2,0-5,5)	400
	<b>Femme</b>	4,2	(2,1-6,3)	4,1	(2,5-6,7)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,7	(0,0-9,8)	4,7	(1,6-12,9)	96
	<b>25 - 44</b>	3,8	(1,1-6,4)	3,8	(1,9-7,5)	185
	<b>45 - 64</b>	2,9	(1,1-4,7)	2,9	(1,6-5,3)	296
	<b>65 +</b>	4,7	(1,8-7,5)	4,6	(2,5-8,3)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,2	(0,0-10,8)	4,9	(1,8-12,7)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,6	(0,9-8,2)	4,6	(2,0-10,1)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,2	(2,0-8,5)	5,2	(2,8-9,3)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,6	(1,0-4,1)	2,6	(1,4-4,7)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	2,9	(0,4-5,4)	3,0	(1,3-6,8)	246
	<b>2001</b>	5,4	(2,1-8,7)	5,1	(2,9-8,7)	238
	<b>2004</b>	2,2	(0,3-4,0)	2,0	(0,8-4,8)	234
	<b>2008</b>	2,5	(0,0-5,6)	2,2	(0,6-7,5)	210
	<b>2013</b>	1,4	(0,0-3,0)	1,3	(0,4-3,9)	264
	<b>2018</b>	3,8	(2,4-5,1)	3,5	(2,4-5,2)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 35. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec cataracte au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

MA2301_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	2,8	(2,2-3,5)	0,2	(0,1-0,2)	4672
	Femme	4,1	(3,3-4,8)	0,2	(0,1-0,3)	5079
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,0	,	0,0	(0,0-0,0)	1059
	25 - 44	0,1	(0,0-0,2)	0,1	(0,0-0,3)	2916
	45 - 64	1,9	(1,1-2,6)	1,9	(1,3-2,7)	3395
	65 +	12,6	(10,8-14,5)	12,4	(10,7-14,4)	2381
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	7,5	(4,9-10,1)	0,2	(0,1-0,3)	721
	Secondaire inférieur	5,2	(3,6-6,9)	0,2	(0,1-0,3)	1276
	Secondaire supérieur	3,3	(2,4-4,2)	0,2	(0,1-0,3)	2892
	Enseignement supérieur	2,5	(1,9-3,2)	0,2	(0,1-0,3)	4681
PROVINCE	Anvers	2,9	(1,6-4,2)	0,1	(0,1-0,2)	984
	Brabant Flamand	3,8	(2,3-5,3)	0,2	(0,1-0,3)	568
	Flandre Occidentale	4,1	(2,5-5,6)	0,2	(0,1-0,3)	933
	Flandre Orientale	4,0	(2,5-5,5)	0,2	(0,1-0,3)	790
	Limbourg	4,8	(2,2-7,3)	0,2	(0,1-0,4)	363
	Bruxelles	2,4	(1,8-3,0)	0,2	(0,1-0,2)	2512
	Brabant Wallon	3,8	(0,8-6,9)	0,2	(0,1-0,5)	313
	Hainaut	2,8	(1,7-3,9)	0,1	(0,1-0,2)	962
	Liège	4,3	(2,0-6,7)	0,2	(0,1-0,4)	600
	Luxembourg	2,4	(0,4-4,4)	0,1	(0,0-0,3)	489
	Namur	1,9	(0,7-3,2)	0,1	(0,0-0,2)	429
	Communauté Germanophone	6,0	(4,1-7,9)	0,3	(0,2-0,5)	808
ANNEE	1997	1,3	(1,0-1,6)	0,4	(0,3-0,6)	8542
	2001	2,0	(1,7-2,4)	0,4	(0,3-0,6)	10064
	2004	2,3	(2,0-2,7)	0,5	(0,4-0,7)	11105
	2008	2,8	(2,4-3,2)	0,6	(0,4-0,9)	9564
	2013	3,0	(2,5-3,5)	0,6	(0,4-0,9)	9112
	2018	3,5	(3,0-4,0)	0,7	(0,5-1,0)	9751

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 36. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec cataracte au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

MA2301_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,1	(3,1-7,2)	400
	<b>Femme</b>	6,9	(4,1-9,6)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	96
	<b>25 - 44</b>	0,0	(0,0-0,0)	185
	<b>45 - 64</b>	1,7	(0,0-3,6)	296
	<b>65 +</b>	24,1	(17,3-30,9)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	19,9	(8,9-30,9)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	11,2	(4,2-18,2)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,3	(1,4-7,3)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,6	(0,2-2,9)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	1,0	(0,2-1,8)	246
	<b>2001</b>	1,3	(0,0-2,8)	238
	<b>2004</b>	4,7	(1,5-7,9)	234
	<b>2008</b>	2,1	(0,5-3,8)	210
	<b>2013</b>	4,0	(1,3-6,7)	264
	<b>2018</b>	6,0	(4,1-7,9)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 37. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec incontinence urinaire au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA20_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,6	(2,8-4,3)	2,6	(2,1-3,3)	4673
	<b>Femme</b>	6,4	(5,5-7,3)	4,3	(3,5-5,3)	5078
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,2	(0,3-2,0)	1,1	(0,6-2,3)	1057
	<b>25 - 44</b>	2,0	(1,2-2,8)	2,0	(1,3-2,9)	2916
	<b>45 - 64</b>	3,3	(2,6-4,0)	3,2	(2,6-4,0)	3395
	<b>65 +</b>	14,2	(12,2-16,1)	13,5	(11,6-15,6)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	17,2	(13,1-21,3)	7,9	(5,7-11,0)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,7	(5,6-9,8)	4,0	(2,8-5,7)	1276
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,3	(3,3-5,2)	3,2	(2,5-4,2)	2891
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,0	(2,4-3,7)	2,6	(2,1-3,3)	4680
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	6,1	(4,3-7,8)	4,1	(3,0-5,6)	982
	<b>Brabant Flamand</b>	3,3	(2,0-4,6)	2,1	(1,4-3,2)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	6,4	(4,5-8,4)	3,8	(2,7-5,4)	933
	<b>Flandre Orientale</b>	6,2	(4,3-8,2)	4,2	(3,0-6,1)	791
	<b>Limbourg</b>	5,1	(2,6-7,6)	3,1	(1,9-5,2)	363
	<b>Bruxelles</b>	3,5	(2,7-4,3)	2,8	(2,2-3,5)	2513
	<b>Brabant Wallon</b>	6,9	(3,3-10,6)	5,0	(2,9-8,4)	313
	<b>Hainaut</b>	4,2	(2,8-5,6)	3,0	(2,1-4,2)	962
	<b>Liège</b>	4,5	(2,3-6,7)	3,0	(1,7-5,5)	600
	<b>Luxembourg</b>	5,0	(2,8-7,2)	3,5	(2,2-5,4)	489
	<b>Namur</b>	3,7	(1,2-6,2)	2,3	(1,1-4,6)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	4,3	(2,6-5,9)	2,8	(1,8-4,3)	808
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	3,6	(3,1-4,1)	2,1	(1,8-2,5)	9560
	<b>2013</b>	4,2	(3,6-4,8)	2,5	(2,1-2,9)	9112
	<b>2018</b>	5,0	(4,4-5,6)	2,9	(2,4-3,5)	9751

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 38. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec incontinence urinaire au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA20_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,3	(1,1-5,6)	2,5	(1,2-5,4)	400
	<b>Femme</b>	5,1	(2,7-7,5)	3,6	(1,8-7,3)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	2,3	(0,0-5,5)	2,2	(0,5-8,8)	96
	<b>25 - 44</b>	1,2	(0,0-3,3)	1,2	(0,2-5,9)	185
	<b>45 - 64</b>	3,2	(0,3-6,1)	3,1	(1,2-7,9)	296
	<b>65 +</b>	10,9	(6,2-15,6)	10,6	(6,8-16,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	4,5	(0,0-9,6)	1,3	(0,4-4,4)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,8	(3,2-14,4)	4,4	(2,1-9,0)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,3	(0,5-6,0)	2,7	(1,0-7,0)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,7	(0,3-3,1)	1,6	(0,7-3,7)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	6,1	(1,9-10,2)	3,8	(1,9-7,5)	208
	<b>2013</b>	8,1	(3,6-12,5)	5,9	(3,2-10,7)	264
	<b>2018</b>	4,3	(2,6-5,9)	3,0	(1,8-5,0)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 39. Pourcentage de la population masculine de 25 ans et plus avec troubles prostatiques au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MA35_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>25 - 44</b>	0,4	(0,0-0,7)	0,4	(0,1-1,0)	1386
	<b>45 - 64</b>	3,2	(2,2-4,2)	3,2	(2,4-4,4)	1676
	<b>65 +</b>	18,6	(15,5-21,6)	18,6	(15,7-21,8)	1090
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	12,1	(6,0-18,2)	2,6	(1,3-5,0)	304
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,6	(5,7-11,5)	2,5	(1,3-4,8)	531
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,8	(3,5-6,1)	2,0	(1,2-3,1)	1260
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,9	(3,7-6,0)	2,5	(1,6-3,7)	1980
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	6,8	(4,0-9,5)	2,6	(1,5-4,5)	429
	<b>Brabant Flamand</b>	5,5	(2,8-8,3)	2,1	(1,1-4,0)	245
	<b>Flandre Occidentale</b>	6,1	(3,7-8,6)	2,0	(1,1-3,5)	399
	<b>Flandre Orientale</b>	5,4	(2,8-7,9)	2,1	(1,2-3,8)	333
	<b>Limbourg</b>	5,2	(1,6-8,8)	1,8	(0,8-4,0)	161
	<b>Bruxelles</b>	4,9	(3,6-6,2)	2,7	(1,7-4,2)	1071
	<b>Brabant Wallon</b>	9,3	(4,0-14,6)	3,8	(1,8-7,7)	138
	<b>Hainaut</b>	5,9	(3,2-8,6)	2,6	(1,3-5,1)	392
	<b>Liège</b>	4,7	(2,4-7,1)	1,9	(1,0-3,5)	242
	<b>Luxembourg</b>	5,2	(2,0-8,4)	2,1	(1,0-4,5)	198
	<b>Namur</b>	4,0	(1,0-7,0)	1,5	(0,6-3,5)	190
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,1	(2,9-7,3)	1,9	(1,1-3,4)	354
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	5,0	(4,2-5,7)	2,5	(2,0-3,2)	4214
	<b>2004</b>	5,2	(4,4-6,0)	2,6	(2,1-3,4)	4452
	<b>2008</b>	4,5	(3,7-5,4)	2,2	(1,6-2,9)	3728
	<b>2013</b>	5,0	(4,1-6,0)	2,4	(1,8-3,0)	3780
	<b>2018</b>	5,7	(4,8-6,6)	2,6	(2,0-3,3)	4152

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 40. Pourcentage de la population masculine de 25 ans et plus avec troubles prostatiques au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MA35_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>GROUPE D'AGE</b>						
	<b>25 - 44</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	86
	<b>45 - 64</b>	1,6	(0,0-3,4)	1,6	(0,5-4,9)	159
	<b>65 +</b>	18,7	(10,7-26,6)	18,7	(12,0-27,8)	109
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>						
	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,4	(0,0-16,5)	0,0	(0,0-0,1)	33
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,5	(0,5-14,5)	0,0	(0,0-0,2)	60
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,2	(1,0-11,3)	0,1	(0,0-0,2)	91
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,7	(0,5-5,0)	0,0	(0,0-0,1)	145
<b>ANNEE</b>						
	<b>2001</b>	5,7	(0,9-10,6)	3,5	(1,0-11,0)	106
	<b>2004</b>	7,6	(0,8-14,5)	3,6	(1,1-11,2)	101
	<b>2008</b>	3,9	(0,0-8,9)	1,4	(0,4-5,6)	76
	<b>2013</b>	8,6	(2,7-14,5)	3,9	(1,5-9,7)	117
	<b>2018</b>	5,1	(2,9-7,3)	2,2	(1,0-4,7)	354

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 41. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec multimorbidité\*\*, Enquête de santé 2018 - Belgique

MA_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	13,6	(12,3-14,9)	8,1	(6,9-9,6)	4662
	Femme	16,6	(15,2-18,0)	9,2	(7,8-10,9)	5070
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,8	(0,0-1,6)	0,8	(0,3-2,1)	1057
	25 - 44	3,0	(2,2-3,7)	3,0	(2,3-3,8)	2914
	45 - 64	17,3	(15,5-19,1)	17,3	(15,6-19,2)	3384
	65 +	37,8	(35,2-40,5)	37,6	(35,0-40,3)	2377
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	31,1	(26,2-36,0)	12,2	(9,2-16,1)	721
	Secondaire inférieur	24,7	(21,5-28,0)	11,2	(9,0-13,8)	1274
	Secondaire supérieur	15,2	(13,5-16,9)	9,5	(7,9-11,4)	2883
	Enseignement supérieur	10,1	(8,8-11,4)	6,8	(5,7-8,1)	4673
PROVINCE	Anvers	13,4	(10,9-15,8)	7,2	(5,5-9,4)	980
	Brabant Flamand	14,7	(11,3-18,1)	8,2	(6,1-10,8)	567
	Flandre Occidentale	16,6	(13,6-19,6)	8,2	(6,4-10,5)	930
	Flandre Orientale	15,5	(12,6-18,5)	8,7	(6,8-11,2)	788
	Limbourg	17,1	(12,6-21,6)	9,1	(6,5-12,5)	363
	Bruxelles	10,8	(9,5-12,2)	7,4	(6,1-8,8)	2511
	Brabant Wallon	13,4	(8,7-18,0)	7,5	(5,0-11,1)	313
	Hainaut	16,4	(13,6-19,3)	10,2	(8,1-12,8)	962
	Liège	20,5	(16,2-24,7)	13,0	(9,9-16,9)	598
	Luxembourg	12,8	(9,2-16,4)	7,4	(5,4-10,0)	483
	Namur	10,6	(7,3-13,9)	5,3	(3,6-7,7)	429
	Communauté Germanophone	16,3	(13,3-19,2)	9,1	(7,1-11,5)	808
ANNEE	1997	8,9	(7,9-9,8)	6,2	(5,4-7,0)	8521
	2001	11,4	(10,5-12,4)	6,7	(6,0-7,4)	9857
	2004	11,5	(10,7-12,3)	6,7	(6,0-7,4)	10908
	2013	13,5	(12,4-14,5)	7,6	(6,8-8,4)	9103
	2018	15,2	(14,2-16,2)	8,5	(7,7-9,4)	9732

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

\*\*Plus d'une des 6 maladies suivantes: BPCO, maladie cardiaques, diabète, arthrite/arthrose, hypertension, cancer

Tableau B 42. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec multimorbidité\*\*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

MA_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,9	(12,7-21,0)	2,0	(1,2-3,2)	400
	<b>Femme</b>	15,8	(11,9-19,6)	1,6	(1,1-2,4)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	96
	<b>25 - 44</b>	2,1	(0,0-4,5)	2,1	(0,6-6,6)	185
	<b>45 - 64</b>	19,1	(13,9-24,4)	19,1	(14,4-24,9)	296
	<b>65 +</b>	39,0	(32,1-46,0)	39,2	(32,6-46,3)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	31,3	(20,0-42,5)	2,3	(1,2-4,5)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	24,8	(15,7-33,9)	2,2	(1,1-4,5)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	12,6	(7,5-17,7)	1,8	(1,0-3,0)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,7	(6,2-13,2)	1,4	(0,9-2,2)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	4,4	(2,0-6,7)	3,1	(1,4-6,5)	246
	<b>2001</b>	11,6	(5,9-17,3)	6,5	(3,7-11,2)	236
	<b>2004</b>	12,4	(7,7-17,0)	6,4	(3,8-10,6)	232
	<b>2013</b>	14,5	(8,8-20,1)	7,3	(4,3-12,1)	264
	<b>2018</b>	16,3	(13,3-19,2)	8,6	(6,0-12,2)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

\*\*Plus d'une des 6 maladies suivantes: BPCO, maladie cardiaques, diabète, arthrite/arthrose, hypertension, cancer

### 3. Fragilité chez les personnes âgées

La fragilité des personnes âgées est un concept difficile à définir. Bien qu'il s'agisse d'un concept complexe, on peut affirmer que c'est essentiellement un manque de réserve physiologique qui empêche les personnes âgées de faire face aux problèmes auxquels elles sont confrontées. La fragilité chez les personnes âgées est souvent mesurée sur base du phénotype de Fried, dans lequel cinq dimensions sont distinguées : manque d'énergie, perte d'appétit, faible force musculaire, vitesse de marche lente et faible activité physique. Une personne est définie comme fragile si au moins trois de ces cinq critères sont présents.

Au sein de la Communauté Germanophone, 21,5% de la population âgée de 65 ans est fragile. Le pourcentage des personnes fragiles est plus élevé parmi les femmes (29,0%) que parmi les hommes (14,6%), mais cette différence n'est pas significative après ajustement pour l'âge. Le taux de fragilité est significativement plus élevé chez les personnes âgées de 75 ans et plus (32,9%) par rapport aux personnes de 65-74 ans (13,4%).

En Belgique, au fur et à mesure que le niveau d'éducation augmente, le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus qui est fragile diminue. En revanche, on n'observe pas de gradient socio-économique pour cet indicateur au sein de la Communauté Germanophone.

Le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus qui sont fragiles en Communauté Germanophone n'est pas différent des taux observés dans les provinces belges.

Tableau B 43. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui est fragile\*\*, Enquête de santé 2018 - Belgique

FR_03		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	14,6	(11,7-17,4)	13,7	(11,2-16,8)	1090
	Femme	29,0	(25,8-32,3)	26,7	(23,6-30,1)	1287
GROUPE D'AGE	65 - 74	13,4	(11,0-15,8)	12,5	(10,3-15,1)	1288
	75 +	32,9	(29,1-36,8)	30,6	(26,8-34,5)	1089
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	41,8	(35,0-48,7)	33,8	(26,9-41,5)	382
	Secondaire inférieur	27,8	(22,2-33,3)	23,1	(18,4-28,6)	503
	Secondaire supérieur	20,2	(16,0-24,4)	18,0	(14,5-22,3)	621
	Enseignement supérieur	11,4	(8,7-14,2)	11,1	(8,7-14,0)	816
PROVINCE	Anvers	24,8	(18,0-31,7)	21,8	(15,6-29,7)	246
	Brabant Flamand	15,2	(8,7-21,6)	11,9	(7,5-18,5)	167
	Flandre Occidentale	21,6	(15,8-27,4)	18,3	(13,5-24,4)	264
	Flandre Orientale	19,3	(13,0-25,6)	16,0	(11,3-22,3)	188
	Limbourg	26,2	(15,2-37,1)	23,4	(15,6-33,5)	109
	Bruxelles	28,1	(23,5-32,6)	24,0	(19,9-28,8)	503
	Brabant Wallon	30,6	(17,7-43,4)	29,7	(17,5-45,7)	69
	Hainaut	28,5	(21,8-35,3)	25,4	(19,3-32,6)	223
	Liège	16,3	(9,2-23,5)	12,9	(8,2-19,9)	162
	Luxembourg	30,6	(16,9-44,3)	27,2	(16,3-41,6)	104
	Namur	21,1	(12,0-30,1)	17,6	(11,0-27,1)	111
	Communauté Germanophone run	21,5	(15,3-27,8)	17,7	(12,7-24,0)	231
ANNEE	2018	22,8	(20,4-25,1)			2377

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

\*\*Sur base du score de l'instrument SHARE

Tableau B 44. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui est fragile\*\*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

FR_03		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	17,0	(9,3-24,8)	14,3	(8,4-23,2)	109
	Femme	25,1	(16,0-34,1)	20,8	(13,6-30,4)	122
GROUPE D'AGE	65 - 74	9,7	(3,9-15,5)	9,4	(5,1-16,8)	118
	75 +	32,6	(22,1-43,0)	31,6	(22,4-42,6)	113
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	27,5	(12,5-42,5)	16,6	(7,9-31,9)	59
	Secondaire inférieur	22,2	(10,0-34,4)	16,3	(8,4-29,1)	63
	Secondaire supérieur	14,6	(1,6-27,6)	17,6	(7,5-35,8)	40
	Enseignement supérieur	19,6	(7,0-32,2)	22,1	(11,4-38,6)	46

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

\*\*Sur base du score de l'instrument SHARE

## 4. Limitations fonctionnelles de longue durée

Un indicateur important relatif aux maladies de longue durée est le GALI (*Global Activity Limitations Indicator*), basé sur la question : “Êtes-vous limité(e) depuis au moins 6 mois à cause d'un problème de santé dans les activités que les gens font habituellement ?”. En Communauté Germanophone, 28,4% des habitants (âgés de 15 ans et plus) indiquent être limités dans les activités que les gens font habituellement à cause d'un problème de santé (pour la Belgique, il s'agit de 22,6% de la population). Ce pourcentage varie évidemment en fonction de l'âge : de 7,3% dans la tranche d'âge des 15-24 ans à 42,1% parmi les 65 ans et plus. En outre, les limitations d'activités liées à la santé semblent être associées au niveau d'éducation (même après ajustement pour l'âge et le sexe) : alors que 49,3% des personnes ayant un diplôme de l'école primaire/pas de diplôme connaissent des limitations d'activités, ce chiffre tombe à 22,1% chez les personnes les plus instruites.

En outre, il a également été examiné si et dans quelle mesure les personnes sont restreintes dans leur mobilité (avoir des difficultés ou une incapacité de se mouvoir seul) : en Communauté Germanophone, 2,9% de la population (âgée de 15 ans et plus) indique être quelque peu restreinte dans sa mobilité, un pourcentage égal à celui applicable à l'ensemble de la Belgique.

Les autres indicateurs de ce chapitre n'ont été développés que pour la partie de la population âgée de 65 ans et plus. Par conséquent, le nombre de répondants est relativement petit au niveau de la Communauté Germanophone. Une comparaison des résultats des différentes enquêtes au fil des ans ne sera pas effectuée, vu le faible nombre de répondants au cours des années précédentes.

A partir de 65 ans, 15,3% de la population indique être (dans une certaine mesure) restreinte au niveau de sa mobilité, un pourcentage qui correspond à ce que l'on peut trouver pour l'ensemble de la Belgique. La prévalence est bien sûr liée à l'âge : dans la population de 75 ans et plus, une personne sur quatre est (dans une certaine mesure) restreinte dans sa mobilité.

Dans la Communauté Germanophone, 43,8% des habitants de 65 ans et plus indiquent être (sévèrement à très sévèrement) limité dans au moins une des fonctions suivantes : la vue, l'ouïe, la marche, la capacité cognitive, les soins personnels ou la communication ; 33,9% indiquent être moyennement limités et 22,2% ne rapportent aucune limitation fonctionnelle. Le pourcentage de personnes souffrant de limitations fonctionnelles augmente naturellement avec l'âge : 29,6% des personnes âgées de 65 à 74 ans déclarent des limitations (sévères à très sévères) pour 57% des personnes âgées de 75 ans ou plus.

Au sein de la Communauté Germanophone, 27,0% de la population de 65 ans et plus rapporte être restreinte dans l'accomplissement des activités élémentaires du quotidien (10,1% modérément et 16,9% sévèrement restreintes), comme se lever et se raser d'un fauteuil, se lever du lit et se recoucher, s'habiller et se déshabiller, prendre un bain ou une douche, se servir d'un couteau et une fourchette ou aller aux toilettes.

Enfin, l'enquête de santé a examiné dans quelle mesure les personnes âgées de 65 ans et plus étaient limitées dans l'exécution des tâches domestiques (*“Instrumental Activities of Daily Living”*) comme préparer un repas, utiliser le téléphone, faire des courses, gérer les médicaments, accomplir de légères tâches ménagères, effectuer de temps en temps des activités ménagères plus lourdes, gérer les finances.

En Communauté Germanophone, 44,6% de la population de 65 ans et plus est limitée dans au moins une de ces activités, un pourcentage qui est presque identique à celui obtenu pour tout le pays.

**Tableau B 45. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_GALI_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	19,9	(18,2-21,7)	18,3	(16,4-20,3)	3762
	<b>Femme</b>	25,1	(23,3-26,8)	22,5	(20,7-24,5)	4163
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	8,3	(5,1-11,5)	8,3	(5,6-12,1)	721
	<b>25 - 44</b>	13,8	(11,9-15,8)	13,8	(11,9-15,8)	2324
	<b>45 - 64</b>	25,9	(23,7-28,1)	25,8	(23,7-28,1)	2907
	<b>65 +</b>	36,7	(33,9-39,6)	36,4	(33,6-39,3)	1973
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	42,1	(35,8-48,3)	33,0	(27,0-39,5)	480
	<b>Secondaire inférieur</b>	33,8	(29,6-37,9)	27,1	(23,5-31,1)	979
	<b>Secondaire supérieur</b>	25,1	(22,7-27,6)	23,6	(21,0-26,4)	2371
	<b>Enseignement supérieur</b>	15,9	(14,3-17,6)	15,2	(13,6-17,0)	3942
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	20,9	(17,5-24,3)	18,7	(15,6-22,2)	859
	<b>Brabant Flamand</b>	18,0	(14,1-21,8)	15,9	(12,7-19,6)	512
	<b>Flandre Occidentale</b>	21,9	(18,6-25,2)	18,3	(15,5-21,6)	824
	<b>Flandre Orientale</b>	22,2	(18,5-25,9)	19,9	(16,6-23,7)	704
	<b>Limbourg</b>	25,4	(19,1-31,6)	22,0	(17,0-28,1)	288
	<b>Bruxelles</b>	20,4	(18,3-22,5)	19,8	(17,8-22,1)	1828
	<b>Brabant Wallon</b>	22,6	(16,1-29,1)	20,7	(15,4-27,3)	254
	<b>Hainaut</b>	26,8	(22,8-30,8)	25,4	(21,4-29,9)	794
	<b>Liège</b>	24,9	(19,6-30,2)	22,2	(17,1-28,3)	471
	<b>Luxembourg</b>	19,7	(14,7-24,7)	17,7	(13,6-22,7)	350
	<b>Namur</b>	26,6	(20,1-33,1)	23,9	(18,3-30,5)	321
	<b>Communauté Germanophone</b>	28,4	(24,5-32,3)	26,1	(22,5-30,2)	720
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	21,1	(19,9-22,4)	19,9	(18,7-21,1)	9016
	<b>2004</b>	20,6	(19,4-21,8)	19,2	(18,0-20,6)	8832
	<b>2008</b>	21,0	(19,7-22,3)	19,1	(17,9-20,4)	7366
	<b>2013</b>	22,7	(21,2-24,1)	20,0	(18,6-21,4)	6284
	<b>2018</b>	22,6	(21,3-23,9)	19,8	(18,5-21,2)	7925

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 46. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_GALI_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	27,0	(21,8-32,3)	25,0	(20,4-30,4)	360
	<b>Femme</b>	29,8	(24,4-35,2)	26,9	(21,5-33,1)	360
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,3	(1,0-13,6)	7,3	(3,1-16,4)	83
	<b>25 - 44</b>	22,2	(15,0-29,4)	22,2	(15,9-30,2)	162
	<b>45 - 64</b>	32,6	(25,9-39,3)	32,6	(26,3-39,5)	276
	<b>65 +</b>	42,1	(34,0-50,2)	42,0	(34,2-50,2)	199
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	49,3	(33,5-65,1)	40,9	(25,7-58,1)	66
	<b>Secondaire inférieur</b>	37,8	(27,7-47,9)	31,3	(22,1-42,2)	124
	<b>Secondaire supérieur</b>	24,5	(17,1-32,0)	24,3	(17,6-32,5)	203
	<b>Enseignement supérieur</b>	22,1	(16,8-27,3)	22,0	(17,0-28,0)	278
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	27,1	(19,2-35,0)	26,2	(19,9-33,8)	216
	<b>2004</b>	28,6	(19,9-37,2)	27,6	(18,9-38,4)	183
	<b>2008</b>	24,4	(17,1-31,6)	21,9	(16,2-29,0)	180
	<b>2013</b>	28,8	(20,7-36,9)	26,8	(19,7-35,2)	218
	<b>2018</b>	28,4	(24,5-32,3)	26,8	(23,1-30,9)	720

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 47. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_GALI_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	31,6	(27,7-35,6)	31,8	(28,0-35,9)	926
	<b>Femme</b>	40,8	(36,9-44,7)	40,4	(36,6-44,4)	1047
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	29,3	(25,8-32,8)	29,0	(25,6-32,6)	1115
	<b>75 +</b>	45,7	(41,2-50,1)	44,9	(40,6-49,4)	858
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	45,5	(37,4-53,5)	40,5	(32,7-48,8)	271
	<b>Secondaire inférieur</b>	43,4	(37,1-49,6)	41,6	(35,7-47,8)	416
	<b>Secondaire supérieur</b>	36,7	(31,3-42,0)	36,8	(31,5-42,4)	528
	<b>Enseignement supérieur</b>	28,4	(24,0-32,8)	29,6	(25,2-34,4)	712
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	39,7	(31,5-47,8)	38,7	(30,9-47,2)	207
	<b>Brabant Flamand</b>	31,1	(22,5-39,6)	29,9	(22,5-38,6)	150
	<b>Flandre Occidentale</b>	32,6	(25,5-39,7)	31,4	(24,7-38,9)	233
	<b>Flandre Orientale</b>	37,4	(29,5-45,4)	36,4	(28,7-44,8)	167
	<b>Limbourg</b>	37,4	(24,0-50,7)	37,9	(26,5-50,8)	88
	<b>Bruxelles</b>	36,7	(31,1-42,2)	35,6	(30,2-41,3)	396
	<b>Brabant Wallon</b>	49,0	(34,9-63,0)	50,0	(35,7-64,2)	58
	<b>Hainaut</b>	41,6	(33,2-50,1)	42,0	(33,3-51,3)	182
	<b>Liège</b>	32,0	(22,6-41,3)	31,7	(23,5-41,1)	136
	<b>Luxembourg</b>	30,4	(19,5-41,3)	29,7	(20,5-40,8)	77
	<b>Namur</b>	41,5	(28,2-54,8)	40,7	(29,1-53,5)	80
	<b>Communauté Germanophone</b>	42,1	(34,0-50,2)	41,2	(33,6-49,2)	199
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	46,1	(42,5-49,7)	46,4	(42,8-49,9)	1852
	<b>2004</b>	40,2	(37,3-43,1)	41,0	(38,1-44,1)	2469
	<b>2008</b>	42,7	(39,2-46,3)	42,3	(38,9-45,9)	1961
	<b>2013</b>	37,2	(33,9-40,4)	36,3	(33,1-39,6)	1470
	<b>2018</b>	36,7	(33,9-39,6)	36,2	(33,4-39,1)	1973

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 48. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_GALI_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	43,4	(32,8-54,0)	43,3	(32,8-54,5)	97
	<b>Femme</b>	41,0	(29,7-52,3)	39,3	(28,9-50,7)	102
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	28,8	(19,0-38,5)	28,8	(20,1-39,3)	107
	<b>75 +</b>	56,4	(44,8-67,9)	56,7	(45,1-67,5)	92
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	54,1	(37,3-70,9)	45,2	(28,4-63,2)	49
	<b>Secondaire inférieur</b>	39,1	(24,1-54,1)	35,0	(21,7-51,2)	55
	<b>Secondaire supérieur</b>	35,9	(15,1-56,7)	44,2	(26,6-63,4)	35
	<b>Enseignement supérieur</b>	40,4	(22,7-58,2)	46,1	(28,2-65,1)	39
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	53,3	(35,4-71,2)	55,4	(38,8-70,9)	51
	<b>2004</b>	24,4	(8,9-39,9)	27,8	(14,0-47,8)	45
	<b>2008</b>	46,5	(31,0-62,0)	48,5	(33,0-64,3)	66
	<b>2013</b>	32,9	(11,7-54,0)	31,4	(15,2-54,0)	47
	<b>2018</b>	42,1	(34,0-50,2)	40,9	(33,1-49,2)	199

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 49. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_1		Pas confiné	Confiné domicile	Confiné fauteuil	Confiné lit	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	96,4	1,3	1,1	1,2	3581
	<b>Femme</b>	97,4	1,4	0,6	0,6	3787
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	98,1	0,7	0,5	0,6	1057
	<b>25 - 44</b>	97,1	1,1	1,0	0,8	2916
	<b>45 - 64</b>	96,2	2,0	0,8	1,0	3395
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	92,2	3,4	3,1	1,3	341
	<b>Secondaire inférieur</b>	92,1	3,8	1,6	2,5	769
	<b>Secondaire supérieur</b>	96,9	1,3	1,1	0,7	2270
	<b>Enseignement supérieur</b>	98,1	0,9	0,4	0,6	3862
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	97,7	1,4	0,1	0,8	735
	<b>Brabant Flamand</b>	99,1	0,8	0,0	0,1	401
	<b>Flandre Occidentale</b>	97,0	1,7	0,3	1,0	667
	<b>Flandre Orientale</b>	98,2	1,3	0,4	0,2	601
	<b>Limbourg</b>	94,9	2,0	2,1	1,0	253
	<b>Bruxelles</b>	97,0	1,1	1,1	0,7	2010
	<b>Brabant Wallon</b>	98,6	0,4	0,5	0,4	244
	<b>Hainaut</b>	94,8	1,9	1,6	1,7	739
	<b>Liège</b>	95,4	1,2	1,9	1,6	438
	<b>Luxembourg</b>	97,1	1,5	0,0	1,4	385
	<b>Namur</b>	96,6	1,8	1,6	0,0	318
	<b>Communauté Germanophone</b>	97,1	1,8	0,4	0,7	577
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	98,5	1,0	0,3	0,3	6410
	<b>2001</b>	97,9	1,3	0,5	0,3	7522
	<b>2004</b>	98,5	1,1	0,3	0,1	7120
	<b>2008</b>	99,0	0,6	0,3	0,1	6733
	<b>2013</b>	97,4	1,3	0,7	0,6	7087
	<b>2018</b>	96,9	1,4	0,9	0,9	7368

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 50. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_1		Pas confiné	Confiné domicile	Confiné fauteuil	Confiné lit	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	96,6	1,1	0,8	1,4	291
	<b>Femme</b>	97,6	2,4	0,0	0,0	286
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	98,1	0,9	1,0	0,0	96
	<b>25 - 44</b>	95,9	2,6	0,0	1,6	185
	<b>45 - 64</b>	97,7	1,5	0,5	0,3	296
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	92,5	0,0	3,7	3,7	20
	<b>Secondaire inférieur</b>	93,0	7,0	0,0	0,0	77
	<b>Secondaire supérieur</b>	98,6	0,5	0,3	0,6	178
	<b>Enseignement supérieur</b>	97,4	1,4	0,4	0,8	272
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	97,8	1,6	0,3	0,4	177
	<b>2001</b>	97,7	1,8	0,5	0,0	157
	<b>2004</b>	96,7	3,3	0,0	0,0	123
	<b>2008</b>	100,0	0,0	0,0	0,0	123
	<b>2013</b>	97,2	2,5	0,0	0,3	206
	<b>2018</b>	97,1	1,8	0,4	0,7	577

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 51. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,6	(2,7-4,5)	3,5	(2,7-4,5)	3581
	<b>Femme</b>	2,6	(2,0-3,2)	2,5	(2,0-3,2)	3787
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,9	(0,7-3,0)	1,8	(1,0-3,3)	1057
	<b>25 - 44</b>	2,9	(2,0-3,8)	2,9	(2,1-3,8)	2916
	<b>45 - 64</b>	3,8	(3,0-4,6)	3,8	(3,1-4,6)	3395
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,8	(3,9-11,7)	7,3	(4,4-12,0)	341
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,9	(5,1-10,7)	7,4	(5,1-10,6)	769
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,1	(2,1-4,0)	2,9	(2,1-4,1)	2270
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,9	(1,3-2,4)	1,8	(1,3-2,4)	3862
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	2,3	(1,0-3,6)	2,2	(1,2-3,8)	735
	<b>Brabant Flamand</b>	0,9	(0,0-1,9)	0,9	(0,3-2,5)	401
	<b>Flandre Occidentale</b>	3,0	(1,6-4,3)	2,8	(1,8-4,4)	667
	<b>Flandre Orientale</b>	1,8	(0,8-2,9)	1,7	(1,0-3,0)	601
	<b>Limbourg</b>	5,1	(2,4-7,7)	4,8	(2,9-7,9)	253
	<b>Bruxelles</b>	3,0	(2,2-3,8)	2,9	(2,2-3,9)	2010
	<b>Brabant Wallon</b>	1,4	(0,0-2,8)	1,4	(0,5-3,5)	244
	<b>Hainaut</b>	5,2	(3,4-7,0)	5,0	(3,5-7,1)	739
	<b>Liège</b>	4,6	(1,8-7,5)	4,5	(2,4-8,4)	438
	<b>Luxembourg</b>	2,9	(0,6-5,1)	2,8	(1,3-5,9)	385
	<b>Namur</b>	3,4	(0,3-6,5)	3,2	(1,3-7,9)	318
	<b>Communauté Germanophone</b>	2,9	(1,3-4,5)	2,7	(1,6-4,7)	577
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	1,5	(1,1-2,0)	1,5	(1,1-2,0)	6410
	<b>2001</b>	2,1	(1,7-2,6)	2,0	(1,6-2,4)	7522
	<b>2004</b>	1,5	(1,1-1,9)	1,4	(1,1-1,8)	7120
	<b>2008</b>	1,0	(0,6-1,3)	0,9	(0,6-1,2)	6733
	<b>2013</b>	2,6	(2,1-3,1)	2,2	(1,8-2,7)	7087
	<b>2018</b>	3,1	(2,6-3,6)	2,7	(2,2-3,3)	7368

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 52. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,4	(1,0-5,7)	3,3	(1,6-6,6)	291
	<b>Femme</b>	2,4	(0,3-4,6)	2,4	(1,0-5,6)	286
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,9	(0,0-4,7)	1,9	(0,5-7,6)	96
	<b>25 - 44</b>	4,1	(0,5-7,8)	4,1	(1,7-9,8)	185
	<b>45 - 64</b>	2,3	(0,5-4,1)	2,3	(1,1-4,9)	296
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,5	(0,0-19,8)	6,1	(1,1-27,5)	20
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,0	(0,0-14,8)	7,8	(2,5-22,3)	77
	<b>Secondaire supérieur</b>	1,4	(0,0-3,2)	1,4	(0,4-4,5)	178
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,6	(0,4-4,8)	2,4	(1,1-5,3)	272
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	2,2	(0,0-4,5)	2,0	(0,7-5,3)	177
	<b>2001</b>	2,3	(0,3-4,4)	2,0	(0,8-4,7)	157
	<b>2004</b>	3,3	(0,0-7,6)	2,7	(0,8-8,5)	123
	<b>2008</b>	0,0	,	0,0	(0,0-0,0)	123
	<b>2013</b>	2,8	(0,0-5,9)	2,2	(0,7-6,6)	206
	<b>2018</b>	2,9	(1,3-4,5)	2,3	(1,2-4,6)	577

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 53. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_3		Pas confine(e)	Confiné(e) à domicile	Confiné(e) au fauteuil	Confiné(e) au lit	N
SEXE	Homme	87,0	7,1	4,5	1,4	1092
	Femme	83,1	8,7	6,5	1,7	1291
GROUPE D'AGE	65 - 74	93,4	3,8	1,9	1,0	1289
	75 +	75,4	12,6	9,7	2,2	1094
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	73,6	14,4	9,2	2,8	382
	Secondaire inférieur	81,6	9,6	7,8	1,0	507
	Secondaire supérieur	84,3	7,8	5,9	2,0	621
	Enseignement supérieur	93,5	3,6	1,8	1,1	818
PROVINCE	Anvers	85,0	9,1	5,0	0,9	247
	Brabant Flamand	84,2	9,9	5,2	0,6	167
	Flandre Occidentale	85,2	7,1	5,7	1,9	266
	Flandre Orientale	85,8	10,6	3,1	0,5	190
	Limbourg	76,9	12,4	6,8	3,8	110
	Bruxelles	86,4	4,7	6,6	2,2	503
	Brabant Wallon	89,5	1,3	9,1	0,0	69
	Hainaut	82,3	7,8	7,2	2,7	223
	Liège	89,2	6,0	4,3	0,5	162
	Luxembourg	84,1	5,2	7,0	3,7	104
	Namur	84,6	3,1	9,2	3,1	111
	Communauté Germanophone	84,7	11,8	2,7	0,8	231
ANNEE	1997	81,1	12,1	5,9	0,9	1588
	2001	79,5	11,9	7,1	1,6	1980
	2004	80,7	10,3	7,6	1,4	3059
	2008	85,2	8,3	6,1	0,5	2820
	2013	83,6	9,3	5,2	1,9	2025
	2018	84,8	8,0	5,6	1,6	2383

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 54. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_3		Pas confiné(e)	Confiné(e) à domicile	Confiné(e) au fauteuil	Confiné(e) au lit	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	85,9	9,3	4,9	0,0	109
	<b>Femme</b>	83,7	13,7	1,1	1,5	122
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	94,1	4,2	0,0	1,7	118
	<b>75 +</b>	75,9	18,8	5,3	0,0	113
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	76,8	20,6	1,1	1,5	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	80,8	9,9	9,3	0,0	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	92,8	5,0	0,0	2,2	40
	<b>Enseignement supérieur</b>	95,7	4,3	0,0	0,0	46
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	48,9	34,5	3,2	13,3	38
	<b>2001</b>	73,4	19,4	7,2	0,0	47
	<b>2004</b>	79,2	17,5	2,6	0,8	47
	<b>2008</b>	89,9	8,6	1,5	0,0	87
	<b>2013</b>	87,0	13,0	0,0	0,0	58
	<b>2018</b>	84,7	11,8	2,7	0,8	231

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 55. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	13,0	(10,1-15,9)	11,3	(8,7-14,6)	1092
	<b>Femme</b>	16,9	(14,2-19,7)	13,7	(11,4-16,2)	1291
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	6,6	(4,8-8,4)	6,5	(4,9-8,6)	1289
	<b>75 +</b>	24,6	(21,1-28,0)	24,1	(20,8-27,8)	1094
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	26,4	(20,5-32,3)	18,5	(13,5-24,9)	382
	<b>Secondaire inférieur</b>	18,4	(13,7-23,1)	14,7	(11,1-19,2)	507
	<b>Secondaire supérieur</b>	15,7	(11,6-19,8)	13,7	(10,5-17,8)	621
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,5	(4,3-8,7)	6,3	(4,5-8,8)	818
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	15,0	(9,8-20,2)	12,2	(8,0-18,2)	247
	<b>Brabant Flamand</b>	15,8	(8,0-23,5)	12,4	(7,6-19,6)	167
	<b>Flandre Occidentale</b>	14,8	(10,3-19,3)	11,9	(8,4-16,7)	266
	<b>Flandre Orientale</b>	14,2	(8,7-19,7)	11,3	(7,4-16,9)	190
	<b>Limbourg</b>	23,1	(11,4-34,7)	20,4	(12,7-31,1)	110
	<b>Bruxelles</b>	13,6	(10,1-17,1)	10,7	(8,0-14,3)	503
	<b>Brabant Wallon</b>	10,5	(3,0-17,9)	9,1	(4,4-17,9)	69
	<b>Hainaut</b>	17,7	(11,6-23,8)	15,1	(10,1-22,0)	223
	<b>Liège</b>	10,8	(4,7-16,8)	8,4	(4,6-14,8)	162
	<b>Luxembourg</b>	15,9	(6,1-25,8)	13,0	(6,3-24,8)	104
	<b>Namur</b>	15,4	(7,9-22,8)	12,7	(7,6-20,3)	111
	<b>Communauté Germanophone</b>	15,3	(10,2-20,5)	12,0	(8,1-17,2)	231
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	18,9	(15,4-22,5)	18,1	(14,7-22,0)	1588
	<b>2001</b>	20,5	(17,8-23,2)	17,4	(15,1-20,1)	1980
	<b>2004</b>	19,3	(17,2-21,5)	16,7	(14,8-18,7)	3059
	<b>2008</b>	14,8	(13,0-16,7)	11,7	(10,1-13,4)	2820
	<b>2013</b>	16,4	(14,3-18,5)	13,0	(11,3-15,0)	2025
	<b>2018</b>	15,2	(13,2-17,3)	12,4	(10,7-14,3)	2383

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 56. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	14,1	(6,8-21,5)	11,3	(5,8-20,7)	109
	<b>Femme</b>	16,3	(9,4-23,2)	12,4	(7,2-20,4)	122
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	5,9	(1,0-10,8)	5,9	(2,5-13,2)	118
	<b>75 +</b>	24,1	(15,6-32,7)	24,0	(16,5-33,5)	113
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	23,2	(10,4-36,0)	17,0	(7,5-34,0)	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	19,2	(7,9-30,6)	15,9	(7,6-30,3)	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,2	(0,0-14,7)	8,3	(3,0-21,2)	40
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,3	(0,0-9,8)	4,6	(1,3-14,8)	46
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	51,1	(26,4-75,7)	53,6	(27,3-78,1)	38
	<b>2001</b>	26,6	(9,3-44,0)	22,3	(11,3-39,1)	47
	<b>2004</b>	20,8	(8,1-33,5)	18,6	(8,5-36,1)	47
	<b>2008</b>	10,1	(2,5-17,6)	7,7	(3,3-16,8)	87
	<b>2013</b>	13,0	(1,7-24,3)	10,1	(3,6-25,4)	58
	<b>2018</b>	15,3	(10,2-20,5)	11,8	(7,7-17,7)	231

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 57. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, Enquête de santé 2018 - Belgique

IL_6		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	33,9	(30,1-37,7)	33,6	(29,8-37,7)	1090
	<b>Femme</b>	36,3	(32,9-39,8)	34,1	(30,7-37,7)	1291
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	23,1	(20,0-26,2)	23,1	(20,1-26,4)	1288
	<b>75 +</b>	48,4	(44,5-52,3)	48,4	(44,4-52,3)	1093
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	53,4	(46,8-60,1)	47,3	(40,3-54,4)	382
	<b>Secondaire inférieur</b>	40,4	(34,8-46,1)	38,2	(32,6-44,2)	507
	<b>Secondaire supérieur</b>	34,2	(29,3-39,1)	33,6	(28,9-38,7)	621
	<b>Enseignement supérieur</b>	22,9	(19,0-26,8)	24,0	(20,0-28,4)	817
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	34,6	(28,0-41,3)	33,1	(26,7-40,2)	247
	<b>Brabant Flamand</b>	29,9	(21,5-38,3)	27,5	(20,5-35,8)	167
	<b>Flandre Occidentale</b>	40,3	(33,2-47,4)	39,1	(32,4-46,2)	265
	<b>Flandre Orientale</b>	39,1	(31,5-46,7)	37,6	(30,0-45,8)	190
	<b>Limbourg</b>	42,8	(30,4-55,2)	42,6	(31,4-54,5)	110
	<b>Bruxelles</b>	32,8	(27,9-37,6)	30,9	(26,3-35,9)	503
	<b>Brabant Wallon</b>	38,0	(24,1-51,9)	38,7	(24,8-54,7)	69
	<b>Hainaut</b>	34,1	(26,4-41,9)	33,3	(25,5-42,2)	222
	<b>Liège</b>	33,3	(24,5-42,1)	31,6	(23,2-41,5)	162
	<b>Luxembourg</b>	25,6	(14,9-36,4)	23,8	(16,0-33,9)	104
	<b>Namur</b>	21,7	(13,4-30,1)	20,1	(13,4-29,0)	111
	<b>Communauté Germanophone</b>	43,8	(35,7-52,0)	41,9	(34,0-50,2)	231
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	35,3	(32,7-37,9)	,	,	2381

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 58. Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_6		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	41,8	(31,8-51,8)	40,6	(30,8-51,2)	109
	<b>Femme</b>	45,4	(35,1-55,7)	43,0	(33,0-53,6)	122
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	29,6	(19,5-39,7)	29,5	(20,6-40,4)	118
	<b>75 +</b>	57,1	(46,0-68,2)	56,9	(45,8-67,4)	113
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	54,8	(38,5-71,0)	48,7	(32,7-65,0)	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	48,4	(31,2-65,6)	45,7	(29,8-62,6)	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	28,7	(10,5-46,9)	32,2	(16,9-52,6)	40
	<b>Enseignement supérieur</b>	35,6	(19,1-52,2)	38,7	(23,5-56,4)	46
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	43,8	(35,7-52,0)	,	,	231

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 59. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_7		Pas d'incapacités	Incapacités modérées	Incapacités sévères	N
SEXE	Homme	78,5	10,7	10,8	1090
	Femme	67,7	14,8	17,5	1291
GROUPE D'AGE	65 - 74	85,3	9,0	5,7	1288
	75 +	58,5	17,3	24,2	1093
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	56,2	17,5	26,3	382
	Secondaire inférieur	68,1	13,8	18,0	507
	Secondaire supérieur	71,9	13,8	14,3	621
	Enseignement supérieur	84,3	9,6	6,0	817
PROVINCE	Anvers	72,1	11,9	16,0	247
	Brabant Flamand	76,1	9,6	14,3	167
	Flandre Occidentale	70,9	10,5	18,6	265
	Flandre Orientale	71,1	15,5	13,3	190
	Limbourg	68,5	10,3	21,2	110
	Bruxelles	73,9	15,6	10,5	503
	Brabant Wallon	72,8	15,3	11,9	69
	Hainaut	72,2	13,0	14,8	222
	Liège	76,2	12,8	11,0	162
	Luxembourg	67,6	24,7	7,7	104
	Namur	71,6	19,6	8,9	111
	Communauté Germanophone	72,9	10,1	16,9	231
ANNEE	2008	68,5	13,0	18,5	2852
	2013	71,2	12,1	16,7	2024
	2018	72,4	13,0	14,6	2381

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 60. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_7		Pas d'incapacités	Incapacités modérées	Incapacités sévères	N
SEXE	Homme	81,0	8,6	10,3	109
	Femme	66,6	11,3	22,1	122
GROUPE D'AGE	65 - 74	87,0	1,5	11,5	118
	75 +	59,8	18,2	22,0	113
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	62,1	17,3	20,5	59
	Secondaire inférieur	71,8	6,5	21,7	63
	Secondaire supérieur	82,5	6,4	11,1	40
	Enseignement supérieur	80,8	7,8	11,4	46
ANNEE	2008	79,7	15,8	4,5	87
	2013	71,7	9,6	18,7	58
	2018	72,9	10,1	16,9	231

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 61. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Belgique

IL_7		Pas d'incapacités	Incapacités modérées	Incapacités sévères	N
SEXE	Homme	78,5	10,7	10,8	1090
	Femme	67,7	14,8	17,5	1291
GROUPE D'AGE	65 - 74	85,3	9,0	5,7	1288
	75 +	58,5	17,3	24,2	1093
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	56,2	17,5	26,3	382
	Secondaire inférieur	68,1	13,8	18,0	507
	Secondaire supérieur	71,9	13,8	14,3	621
	Enseignement supérieur	84,3	9,6	6,0	817
PROVINCE	Anvers	72,1	11,9	16,0	247
	Brabant Flamand	76,1	9,6	14,3	167
	Flandre Occidentale	70,9	10,5	18,6	265
	Flandre Orientale	71,1	15,5	13,3	190
	Limbourg	68,5	10,3	21,2	110
	Bruxelles	73,9	15,6	10,5	503
	Brabant Wallon	72,8	15,3	11,9	69
	Hainaut	72,2	13,0	14,8	222
	Liège	76,2	12,8	11,0	162
	Luxembourg	67,6	24,7	7,7	104
	Namur	71,6	19,6	8,9	111
	Communauté Germanophone	72,9	10,1	16,9	231
ANNEE	2008	68,5	13,0	18,5	2852
	2013	71,2	12,1	16,7	2024
	2018	72,4	13,0	14,6	2381

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 62. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

<b>IL_7</b>		<b>Pas d'incapacités</b>	<b>Incapacités modérées</b>	<b>Incapacités sévères</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	81,0	8,6	10,3	109
	<b>Femme</b>	66,6	11,3	22,1	122
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	87,0	1,5	11,5	118
	<b>75 +</b>	59,8	18,2	22,0	113
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	62,1	17,3	20,5	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	71,8	6,5	21,7	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	82,5	6,4	11,1	40
	<b>Enseignement supérieur</b>	80,8	7,8	11,4	46
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	79,7	15,8	4,5	87
	<b>2013</b>	71,7	9,6	18,7	58
	<b>2018</b>	72,9	10,1	16,9	231

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 63. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activités élémentaires du quotidien, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_8		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	21,5	(18,0-24,9)	20,0	(16,8-23,7)	1090
	<b>Femme</b>	32,3	(28,9-35,7)	29,1	(25,7-32,6)	1291
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	14,7	(12,0-17,4)	14,3	(11,8-17,2)	1288
	<b>75 +</b>	41,5	(37,5-45,5)	40,2	(36,3-44,3)	1093
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	43,8	(36,8-50,8)	34,4	(27,4-42,1)	382
	<b>Secondaire inférieur</b>	31,9	(26,2-37,5)	27,0	(22,2-32,6)	507
	<b>Secondaire supérieur</b>	28,1	(23,2-32,9)	26,0	(21,7-30,8)	621
	<b>Enseignement supérieur</b>	15,7	(12,1-19,2)	15,7	(12,2-19,9)	817
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	27,9	(20,6-35,1)	24,8	(18,1-32,8)	247
	<b>Brabant Flamand</b>	23,9	(15,6-32,2)	19,9	(13,9-27,7)	167
	<b>Flandre Occidentale</b>	29,1	(22,4-35,7)	25,7	(19,9-32,5)	265
	<b>Flandre Orientale</b>	28,9	(21,7-36,1)	25,3	(18,7-33,2)	190
	<b>Limbourg</b>	31,5	(20,1-43,0)	29,2	(21,1-38,9)	110
	<b>Bruxelles</b>	26,1	(21,5-30,6)	22,3	(18,3-26,8)	503
	<b>Brabant Wallon</b>	27,2	(14,1-40,3)	26,2	(14,4-43,0)	69
	<b>Hainaut</b>	27,8	(20,7-35,0)	25,1	(18,2-33,4)	222
	<b>Liège</b>	23,8	(15,2-32,4)	20,1	(13,6-28,8)	162
	<b>Luxembourg</b>	32,4	(21,1-43,7)	29,3	(19,9-40,8)	104
	<b>Namur</b>	28,4	(17,1-39,7)	25,2	(15,8-37,7)	111
	<b>Communauté Germanophone</b>	27,1	(19,8-34,3)	22,9	(16,9-30,3)	231
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	31,5	(28,9-34,1)	27,3	(24,7-30,0)	2852
	<b>2013</b>	28,8	(26,0-31,7)	24,6	(21,9-27,4)	2024
	<b>2018</b>	27,6	(25,1-30,2)	24,0	(21,6-26,6)	2381

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 64. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activités élémentaires du quotidien, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_8		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	19,0	(10,6-27,4)	16,1	(9,1-26,7)	109
	<b>Femme</b>	33,4	(23,3-43,5)	29,0	(20,1-40,0)	122
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	13,0	(5,2-20,9)	12,2	(6,3-22,3)	118
	<b>75 +</b>	40,2	(29,8-50,6)	38,4	(28,8-49,1)	113
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	37,9	(22,7-53,1)	26,1	(15,4-40,6)	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	28,2	(13,8-42,5)	22,4	(11,7-38,7)	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,5	(1,5-33,5)	20,9	(8,3-43,5)	40
	<b>Enseignement supérieur</b>	19,2	(4,8-33,6)	21,6	(9,0-43,2)	46
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	20,3	(9,6-31,0)	15,3	(8,3-26,5)	87
	<b>2013</b>	28,3	(13,2-43,4)	23,0	(12,0-39,3)	58
	<b>2018</b>	27,1	(19,8-34,3)	20,7	(14,1-29,3)	231

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 65. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_9		Pas d'incapacités	Incapacités modérées	Incapacités sévères	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	64,5	12,2	23,2	1084
	<b>Femme</b>	45,6	17,5	36,9	1287
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	70,9	13,4	15,7	1286
	<b>75 +</b>	35,3	17,1	47,6	1085
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	32,3	15,5	52,2	378
	<b>Secondaire inférieur</b>	46,9	16,1	37,0	502
	<b>Secondaire supérieur</b>	54,5	15,5	30,0	621
	<b>Enseignement supérieur</b>	69,0	14,0	17,0	817
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	53,0	12,6	34,4	245
	<b>Brabant Flamand</b>	52,3	24,5	23,1	167
	<b>Flandre Occidentale</b>	43,2	20,1	36,7	265
	<b>Flandre Orientale</b>	47,5	19,9	32,6	190
	<b>Limbourg</b>	48,5	10,6	40,9	109
	<b>Bruxelles</b>	56,2	13,1	30,7	502
	<b>Brabant Wallon</b>	61,3	8,2	30,5	69
	<b>Hainaut</b>	63,1	12,6	24,3	222
	<b>Liège</b>	61,1	9,7	29,3	162
	<b>Luxembourg</b>	59,4	14,5	26,1	101
	<b>Namur</b>	68,7	10,5	20,8	109
	<b>Communauté Germanophone</b>	55,3	11,6	33,0	230
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	53,2	12,2	34,6	2009
	<b>2018</b>	53,8	15,2	31,0	2371

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 66. Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_9		Pas d'incapacités	Incapacités modérées	Incapacités sévères	N
SEXE	Homme	64,4	8,3	27,3	108
	Femme	48,4	14,2	37,4	122
GROUPE D'AGE	65 - 74	77,3	9,0	13,7	118
	75 +	34,5	14,1	51,3	112
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	29,2	16,0	54,8	59
	Secondaire inférieur	59,1	11,4	29,5	62
	Secondaire supérieur	72,0	7,3	20,7	40
	Enseignement supérieur	70,9	13,5	15,6	46
ANNEE	2013	52,5	17,7	29,8	58
	2018	55,3	11,6	33,0	230

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 67. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Belgique**

IL_10		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	35,5	(31,7-39,2)	34,9	(31,1-38,8)	1084
	<b>Femme</b>	54,4	(50,8-57,9)	53,3	(49,6-57,1)	1287
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	29,1	(25,8-32,4)	28,1	(24,9-31,5)	1286
	<b>75 +</b>	64,7	(60,8-68,7)	63,5	(59,3-67,5)	1085
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	67,7	(61,2-74,3)	59,7	(51,8-67,2)	378
	<b>Secondaire inférieur</b>	53,1	(47,2-58,9)	49,0	(42,8-55,2)	502
	<b>Secondaire supérieur</b>	45,5	(39,7-51,3)	44,6	(39,0-50,3)	621
	<b>Enseignement supérieur</b>	31,0	(26,6-35,4)	32,3	(27,6-37,4)	817
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	47,0	(39,3-54,7)	45,1	(36,8-53,6)	245
	<b>Brabant Flamand</b>	47,7	(36,1-59,3)	44,5	(33,7-55,9)	167
	<b>Flandre Occidentale</b>	56,8	(49,2-64,5)	56,5	(48,0-64,7)	265
	<b>Flandre Orientale</b>	52,5	(44,0-61,1)	51,0	(41,8-60,1)	190
	<b>Limbourg</b>	51,5	(39,0-64,0)	51,6	(41,0-62,1)	109
	<b>Bruxelles</b>	43,8	(38,6-49,0)	40,3	(34,8-45,9)	502
	<b>Brabant Wallon</b>	38,7	(23,6-53,7)	38,8	(23,0-57,3)	69
	<b>Hainaut</b>	36,9	(29,9-43,8)	33,9	(27,1-41,5)	222
	<b>Liège</b>	38,9	(30,0-47,9)	34,8	(27,1-43,5)	162
	<b>Luxembourg</b>	40,6	(26,5-54,7)	38,4	(26,5-51,8)	101
	<b>Namur</b>	31,3	(21,1-41,5)	27,4	(18,3-38,8)	109
	<b>Communauté Germanophone</b>	44,7	(36,7-52,7)	40,9	(33,3-48,9)	230
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	46,8	(43,7-49,9)	43,7	(40,4-47,1)	2009
	<b>2018</b>	46,2	(43,3-49,1)	44,0	(41,0-47,0)	2371

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 68. Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IL_10		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	35,6	(25,9-45,3)	32,2	(22,4-43,9)	108
	<b>Femme</b>	51,6	(41,3-61,9)	48,5	(37,6-59,5)	122
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>65 - 74</b>	22,7	(13,4-31,9)	21,8	(13,9-32,4)	118
	<b>75 +</b>	65,5	(55,7-75,3)	64,6	(54,3-73,7)	112
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	70,8	(57,5-84,2)	60,2	(44,2-74,3)	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	40,9	(25,7-56,0)	34,4	(21,2-50,5)	62
	<b>Secondaire supérieur</b>	28,0	(9,3-46,7)	34,3	(17,2-56,8)	40
	<b>Enseignement supérieur</b>	29,1	(14,1-44,0)	33,6	(18,6-52,9)	46
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	47,5	(32,5-62,6)	46,2	(32,0-60,9)	58
	<b>2018</b>	44,7	(36,7-52,7)	41,0	(33,1-49,3)	230

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 5. Douleur physique

L'enquête de santé a examiné l'impact de la douleur physique sur la vie quotidienne de la population âgée de 15 ans et plus à partir de deux questions du SF-36<sup>1</sup> : l'une se rapportant à l'importance (ou l'intensité) de la douleur ressentie, et l'autre à la gêne qu'elle occasionne. Un score de douleur physique est calculé à partir de la combinaison de ces deux questions. Ce score dépeint le niveau de gêne lié à la douleur physique au sein de la population. Pour en faciliter l'interprétation, ce score a été inversé dans ce rapport, de sorte qu'un score élevé corresponde à des douleurs physiques très inconfortables et un score faible, à l'absence de douleur.

En Communauté Germanophone en 2018, le score moyen de douleur est de 23,8 (sur une échelle allant de 0 à 100) au sein de la population âgée de 15 ans et plus.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Le plus haut score est observé dans le groupe d'âge de 45-64 ans (28,6).

Concernant le niveau d'éducation, le plus haut score est observé chez les personnes ayant un niveau d'instruction du 'secondaire inférieur' (31,2).

Le score de douleur physique en Communauté Germanophone chez les 15 ans et plus :

- est, avec Anvers (23,4) et le Brabant Flamand (23,1), le plus bas en comparaison des autres provinces ;
- est plus haut qu'en 1997 (18,5) mais plus bas qu'en 2013 (29,3), mais ces différences ne sont pas significatives après ajustement pour l'âge et le sexe.

---

<sup>1</sup> Le SF-36 est un questionnaire validé qui mesure l'état de santé selon un certain nombre de dimensions

**Tableau B 69. Score moyen de douleur physique mesuré par le SF-36 au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Belgique**

PI_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	22,7	(21,6-23,9)	22,7	(21,5-23,8)	4187
	<b>Femme</b>	30,4	(29,3-31,5)	29,9	(28,8-31,0)	4639
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	16,9	(14,8-19,0)	17,1	(14,9-19,2)	795
	<b>25 - 44</b>	22,9	(21,5-24,3)	22,9	(21,5-24,4)	2643
	<b>45 - 64</b>	29,9	(28,5-31,3)	29,9	(28,5-31,3)	3176
	<b>65 +</b>	31,8	(30,1-33,4)	31,4	(29,7-33,0)	2212
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	38,6	(35,0-42,1)	36,6	(33,0-40,2)	638
	<b>Secondaire inférieur</b>	30,2	(27,9-32,5)	28,4	(26,1-30,8)	1123
	<b>Secondaire supérieur</b>	28,0	(26,5-29,5)	28,0	(26,5-29,5)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	23,3	(22,2-24,4)	23,4	(22,3-24,4)	4250
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	23,4	(21,3-25,6)	23,0	(20,9-25,2)	893
	<b>Brabant Flamand</b>	23,1	(20,5-25,8)	22,8	(20,3-25,2)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	26,4	(24,2-28,6)	25,5	(23,4-27,7)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	26,5	(24,2-28,7)	26,2	(24,1-28,3)	752
	<b>Limbourg</b>	28,2	(24,8-31,7)	27,6	(24,1-31,1)	315
	<b>Bruxelles</b>	24,1	(22,8-25,5)	24,7	(23,4-26,1)	2292
	<b>Brabant Wallon</b>	28,2	(23,6-32,7)	28,2	(23,9-32,4)	283
	<b>Hainaut</b>	30,9	(28,3-33,6)	30,8	(28,2-33,4)	877
	<b>Liège</b>	33,0	(29,8-36,3)	32,4	(29,1-35,7)	523
	<b>Luxembourg</b>	26,1	(23,0-29,2)	25,8	(22,8-28,7)	379
	<b>Namur</b>	24,0	(20,4-27,6)	23,2	(19,8-26,6)	359
	<b>Communauté Germanophone</b>	23,8	(21,3-26,2)	23,5	(21,0-25,9)	769
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	23,0	(22,2-23,9)	24,3	(23,5-25,2)	7634
	<b>2008</b>	24,3	(23,4-25,2)	24,3	(23,4-25,2)	8300
	<b>2013</b>	23,1	(22,2-24,0)	22,9	(22,0-23,8)	7895
	<b>2018</b>	26,7	(25,9-27,5)	26,4	(25,6-27,2)	8826

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 70. Score moyen de douleur physique mesuré par le SF-36 au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PI_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	22,8	(19,3-26,3)	22,5	(19,1-25,9)	383
	<b>Femme</b>	24,7	(21,3-28,0)	24,3	(21,0-27,5)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	17,0	(10,2-23,8)	17,1	(10,4-23,7)	86
	<b>25 - 44</b>	21,0	(16,1-25,8)	21,0	(16,2-25,8)	178
	<b>45 - 64</b>	28,6	(24,5-32,7)	28,6	(24,5-32,7)	290
	<b>65 +</b>	23,0	(18,5-27,5)	22,9	(18,5-27,4)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	28,2	(19,4-37,1)	29,4	(20,3-38,4)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	31,2	(24,7-37,7)	30,1	(23,4-36,8)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	26,1	(21,7-30,5)	26,0	(21,7-30,3)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	18,7	(15,0-22,5)	18,4	(14,6-22,1)	302
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	18,5	(15,0-21,9)	19,5	(16,1-22,9)	235
	<b>2008</b>	23,5	(18,7-28,3)	22,8	(18,2-27,4)	191
	<b>2013</b>	29,3	(23,9-34,7)	29,0	(23,6-34,4)	249
	<b>2018</b>	23,8	(21,3-26,2)	23,6	(21,2-26,0)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

## 6. Qualité de vie liée à la santé

La qualité de vie liée à la santé (QdVS) est un concept complexe et multidimensionnel qui va au-delà des indicateurs traditionnels de morbidité et de mortalité pour mesurer les conséquences de l'état de santé. En 2018, l'enquête de santé intègre pour la seconde fois le EQ-5D, une échelle de qualité de vie standardisée. Il s'agit d'un questionnaire simple et rapide qui permet d'évaluer la qualité de vie selon cinq dimensions : mobilité, autonomie personnelle, activités courantes, douleurs/gêne et anxiété/dépression. Sur la base des réponses relatives aux cinq dimensions, il est possible d'attribuer à chaque répondant un score de QdVS où 1 représente la meilleure QdVS possible.

### 6.1. SCORE DE QUALITÉ DE VIE LIÉE À LA SANTÉ

En Communauté Germanophone, le score EQ-5D moyen au sein de la population âgée de 15 ans et plus est de 0,82, ce qui est plus élevé que la moyenne belge (0,79). Par rapport aux provinces, le score de QdVS en Communauté Germanophone est comparable aux scores des autres provinces flamandes et plus élevé que les scores de Bruxelles (0,79) et des provinces wallonnes (scores variant entre 0,74 et 0,77).

Les hommes rapportent un meilleur score de QdVS que les femmes (0,84 contre 0,80), les jeunes rapportent un meilleur score que les plus âgés (0,89 contre des taux allant de 0,85 à 0,76), et les personnes les plus éduquées rapportent un meilleur score que les moins éduquées (0,85 contre des scores allant de 0,72 à 0,76 pour les personnes ayant tout au plus un diplôme du secondaire inférieur).

Au niveau national, le score de QdVS moyen a significativement diminué de 0,81 en 2013 à 0,79 en 2018, mais en Communauté Germanophone, le score est resté stable entre les deux enquêtes.

### 6.2. DIMENSIONS DE QUALITÉ DE VIE

Au niveau national, les problèmes les plus souvent rapportés en 2018 par la population âgée de 15 ans et plus concernent les douleurs/gêne (56,2%) et l'anxiété/dépression (31,5%). En Communauté Germanophone, les problèmes les plus fréquents sont aussi les douleurs/gêne (54,2%) et l'anxiété/dépression (23,3%), mais avec un taux d'anxiété/dépression significativement moins élevée que la moyenne nationale. La proportion de personnes rapportant des problèmes d'anxiété/dépression en Communauté Germanophone est comparable aux taux des provinces flamandes (taux variant entre 20,8% et 24,9%), mais significativement moins élevée que les taux de Bruxelles (39,7%) et des provinces wallonnes (taux variant entre 41,5% et 49,0%).

Les problèmes les moins souvent rapportés concernent l'autonomie de la personne avec une proportion de 6,0% de la population de 15 ans et plus. Comme c'est le cas pour le niveau national, en Communauté Germanophone aussi, les problèmes les moins souvent rapportés concernent l'autonomie de la personne (3,8%), avec un taux significativement moins élevé que la moyenne nationale.

Tableau B 71. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes de mobilité selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique

QL01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,5	(14,9-18,2)	14,7	(13,0-16,5)	3691
	<b>Femme</b>	21,9	(20,2-23,6)	19,0	(17,3-20,9)	4104
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,1	(5,5-12,7)	9,1	(6,0-13,4)	719
	<b>25 - 44</b>	9,1	(7,5-10,7)	9,0	(7,6-10,7)	2293
	<b>45 - 64</b>	18,9	(17,0-20,8)	18,8	(16,9-20,8)	2865
	<b>65 +</b>	39,4	(36,5-42,4)	39,0	(36,1-42,0)	1918
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	46,1	(39,8-52,4)	32,6	(26,7-39,1)	452
	<b>Secondaire inférieur</b>	29,9	(26,0-33,8)	21,4	(18,3-24,9)	942
	<b>Secondaire supérieur</b>	21,8	(19,4-24,3)	20,2	(17,7-23,0)	2331
	<b>Enseignement supérieur</b>	12,3	(10,9-13,8)	11,9	(10,5-13,5)	3922
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	15,3	(12,2-18,3)	13,0	(10,3-16,2)	830
	<b>Brabant Flamand</b>	13,6	(10,2-16,9)	11,5	(8,9-14,7)	504
	<b>Flandre Occidentale</b>	21,6	(18,1-25,2)	17,0	(14,2-20,2)	812
	<b>Flandre Orientale</b>	16,6	(13,5-19,8)	14,3	(11,7-17,4)	703
	<b>Limbourg</b>	23,5	(17,3-29,6)	19,5	(14,4-25,8)	290
	<b>Bruxelles</b>	19,4	(17,3-21,4)	18,9	(16,8-21,1)	1774
	<b>Brabant Wallon</b>	16,9	(11,7-22,2)	14,7	(10,9-19,5)	255
	<b>Hainaut</b>	25,0	(21,0-28,9)	23,2	(19,4-27,5)	793
	<b>Liège</b>	21,8	(16,5-27,2)	18,6	(13,7-24,8)	477
	<b>Luxembourg</b>	25,8	(19,5-32,0)	23,5	(18,2-29,7)	338
	<b>Namur</b>	20,3	(14,7-25,9)	17,1	(12,5-22,9)	315
	<b>Communauté Germanophone</b>	21,2	(17,5-24,9)	18,8	(15,5-22,6)	704
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	18,5	(17,2-19,9)	15,9	(14,6-17,3)	6286
	<b>2018</b>	19,3	(18,1-20,6)	16,6	(15,3-18,0)	7795

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 72. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes de mobilité selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

QL01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	19,1	(14,4-23,7)	17,5	(12,8-23,5)	352
	<b>Femme</b>	23,2	(18,1-28,3)	20,5	(15,8-26,3)	352
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	11,1	(1,9-20,2)	11,1	(4,7-23,8)	83
	<b>25 - 44</b>	10,2	(4,6-15,8)	10,2	(5,8-17,2)	159
	<b>45 - 64</b>	21,9	(16,5-27,3)	21,8	(16,9-27,7)	277
	<b>65 +</b>	41,2	(32,8-49,6)	41,0	(33,0-49,4)	185
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	53,2	(37,9-68,5)	42,1	(28,5-57,1)	60
	<b>Secondaire inférieur</b>	32,7	(22,7-42,6)	26,2	(17,6-36,9)	118
	<b>Secondaire supérieur</b>	14,4	(8,1-20,8)	14,2	(8,8-22,0)	204
	<b>Enseignement supérieur</b>	15,9	(10,8-21,1)	16,6	(11,5-23,3)	277
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	24,7	(17,4-32,0)	23,3	(17,1-31,0)	210
	<b>2018</b>	21,2	(17,5-24,9)	19,7	(16,0-24,0)	704

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 73. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes d'autonomie selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique

QL02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,2	(4,1-6,2)	4,1	(3,2-5,3)	3633
	<b>Femme</b>	6,7	(5,7-7,7)	5,0	(4,1-6,0)	4047
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	3,2	(0,7-5,7)	3,2	(1,5-6,9)	714
	<b>25 - 44</b>	1,8	(1,2-2,5)	1,8	(1,3-2,6)	2286
	<b>45 - 64</b>	5,3	(4,2-6,4)	5,3	(4,3-6,5)	2816
	<b>65 +</b>	14,3	(12,1-16,5)	14,1	(12,1-16,4)	1864
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	22,7	(17,4-28,1)	13,4	(10,0-17,8)	455
	<b>Secondaire inférieur</b>	10,7	(7,7-13,7)	6,8	(4,9-9,3)	919
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,8	(5,4-8,2)	5,7	(4,5-7,3)	2291
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,5	(1,9-3,1)	2,3	(1,8-3,0)	3869
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	5,9	(3,7-8,1)	4,6	(3,1-6,9)	826
	<b>Brabant Flamand</b>	3,1	(1,5-4,8)	2,4	(1,4-4,1)	496
	<b>Flandre Occidentale</b>	7,8	(5,5-10,0)	5,4	(3,9-7,3)	805
	<b>Flandre Orientale</b>	4,2	(2,4-5,9)	3,2	(2,0-5,0)	689
	<b>Limbourg</b>	9,6	(5,3-13,9)	7,3	(4,6-11,4)	277
	<b>Bruxelles</b>	5,5	(4,4-6,7)	4,9	(3,9-6,1)	1764
	<b>Brabant Wallon</b>	5,1	(2,1-8,1)	3,8	(2,2-6,7)	250
	<b>Hainaut</b>	5,5	(3,7-7,3)	4,4	(3,1-6,2)	777
	<b>Liège</b>	8,1	(4,9-11,2)	6,1	(3,8-9,6)	466
	<b>Luxembourg</b>	5,9	(3,1-8,7)	4,5	(2,7-7,5)	331
	<b>Namur</b>	8,5	(4,9-12,1)	6,4	(4,0-10,2)	311
	<b>Communauté Germanophone</b>	3,8	(2,2-5,3)	2,9	(1,9-4,5)	688
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	6,9	(6,0-7,8)	5,1	(4,3-6,0)	6280
	<b>2018</b>	6,0	(5,2-6,7)	4,4	(3,7-5,2)	7680

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 74. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes d'autonomie selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

QL02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,6	(2,1-7,1)	3,6	(2,0-6,4)	345
	<b>Femme</b>	3,0	(1,1-4,9)	2,2	(1,1-4,5)	343
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,2	(0,0-0,7)	0,2	(0,0-1,6)	83
	<b>25 - 44</b>	3,6	(0,0-7,5)	3,5	(1,2-10,2)	158
	<b>45 - 64</b>	3,5	(1,1-5,8)	3,4	(1,7-6,4)	274
	<b>65 +</b>	7,2	(3,5-10,9)	7,2	(4,2-11,9)	173
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,5	(0,9-14,0)	4,5	(1,6-12,0)	61
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,0	(2,5-15,4)	6,7	(2,6-16,4)	114
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,3	(0,7-5,8)	2,7	(1,3-5,8)	198
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,4	(0,0-3,2)	1,2	(0,3-3,9)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	5,6	(1,6-9,6)	4,9	(2,4-10,0)	209
	<b>2018</b>	3,8	(2,2-5,3)	3,3	(2,1-5,3)	688

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 75. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes pour accomplir leurs activités courantes selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique**

QL03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	15,3	(13,7-16,9)	14,4	(12,8-16,2)	3628
	<b>Femme</b>	23,2	(21,5-25,0)	21,5	(19,7-23,4)	4042
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,9	(7,3-14,5)	10,8	(7,6-15,0)	714
	<b>25 - 44</b>	11,5	(9,7-13,3)	11,3	(9,7-13,2)	2281
	<b>45 - 64</b>	20,9	(18,8-23,0)	20,6	(18,5-22,8)	2807
	<b>65 +</b>	32,6	(29,7-35,5)	31,9	(29,0-34,8)	1868
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	42,1	(35,7-48,4)	33,4	(27,4-40,1)	454
	<b>Secondaire inférieur</b>	30,1	(26,0-34,2)	24,6	(21,0-28,6)	923
	<b>Secondaire supérieur</b>	21,3	(18,8-23,7)	20,3	(17,8-23,0)	2285
	<b>Enseignement supérieur</b>	13,2	(11,7-14,8)	13,0	(11,5-14,6)	3863
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	16,8	(13,6-20,1)	15,3	(12,4-18,8)	827
	<b>Brabant Flamand</b>	11,6	(8,4-14,7)	10,3	(7,8-13,5)	497
	<b>Flandre Occidentale</b>	20,2	(16,6-23,9)	17,3	(14,3-20,8)	801
	<b>Flandre Orientale</b>	18,9	(15,5-22,3)	17,2	(14,2-20,6)	688
	<b>Limbourg</b>	25,9	(19,3-32,4)	23,6	(18,0-30,3)	276
	<b>Bruxelles</b>	17,3	(15,2-19,3)	17,0	(15,0-19,2)	1755
	<b>Brabant Wallon</b>	17,5	(11,8-23,2)	16,0	(11,3-22,3)	249
	<b>Hainaut</b>	22,2	(18,4-25,9)	20,9	(17,3-25,1)	778
	<b>Liège</b>	24,8	(19,3-30,3)	22,6	(17,5-28,7)	467
	<b>Luxembourg</b>	25,0	(18,8-31,1)	23,3	(18,0-29,5)	331
	<b>Namur</b>	22,3	(16,5-28,0)	20,2	(15,5-25,9)	311
	<b>Communauté Germanophone</b>	16,9	(13,7-20,2)	15,4	(12,5-18,7)	690
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	17,9	(16,6-19,2)	16,3	(15,1-17,7)	6281
	<b>2018</b>	19,4	(18,1-20,7)	17,8	(16,5-19,2)	7670

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 76. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes pour accomplir leurs activités courantes selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

QL03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	15,2	(10,7-19,8)	14,3	(10,0-20,2)	343
	<b>Femme</b>	18,6	(13,9-23,2)	16,8	(12,8-21,6)	347
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	6,7	(0,0-13,5)	6,6	(2,4-17,4)	82
	<b>25 - 44</b>	11,2	(5,3-17,2)	11,2	(6,5-18,6)	158
	<b>45 - 64</b>	16,9	(11,7-22,1)	16,8	(12,3-22,7)	273
	<b>65 +</b>	31,9	(23,9-39,9)	31,6	(24,4-39,9)	177
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	34,8	(20,4-49,3)	25,7	(15,5-39,4)	62
	<b>Secondaire inférieur</b>	25,1	(14,9-35,3)	20,4	(12,1-32,4)	117
	<b>Secondaire supérieur</b>	16,0	(10,1-21,8)	16,2	(11,1-23,1)	197
	<b>Enseignement supérieur</b>	11,6	(7,3-15,9)	12,2	(8,2-17,8)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	17,2	(10,7-23,8)	16,0	(10,6-23,3)	209
	<b>2018</b>	16,9	(13,7-20,2)	15,7	(12,5-19,5)	690

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 77. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des douleurs ou de la gêne selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique

QL04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	50,8	(48,5-53,1)	50,8	(48,4-53,3)	3628
	<b>Femme</b>	61,2	(59,2-63,2)	61,0	(58,8-63,1)	4047
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	37,7	(32,5-42,9)	37,8	(32,7-43,1)	711
	<b>25 - 44</b>	47,3	(44,4-50,2)	47,3	(44,4-50,2)	2284
	<b>45 - 64</b>	62,1	(59,5-64,8)	62,3	(59,5-64,9)	2808
	<b>65 +</b>	69,0	(66,2-71,9)	68,7	(65,8-71,5)	1872
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	72,3	(66,6-78,0)	67,6	(60,9-73,6)	457
	<b>Secondaire inférieur</b>	64,4	(60,0-68,8)	60,5	(55,9-64,9)	925
	<b>Secondaire supérieur</b>	58,9	(56,0-61,8)	59,3	(56,2-62,4)	2287
	<b>Enseignement supérieur</b>	50,9	(48,6-53,3)	51,8	(49,4-54,2)	3859
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	50,1	(46,0-54,2)	49,7	(45,3-54,0)	824
	<b>Brabant Flamand</b>	51,4	(45,5-57,3)	51,1	(45,1-57,0)	497
	<b>Flandre Occidentale</b>	54,6	(50,2-59,0)	52,8	(48,2-57,3)	806
	<b>Flandre Orientale</b>	54,1	(49,0-59,1)	53,8	(48,6-59,0)	688
	<b>Limbourg</b>	58,7	(51,5-66,0)	57,9	(49,9-65,6)	275
	<b>Bruxelles</b>	51,9	(49,2-54,7)	53,4	(50,6-56,3)	1758
	<b>Brabant Wallon</b>	61,5	(54,6-68,3)	62,4	(55,4-68,9)	251
	<b>Hainaut</b>	61,4	(56,8-65,9)	62,1	(57,4-66,6)	779
	<b>Liège</b>	66,8	(61,5-72,0)	66,6	(60,7-72,0)	468
	<b>Luxembourg</b>	63,0	(56,5-69,5)	63,2	(56,3-69,7)	329
	<b>Namur</b>	63,5	(56,8-70,1)	63,5	(56,9-69,6)	309
	<b>Communauté Germanophone</b>	54,2	(49,5-58,9)	54,0	(49,3-58,7)	691
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	50,1	(48,3-51,9)	49,5	(47,6-51,4)	6270
	<b>2018</b>	56,2	(54,5-57,8)	56,0	(54,3-57,7)	7675

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 78. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des douleurs ou de la gêne selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

QL04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	50,4	(43,8-56,9)	50,3	(43,7-56,9)	344
	<b>Femme</b>	57,8	(51,5-64,1)	57,3	(50,8-63,5)	347
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	32,2	(19,4-44,9)	32,2	(21,1-45,7)	82
	<b>25 - 44</b>	47,1	(38,5-55,6)	47,2	(38,8-55,7)	158
	<b>45 - 64</b>	60,8	(53,9-67,7)	60,9	(53,8-67,5)	275
	<b>65 +</b>	65,9	(58,1-73,7)	65,7	(57,4-73,0)	176
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	68,1	(56,1-80,1)	65,2	(52,0-76,4)	62
	<b>Secondaire inférieur</b>	67,8	(56,3-79,3)	63,8	(51,0-74,8)	116
	<b>Secondaire supérieur</b>	49,8	(40,2-59,4)	50,5	(41,4-59,6)	197
	<b>Enseignement supérieur</b>	50,1	(43,1-57,0)	51,2	(44,0-58,4)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	58,2	(49,5-66,8)	58,0	(49,0-66,5)	208
	<b>2018</b>	54,2	(49,5-58,9)	53,9	(49,2-58,5)	691

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 79. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir de l'anxiété ou de la dépression selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique**

QL05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	24,8	(22,8-26,8)	24,6	(22,7-26,7)	3626
	<b>Femme</b>	37,8	(35,8-39,7)	37,6	(35,6-39,6)	4039
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	27,4	(22,7-32,0)	27,2	(22,7-32,3)	713
	<b>25 - 44</b>	31,7	(29,1-34,4)	31,4	(28,7-34,3)	2283
	<b>45 - 64</b>	33,3	(31,0-35,6)	33,0	(30,7-35,3)	2803
	<b>65 +</b>	30,4	(27,6-33,2)	29,4	(26,7-32,3)	1866
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	38,8	(32,5-45,1)	39,1	(32,7-45,8)	454
	<b>Secondaire inférieur</b>	32,5	(28,3-36,8)	32,2	(27,9-36,7)	922
	<b>Secondaire supérieur</b>	31,9	(29,2-34,6)	31,4	(28,6-34,4)	2286
	<b>Enseignement supérieur</b>	30,2	(28,2-32,2)	29,3	(27,3-31,3)	3859
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	24,9	(21,1-28,7)	24,2	(20,6-28,2)	826
	<b>Brabant Flamand</b>	21,9	(17,7-26,2)	21,1	(17,2-25,7)	496
	<b>Flandre Occidentale</b>	20,8	(17,2-24,3)	20,2	(16,8-23,9)	801
	<b>Flandre Orientale</b>	22,3	(18,6-25,9)	21,5	(18,2-25,3)	685
	<b>Limbourg</b>	24,2	(17,5-30,8)	23,3	(17,4-30,4)	275
	<b>Bruxelles</b>	39,7	(37,1-42,4)	39,1	(36,5-41,9)	1763
	<b>Brabant Wallon</b>	46,0	(39,5-52,5)	46,2	(40,0-52,6)	251
	<b>Hainaut</b>	44,2	(39,8-48,5)	43,6	(39,3-48,0)	778
	<b>Liège</b>	49,0	(43,0-54,9)	48,3	(42,2-54,5)	462
	<b>Luxembourg</b>	43,0	(36,0-49,9)	42,4	(35,7-49,5)	329
	<b>Namur</b>	41,5	(34,5-48,6)	40,9	(34,1-48,1)	311
	<b>Communauté Germanophone</b>	23,3	(19,5-27,1)	22,5	(19,0-26,5)	688
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	26,5	(25,0-28,0)	25,8	(24,3-27,4)	6244
	<b>2018</b>	31,5	(30,0-33,0)	30,9	(29,4-32,5)	7665

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 80. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir de l'anxiété ou de la dépression selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

QL05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	17,3	(12,5-22,1)	17,3	(13,0-22,6)	344
	<b>Femme</b>	28,9	(23,2-34,7)	28,9	(23,5-35,0)	344
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	22,2	(10,5-33,8)	21,8	(12,2-35,8)	82
	<b>25 - 44</b>	23,4	(15,7-31,1)	23,1	(16,3-31,5)	158
	<b>45 - 64</b>	23,4	(17,8-29,0)	22,9	(17,9-28,9)	273
	<b>65 +</b>	23,5	(16,3-30,8)	22,4	(16,2-30,2)	175
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	26,9	(13,8-39,9)	28,2	(16,8-43,2)	62
	<b>Secondaire inférieur</b>	25,1	(14,7-35,6)	24,6	(15,2-37,2)	115
	<b>Secondaire supérieur</b>	20,8	(14,2-27,4)	19,4	(13,8-26,6)	197
	<b>Enseignement supérieur</b>	22,8	(16,7-28,9)	21,9	(16,3-28,7)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	27,3	(18,8-35,8)	26,5	(18,9-35,8)	208
	<b>2018</b>	23,3	(19,5-27,1)	22,8	(19,1-26,9)	688

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 81. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui ne déclare aucun problème de santé (état de santé 11111), Enquête de santé 2018 - Belgique

QL_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	41,8	(39,5-44,1)	41,2	(38,9-43,6)	3561
	<b>Femme</b>	30,5	(28,6-32,4)	30,3	(28,4-32,3)	3948
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	48,9	(43,7-54,2)	48,7	(43,4-53,9)	707
	<b>25 - 44</b>	43,6	(40,8-46,5)	43,5	(40,6-46,4)	2254
	<b>45 - 64</b>	31,7	(29,2-34,2)	31,5	(29,0-34,0)	2753
	<b>65 +</b>	24,7	(22,0-27,3)	24,8	(22,2-27,6)	1795
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	22,7	(17,4-28,1)	26,5	(20,9-33,0)	428
	<b>Secondaire inférieur</b>	28,1	(23,7-32,6)	30,9	(26,4-35,8)	884
	<b>Secondaire supérieur</b>	33,3	(30,6-36,0)	32,4	(29,6-35,3)	2238
	<b>Enseignement supérieur</b>	40,5	(38,2-42,9)	39,2	(36,8-41,6)	3817
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	43,2	(38,9-47,5)	42,8	(38,4-47,3)	800
	<b>Brabant Flamand</b>	43,4	(37,7-49,1)	43,1	(37,5-48,9)	485
	<b>Flandre Occidentale</b>	40,3	(35,8-44,8)	41,4	(36,9-46,1)	781
	<b>Flandre Orientale</b>	38,5	(33,6-43,4)	38,1	(33,3-43,1)	674
	<b>Limbourg</b>	35,1	(28,2-42,1)	35,4	(28,4-43,0)	269
	<b>Bruxelles</b>	37,1	(34,3-39,9)	35,1	(32,4-38,0)	1729
	<b>Brabant Wallon</b>	29,2	(22,6-35,9)	28,0	(22,2-34,7)	247
	<b>Hainaut</b>	28,6	(24,3-33,0)	27,5	(23,4-32,1)	760
	<b>Liège</b>	22,7	(18,0-27,3)	22,2	(17,9-27,3)	458
	<b>Luxembourg</b>	27,7	(21,8-33,7)	27,1	(21,6-33,3)	326
	<b>Namur</b>	27,4	(21,2-33,7)	27,1	(21,4-33,6)	306
	<b>Communauté Germanophone</b>	40,3	(35,6-45,1)	39,9	(35,2-44,8)	674
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	41,5	(39,7-43,4)	41,4	(39,5-43,3)	6190
	<b>2018</b>	36,0	(34,4-37,6)	35,5	(33,9-37,2)	7509

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 82. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui ne déclare aucun problème de santé (état de santé 11111), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

QL_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	45,3	(38,9-51,6)	44,8	(38,4-51,4)	339
	<b>Femme</b>	35,7	(29,4-41,9)	35,5	(29,5-41,9)	335
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	54,5	(41,6-67,5)	54,5	(41,5-66,8)	82
	<b>25 - 44</b>	49,9	(41,1-58,8)	49,9	(41,2-58,5)	157
	<b>45 - 64</b>	34,5	(27,8-41,2)	34,4	(28,1-41,4)	270
	<b>65 +</b>	27,9	(20,1-35,7)	28,0	(20,9-36,3)	165
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	20,2	(9,1-31,3)	21,5	(12,1-35,3)	55
	<b>Secondaire inférieur</b>	27,3	(15,2-39,4)	30,2	(18,7-44,8)	110
	<b>Secondaire supérieur</b>	45,4	(36,2-54,6)	45,0	(36,1-54,2)	197
	<b>Enseignement supérieur</b>	45,0	(37,8-52,3)	43,9	(36,8-51,4)	272
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	36,4	(27,7-45,2)	36,0	(27,7-45,3)	204
	<b>2018</b>	40,3	(35,6-45,1)	40,1	(35,4-44,9)	674

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 83. Score EQ-5D moyen au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Belgique

QL_2		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
SEXE	Homme	0,82	(0,81-0,83)	0,82	(0,81-0,83)	3561
	Femme	0,77	(0,76-0,78)	0,77	(0,76-0,78)	3948
GROUPE D'AGE	15 - 24	0,85	(0,83-0,88)	0,85	(0,83-0,87)	707
	25 - 44	0,83	(0,82-0,84)	0,83	(0,82-0,84)	2254
	45 - 64	0,78	(0,77-0,79)	0,78	(0,77-0,79)	2753
	65 +	0,72	(0,71-0,74)	0,72	(0,71-0,74)	1795
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	0,65	(0,61-0,69)	0,68	(0,64-0,72)	428
	Secondaire inférieur	0,74	(0,72-0,76)	0,76	(0,74-0,78)	884
	Secondaire supérieur	0,78	(0,77-0,79)	0,78	(0,76-0,79)	2238
	Enseignement supérieur	0,83	(0,82-0,84)	0,82	(0,81-0,83)	3817
PROVINCE	Anvers	0,82	(0,80-0,84)	0,82	(0,80-0,84)	800
	Brabant Flamand	0,84	(0,82-0,86)	0,84	(0,82-0,86)	485
	Flandre Occidentale	0,81	(0,79-0,83)	0,82	(0,80-0,84)	781
	Flandre Orientale	0,82	(0,81-0,84)	0,82	(0,81-0,84)	674
	Limbourg	0,78	(0,75-0,82)	0,79	(0,76-0,82)	269
	Bruxelles	0,79	(0,78-0,80)	0,78	(0,77-0,79)	1729
	Brabant Wallon	0,77	(0,75-0,80)	0,77	(0,75-0,80)	247
	Hainaut	0,74	(0,72-0,76)	0,74	(0,72-0,76)	760
	Liège	0,74	(0,71-0,76)	0,74	(0,71-0,77)	458
	Luxembourg	0,76	(0,73-0,79)	0,76	(0,73-0,79)	326
	Namur	0,75	(0,71-0,78)	0,75	(0,72-0,78)	306
	Communauté Germanophone	0,82	(0,81-0,84)	0,82	(0,80-0,84)	674
ANNEE	2013	0,81	(0,81-0,82)	0,81	(0,81-0,82)	6190
	2018	0,79	(0,79-0,80)	0,79	(0,79-0,80)	7509

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 84. Score EQ-5D moyen au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

QL_2		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	0,84	(0,82-0,86)	0,84	(0,82-0,86)	339
	<b>Femme</b>	0,80	(0,78-0,83)	0,80	(0,78-0,82)	335
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,89	(0,85-0,92)	0,89	(0,85-0,92)	82
	<b>25 - 44</b>	0,85	(0,81-0,88)	0,85	(0,81-0,88)	157
	<b>45 - 64</b>	0,81	(0,78-0,83)	0,81	(0,78-0,83)	270
	<b>65 +</b>	0,76	(0,73-0,80)	0,77	(0,73-0,80)	165
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,72	(0,67-0,77)	0,74	(0,69-0,79)	55
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,76	(0,71-0,81)	0,78	(0,72-0,83)	110
	<b>Secondaire supérieur</b>	0,84	(0,81-0,87)	0,84	(0,81-0,87)	197
	<b>Enseignement supérieur</b>	0,85	(0,82-0,87)	0,84	(0,82-0,87)	272
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	0,81	(0,78-0,84)	0,81	(0,78-0,84)	204
	<b>2018</b>	0,82	(0,81-0,84)	0,82	(0,81-0,84)	674

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

## 7. Arrêt de travail pour cause de problèmes personnels de santé

En 2018, l'enquête de santé a examiné le problème de l'absence au travail pour cause de maladie. Les données à ce sujet portent uniquement sur les répondants qui ont indiqué avoir une activité professionnelle. Dans la Communauté Germanophone, la moitié des personnes au travail (50,0%) a rapporté avoir manqué au moins un jour de travail au cours des 12 derniers mois en raison de problèmes de santé, un pourcentage plus élevé en comparaison aux résultats de l'ensemble du pays (41,7%). Une comparaison avec les résultats au niveau provincial indique que le pourcentage des personnes au travail ayant manqué au moins un jour de travail est plus élevé dans la Communauté Germanophone qu'ailleurs en Belgique.

Dans la Communauté, les femmes sont plus nombreuses (54,6%) que les hommes (45,5%) à rapporter une absence au travail d'au moins un jour pour des raisons de santé. Ce taux plus élevé chez les femmes est également observé pour l'ensemble du pays (45% des femmes contre 38,9% des hommes). A l'instar des résultats nationaux, les travailleurs plus jeunes indiquent plus fréquemment s'être absents du travail au moins un jour au cours des 12 derniers mois pour des raisons de santé que ceux dans la tranche d'âge de 45-64 ans.

En ce qui concerne le nombre moyen de jours d'absence du travail pour raisons de santé au cours des 12 mois précédant l'enquête, les résultats obtenus pour la Communauté Germanophone - 12,9 jours - sont similaires à ceux obtenus pour l'ensemble de la Belgique (12,3 jours en moyenne).

Tableau B 85. Pourcentage de la population active ayant rapporté une absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

AW01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	38,9	(36,2-41,7)	38,1	(35,0-41,3)	2441
	<b>Femme</b>	45,0	(42,1-47,8)	44,0	(40,8-47,3)	2224
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	37,0	(27,0-47,0)	37,3	(28,1-47,7)	186
	<b>25 - 44</b>	44,7	(41,8-47,7)	44,9	(42,0-47,9)	2257
	<b>45 - 64</b>	38,8	(35,8-41,8)	39,0	(36,0-42,1)	2222
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	36,3	(22,7-49,8)	37,4	(25,3-51,3)	113
	<b>Secondaire inférieur</b>	31,0	(24,1-38,0)	31,1	(24,4-38,6)	328
	<b>Secondaire supérieur</b>	45,5	(41,6-49,3)	45,0	(41,0-49,1)	1355
	<b>Enseignement supérieur</b>	41,1	(38,4-43,9)	40,0	(36,9-43,3)	2838
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	38,9	(33,6-44,2)	38,3	(33,1-43,8)	509
	<b>Brabant Flamand</b>	43,3	(35,6-51,0)	42,8	(35,2-50,7)	283
	<b>Flandre Occidentale</b>	41,1	(35,5-46,8)	40,3	(34,7-46,2)	486
	<b>Flandre Orientale</b>	44,1	(37,6-50,5)	43,3	(36,9-50,0)	426
	<b>Limbourg</b>	45,5	(35,9-55,1)	45,1	(35,7-54,8)	159
	<b>Bruxelles</b>	42,7	(39,4-45,9)	41,6	(38,0-45,3)	1183
	<b>Brabant Wallon</b>	47,9	(37,4-58,4)	47,2	(37,1-57,6)	148
	<b>Hainaut</b>	37,6	(30,9-44,2)	36,9	(30,4-43,9)	393
	<b>Liège</b>	41,0	(33,5-48,5)	40,2	(32,9-47,9)	251
	<b>Luxembourg</b>	44,3	(36,6-52,1)	43,7	(36,2-51,5)	227
	<b>Namur</b>	42,7	(33,9-51,5)	41,7	(33,4-50,5)	206
	<b>Communauté Germanophone</b>	50,0	(44,2-55,8)	49,6	(43,7-55,5)	394
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	39,7	(37,5-41,9)	39,3	(36,9-41,7)	4195
	<b>2018</b>	41,7	(39,6-43,9)	41,6	(39,2-44,0)	4665

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 86. Pourcentage de la population active ayant rapporté une absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AW01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	45,5	(37,9-53,2)	47,2	(38,9-55,6)	210
	<b>Femme</b>	54,6	(46,2-63,0)	55,4	(46,4-64,0)	184
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	60,9	(37,2-84,6)	59,7	(37,1-78,9)	29
	<b>25 - 44</b>	53,2	(44,6-61,7)	53,0	(44,5-61,4)	155
	<b>45 - 64</b>	45,6	(37,9-53,2)	46,0	(38,4-53,7)	210
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	42,2	(11,9-72,6)	42,7	(22,2-66,0)	9
	<b>Secondaire inférieur</b>	41,4	(18,3-64,4)	45,2	(24,4-67,8)	35
	<b>Secondaire supérieur</b>	48,6	(38,5-58,7)	49,3	(38,9-59,7)	128
	<b>Enseignement supérieur</b>	50,8	(42,4-59,3)	52,8	(44,0-61,3)	200
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	50,1	(38,0-62,2)	52,1	(40,9-63,1)	135
	<b>2018</b>	50,0	(44,2-55,8)	51,5	(45,1-57,9)	394

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 87. Nombre moyen de jours d'absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois au sein de la population active, Enquête de santé 2018 - Belgique

AW02_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,4	(8,2-12,5)	9,9	(7,6-12,3)	2437
	<b>Femme</b>	14,6	(12,2-16,9)	14,2	(11,8-16,7)	2214
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,6	(1,4-13,8)	7,9	(1,8-13,9)	186
	<b>25 - 44</b>	9,0	(7,5-10,5)	9,1	(7,6-10,7)	2252
	<b>45 - 64</b>	16,5	(13,4-19,5)	16,7	(13,6-19,7)	2213
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	16,1	(1,3-31,0)	14,9	(-0,4-30,2)	111
	<b>Secondaire inférieur</b>	10,8	(5,8-15,8)	10,1	(5,0-15,1)	327
	<b>Secondaire supérieur</b>	13,9	(11,3-16,6)	14,0	(11,3-16,6)	1353
	<b>Enseignement supérieur</b>	11,4	(9,2-13,6)	11,0	(8,7-13,3)	2829
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	8,6	(5,6-11,5)	8,2	(5,2-11,3)	509
	<b>Brabant Flamand</b>	9,2	(5,2-13,3)	8,7	(4,7-12,7)	283
	<b>Flandre Occidentale</b>	13,5	(8,9-18,2)	13,4	(8,9-18,0)	486
	<b>Flandre Orientale</b>	10,9	(7,5-14,3)	10,6	(7,1-14,0)	426
	<b>Limbourg</b>	17,5	(7,9-27,0)	17,7	(8,1-27,2)	159
	<b>Bruxelles</b>	9,0	(6,7-11,2)	9,3	(6,9-11,7)	1178
	<b>Brabant Wallon</b>	21,7	(8,0-35,3)	21,2	(8,0-34,4)	147
	<b>Hainaut</b>	16,3	(9,1-23,5)	16,0	(8,8-23,1)	392
	<b>Liège</b>	15,1	(9,2-21,1)	14,8	(8,9-20,6)	251
	<b>Luxembourg</b>	10,2	(6,2-14,1)	10,1	(6,2-14,0)	224
	<b>Namur</b>	16,3	(7,0-25,7)	15,9	(6,7-25,2)	203
	<b>Communauté Germanophone</b>	12,9	(7,9-17,9)	12,3	(7,2-17,4)	393
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	11,2	(9,5-12,9)	11,5	(9,5-13,5)	4187
	<b>2018</b>	12,3	(10,7-13,9)	12,5	(10,6-14,3)	4651

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 88. Nombre moyen de jours d'absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois au sein de la population active, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AW02_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	9,0	(5,3-12,6)	8,3	(4,7-11,9)	210
	<b>Femme</b>	16,9	(7,4-26,5)	16,0	(7,4-24,6)	183
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,0	(0,0-14,0)	5,8	(-0,5-12,2)	29
	<b>25 - 44</b>	18,1	(7,7-28,5)	18,0	(8,0-28,0)	155
	<b>45 - 64</b>	9,0	(5,3-12,6)	9,4	(5,7-13,0)	209
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	11,2	(0,0-24,0)	8,3	(1,6-15,0)	9
	<b>Secondaire inférieur</b>	21,1	(2,5-39,7)	23,4	(6,1-40,8)	35
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,5	(5,3-13,6)	8,2	(4,1-12,3)	128
	<b>Enseignement supérieur</b>	12,9	(3,9-22,0)	12,1	(4,0-20,2)	199
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	17,4	(8,2-26,6)	17,4	(8,7-26,1)	135
	<b>2018</b>	12,9	(7,9-17,9)	12,5	(7,8-17,1)	393

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

# STYLE DE VIE

## 1. Etat nutritionnel

L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est une mesure simple du poids par rapport à la taille couramment utilisée pour estimer le surpoids et l'obésité chez l'adulte. Il correspond au poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kg/m<sup>2</sup>. Cet indicateur est associé au risque de morbidité et de mortalité. Un IMC de 25-30 augmente le risque de morbidité (maladies cardiovasculaires, diabète de type 2 et certains cancers) et de décès prématuré. Un IMC égal ou supérieur à 30 augmente encore plus ces risques. À partir de 18 ans, l'IMC est assez stable dans le temps, ce qui permet de définir des valeurs-seuils absolues de surcharge pondérale pour cette catégorie de la population.

### 1.1. SURPOIDS

En Communauté Germanophone en 2018, 50,2% des personnes âgées de 18 ans et plus présentent un surpoids (Body Mass Index ou Indice de Masse Corporelle  $\geq 25$ ).

Le pourcentage de personnes avec un surpoids est plus élevé chez les hommes (59,2%) que chez les femmes (41,9%). Le plus faible pourcentage est observé dans le groupe d'âge de 18-24 ans (21,3%).

Concernant le niveau d'éducation, le plus haut pourcentage de personnes en surpoids est observé chez les personnes les moins éduquées (62,8%).

Le pourcentage de personnes âgées de 18 ans et plus qui présentent un surpoids en Communauté Germanophone :

- est plus bas que dans la province de Hainaut (58,4%), une différence significative ;
- est resté stable au cours des années d'enquête, même en comparaison de 1997 (41,0%, mais la différence n'est pas significative).

### 1.2. OBÉSITÉ

En Communauté Germanophone en 2018, 15,2% des personnes âgées de 18 ans et plus sont considérées comme obèses (Body Mass Index ou Indice de Masse Corporelle  $\geq 30$ ).

On n'observe pas de différence à ce sujet entre les hommes et les femmes. Ce taux est le plus élevé dans le groupe d'âge de 45-64 ans (18,5%).

Concernant le niveau d'éducation, le taux d'obésité est le plus élevé parmi les personnes les moins éduquées (21,5%).

Le pourcentage de personnes âgées de 18 ans et plus en Communauté Germanophone qui sont obèses :

- n'est pas différent des taux observés dans les provinces belges ;
- est resté stable au cours des années d'enquête, même en comparaison de 1997 (8,6%, mais la différence n'est pas significative).

**Tableau B 89. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui est en surpoids (BMI >= 25), Enquête de santé 2018 – Belgique**

NS_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	55,3	(53,3-57,4)	54,7	(52,6-56,9)	4474
	<b>Femme</b>	43,4	(41,5-45,4)	41,5	(39,4-43,6)	4821
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>18 - 24</b>	24,7	(20,1-29,4)	24,1	(19,8-29,0)	730
	<b>25 - 44</b>	42,2	(39,6-44,7)	41,9	(39,3-44,5)	2884
	<b>45 - 64</b>	57,7	(55,3-60,0)	57,6	(55,2-60,0)	3347
	<b>65 +</b>	57,3	(54,5-60,1)	58,1	(55,2-60,9)	2334
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	61,8	(56,6-67,0)	58,5	(52,4-64,3)	695
	<b>Secondaire inférieur</b>	59,3	(55,6-63,1)	56,4	(52,2-60,4)	1228
	<b>Secondaire supérieur</b>	53,6	(51,0-56,3)	52,9	(50,0-55,8)	2757
	<b>Enseignement supérieur</b>	42,0	(39,8-44,1)	40,9	(38,7-43,2)	4445
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	47,0	(43,0-50,9)	44,9	(40,8-49,0)	937
	<b>Brabant Flamand</b>	43,9	(38,9-48,8)	41,5	(36,6-46,6)	541
	<b>Flandre Occidentale</b>	49,4	(45,2-53,7)	47,0	(42,6-51,4)	897
	<b>Flandre Orientale</b>	46,3	(41,5-51,0)	44,3	(39,6-49,1)	756
	<b>Limbourg</b>	60,2	(53,0-67,4)	58,9	(51,0-66,3)	345
	<b>Bruxelles</b>	46,5	(44,1-48,9)	47,0	(44,5-49,6)	2403
	<b>Brabant Wallon</b>	49,9	(43,2-56,6)	48,8	(41,8-55,8)	295
	<b>Hainaut</b>	58,4	(54,7-62,2)	58,4	(54,4-62,3)	928
	<b>Liège</b>	45,9	(40,5-51,3)	45,1	(39,4-51,0)	572
	<b>Luxembourg</b>	52,1	(45,8-58,3)	51,3	(45,0-57,5)	444
	<b>Namur</b>	45,2	(39,1-51,2)	43,4	(37,5-49,5)	403
	<b>Communauté Germanophone</b>	50,2	(45,9-54,5)	48,2	(43,8-52,6)	774
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	41,3	(39,7-42,9)	41,8	(40,1-43,5)	8071
	<b>2001</b>	44,5	(43,1-45,9)	43,6	(42,1-45,0)	9391
	<b>2004</b>	44,1	(42,7-45,5)	43,1	(41,6-44,6)	10319
	<b>2008</b>	46,9	(45,4-48,4)	45,6	(44,0-47,2)	8831
	<b>2013</b>	48,1	(46,5-49,7)	46,6	(44,9-48,2)	8618
	<b>2018</b>	49,3	(47,8-50,7)	47,6	(46,0-49,2)	9295

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 90. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui est en surpoids (BMI >= 25), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

NS_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	59,2	(53,3-65,0)	57,3	(51,3-63,1)	384
	<b>Femme</b>	41,9	(36,2-47,5)	39,3	(33,4-45,5)	390
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>18 - 24</b>	21,3	(10,6-31,9)	21,1	(11,9-34,6)	66
	<b>25 - 44</b>	45,9	(37,5-54,2)	45,6	(37,2-54,2)	184
	<b>45 - 64</b>	56,1	(49,7-62,5)	56,1	(49,5-62,5)	294
	<b>65 +</b>	57,5	(50,1-65,0)	58,6	(51,0-65,9)	230
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	62,8	(48,5-77,1)	59,9	(43,0-74,7)	78
	<b>Secondaire inférieur</b>	57,5	(47,5-67,6)	53,1	(42,8-63,2)	135
	<b>Secondaire supérieur</b>	46,2	(37,7-54,6)	45,8	(37,4-54,4)	208
	<b>Enseignement supérieur</b>	46,7	(39,9-53,4)	44,5	(37,4-51,9)	300
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	41,0	(33,6-48,4)	41,1	(33,8-48,8)	233
	<b>2001</b>	49,8	(40,4-59,2)	49,7	(40,3-59,2)	216
	<b>2004</b>	52,0	(43,2-60,9)	50,2	(40,9-59,4)	213
	<b>2008</b>	52,0	(43,0-60,9)	49,9	(39,2-60,7)	195
	<b>2013</b>	51,2	(43,8-58,7)	49,4	(41,8-57,0)	250
	<b>2018</b>	50,2	(45,9-54,5)	47,9	(43,3-52,5)	774

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 91. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui souffre d'obésité (BMI >= 30), Enquête de santé 2018 - Belgique**

NS_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,7	(15,2-18,2)	15,7	(14,2-17,3)	4474
	<b>Femme</b>	15,0	(13,7-16,4)	13,8	(12,5-15,2)	4821
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>18 - 24</b>	6,4	(4,1-8,7)	6,4	(4,4-9,1)	730
	<b>25 - 44</b>	12,7	(10,9-14,5)	12,7	(11,0-14,5)	2884
	<b>45 - 64</b>	19,8	(17,9-21,7)	19,7	(17,9-21,7)	3347
	<b>65 +</b>	18,6	(16,5-20,6)	18,6	(16,7-20,8)	2334
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	21,8	(17,5-26,2)	19,8	(15,7-24,5)	695
	<b>Secondaire inférieur</b>	22,5	(19,3-25,7)	20,3	(17,4-23,6)	1228
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,4	(15,4-19,4)	16,4	(14,5-18,5)	2757
	<b>Enseignement supérieur</b>	12,2	(10,7-13,6)	11,4	(10,0-12,8)	4445
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	13,8	(11,2-16,5)	12,6	(10,3-15,3)	937
	<b>Brabant Flamand</b>	15,2	(11,4-19,1)	13,8	(10,6-17,9)	541
	<b>Flandre Occidentale</b>	16,1	(13,3-18,9)	14,5	(12,2-17,3)	897
	<b>Flandre Orientale</b>	13,6	(10,6-16,6)	12,4	(9,8-15,5)	756
	<b>Limbourg</b>	18,3	(13,4-23,2)	16,7	(12,5-22,1)	345
	<b>Bruxelles</b>	13,9	(12,4-15,4)	13,5	(12,0-15,1)	2403
	<b>Brabant Wallon</b>	14,5	(10,2-18,7)	13,4	(9,9-18,0)	295
	<b>Hainaut</b>	24,5	(20,7-28,3)	23,3	(19,7-27,3)	928
	<b>Liège</b>	11,9	(8,8-15,0)	11,1	(8,4-14,5)	572
	<b>Luxembourg</b>	16,5	(12,4-20,6)	15,5	(11,9-19,8)	444
	<b>Namur</b>	14,4	(10,0-18,7)	13,2	(9,6-17,8)	403
	<b>Communauté Germanophone</b>	15,2	(12,1-18,3)	13,7	(11,1-16,9)	774
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	10,8	(9,8-11,9)	10,4	(9,4-11,5)	8071
	<b>2001</b>	12,1	(11,2-13,0)	11,2	(10,3-12,1)	9391
	<b>2004</b>	12,7	(11,7-13,6)	11,7	(10,8-12,6)	10319
	<b>2008</b>	13,8	(12,7-14,8)	12,5	(11,5-13,6)	8831
	<b>2013</b>	13,7	(12,7-14,8)	12,4	(11,3-13,5)	8618
	<b>2018</b>	15,9	(14,8-16,9)	14,3	(13,3-15,4)	9295

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 92. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui souffre d'obésité (BMI >= 30), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

NS_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,0	(11,8-20,2)	15,2	(11,5-19,7)	384
	<b>Femme</b>	14,4	(10,2-18,6)	13,7	(9,9-18,6)	390
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>18 - 24</b>	10,2	(2,2-18,2)	10,2	(4,6-21,1)	66
	<b>25 - 44</b>	11,6	(6,5-16,8)	11,6	(7,4-17,8)	184
	<b>45 - 64</b>	18,6	(13,3-23,8)	18,5	(13,8-24,3)	294
	<b>65 +</b>	16,0	(10,6-21,4)	16,1	(11,4-22,3)	230
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	22,1	(9,5-34,6)	21,5	(10,6-38,8)	78
	<b>Secondaire inférieur</b>	16,6	(8,4-24,9)	15,1	(8,6-25,2)	135
	<b>Secondaire supérieur</b>	12,6	(7,6-17,7)	12,4	(8,3-18,2)	208
	<b>Enseignement supérieur</b>	14,3	(9,7-18,9)	14,0	(9,8-19,6)	300
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	8,6	(4,8-12,3)	8,2	(5,2-12,6)	233
	<b>2001</b>	11,7	(6,6-16,9)	11,0	(6,9-17,1)	216
	<b>2004</b>	16,0	(10,1-21,9)	14,4	(9,7-20,8)	213
	<b>2008</b>	14,5	(7,9-21,0)	12,6	(7,8-19,8)	195
	<b>2013</b>	15,4	(9,8-21,0)	13,9	(9,5-19,8)	250
	<b>2018</b>	15,2	(12,1-18,3)	13,6	(10,7-17,1)	774

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 2. Activité physique

L'enquête de santé de 2018 a utilisé un nouveau questionnaire, l'EHIS-PAQ provenant de l'enquête de santé européenne, pour évaluer l'activité physique au sein de la population âgée de 15 ans et plus. L'EHIS-PAQ tient compte des activités physiques dans des domaines pertinents en termes de santé publique : l'activité physique liée au travail (3 niveaux d'intensité), l'activité physique liée aux déplacements (marche, vélo) et l'activité physique de loisirs. Une question supplémentaire concerne les comportements sédentaires en dehors du travail, c'est-à-dire les activités que l'on fait en étant assis ou couché. Une question de l'OMS relative aux types d'activités de loisirs a été conservée en 2018 afin d'observer une continuité entre les enquêtes.

### 2.1. ACTIVITÉ PHYSIQUE (NON LIÉE AU TRAVAIL) BÉNÉFIQUE POUR LA SANTÉ SELON L'OMS

Il s'agit des activités physiques de loisirs et/ou l'utilisation du vélo pour les déplacements pendant au moins 150 minutes au total par semaine. Les activités de loisirs se rapportent aux sports, le fitness et autres activités de loisirs qui entraînent une respiration plus rapide ou augmente la fréquence cardiaque, comme la marche rapide, les jeux de balle, le jogging, le vélo ou la natation. Les activités liées au travail sont exclues ici.

En Communauté Germanophone, en 2018, 36,7% de la population de 18 ans et plus a déclaré passer au moins 150 min./sem. à faire des activités physiques au moins modérées.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Les jeunes de 18-24 ans sont les plus actifs (49,5% d'entre eux) et les aînés de 65 ans et plus sont les moins actifs (25,2% d'entre eux), une différence significative.

Les personnes les plus éduquées sont les plus nombreuses à faire des activités physiques en dehors du travail (44,7%) et les personnes les moins éduquées sont les moins nombreuses à en faire (13,2%), une différence significative.

Le pourcentage de personnes âgées de 18 ans et plus qui a déclaré passer au moins 150 min./sem. à faire des activités physiques au moins modérées est plus élevée en Communauté Germanophone qu'à Bruxelles (23,8%) et dans les provinces de Hainaut (19,3%), de Liège (17,4%), de Luxembourg (22,3%) et de Namur (18,9%).

### 2.2. ACTIVITÉ PHYSIQUE (LIÉE OU NON AU TRAVAIL) BÉNÉFIQUE POUR LA SANTÉ SELON L'OMS

Cet indicateur est une combinaison de l'indicateur précédent « passer au moins 150 min./sem. à des activités physiques d'intensité au moins modérée » (qui se réfère aux activités de loisirs et à l'utilisation du vélo pour se déplacer) et aux activités liées au travail, c'est-à-dire faire une activité physique d'intensité au moins modérée au travail.

En Communauté Germanophone, en 2018, 71,6% de la population de 18 ans et plus a déclaré passer au moins 150 min./sem. à des activités physiques au moins modérées (en dehors du travail) ou occuper un travail qui demande au moins un effort physique modéré.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge ou du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes âgées de 18 ans et plus qui a déclaré passer au moins 150 min./sem. à des activités physiques au moins modérées ou occuper un travail qui demande au moins un effort modéré est plus élevé en Communauté Germanophone que dans les provinces d'Anvers (63,5%), de Brabant Flamand (58,9%), de Brabant Wallon (47,7%), de Hainaut (44,2%), de Liège (46,2%), de Luxembourg (51,5%), de Namur (41,2%) et qu'à Bruxelles (41,6%).

### 2.3. COMPORTEMENTS SÉDENTAIRES

La position assise prolongée est un facteur de risque indépendant pour la santé. Les comportements sédentaires sont les activités que l'on fait en position assise ou couchée, sans être endormi(e).

La durée moyenne que la population germanophone âgée de 15 ans et plus passe en position assise ou couchée au cours d'une journée est de 364 minutes, soit 6,1 heures.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge.

Le temps moyen que passe de la population de 15 ans et plus en position assise ou couchée au cours d'une journée est significativement plus élevé chez les personnes les plus éduquées (414 minutes ou 6,9 heures) que chez les personnes les moins éduquées (297 minutes ou 4,9 heures).

Le temps moyen passé à des activités sédentaires en Communauté Germanophone est plus élevé que dans les province d'Anvers (307 minutes ou 5,1 heures), de Flandre Occidentale (318 minutes ou 5,3 heures) et de Liège (313 minutes ou 5,2 heures) et plus bas qu'en Flandre Orientale (407 minutes ou 6,8 heures), à Bruxelles (421 minutes ou 7,0 heures) et qu'en province de Namur (447 minutes ou 7,4 heures), des différences significatives.

### 2.4. ACTIVITÉS PHYSIQUES DE LOISIR

En Communauté Germanophone en 2018, 24,4% des personnes âgées de 15 ans et plus sont à risque par manque d'activité physiques de loisir.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge.

Concernant le niveau d'éducation, ce taux est plus élevé chez les moins éduqués (44,1% des personnes avec un diplôme primaire/sans diplôme et 40,0% des personnes avec un diplôme du secondaire inférieur) que chez les plus éduqués (17,1%), des différences significatives.

Le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui sont à risque par manque d'activités physiques de loisir :

- est significativement moins élevé, que dans la province de Hainaut (40,6%) ;
- n'a pas varié de manière significative au cours des 20 dernières années (de 18,7% en 1997 à 24,4% à 2018).

**Tableau B 93. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée, Enquête de santé 2018 - Belgique**

PA_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	35,9	(33,8-38,0)	36,2	(34,0-38,4)	4070
	<b>Femme</b>	24,7	(22,9-26,5)	25,4	(23,5-27,3)	4515
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>18 - 24</b>	46,6	(40,5-52,7)	46,0	(40,0-52,2)	557
	<b>25 - 44</b>	33,5	(30,8-36,1)	33,2	(30,6-36,0)	2642
	<b>45 - 64</b>	29,8	(27,5-32,2)	29,5	(27,2-32,0)	3176
	<b>65 +</b>	20,5	(18,1-22,9)	20,6	(18,3-23,2)	2210
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,5	(7,2-13,9)	11,7	(8,3-16,2)	630
	<b>Secondaire inférieur</b>	21,3	(17,2-25,3)	23,2	(19,0-28,0)	1106
	<b>Secondaire supérieur</b>	26,1	(23,5-28,6)	25,8	(23,3-28,4)	2576
	<b>Enseignement supérieur</b>	37,9	(35,7-40,1)	38,2	(35,8-40,5)	4110
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	44,0	(39,9-48,2)	45,1	(40,9-49,5)	864
	<b>Brabant Flamand</b>	35,3	(30,4-40,2)	36,2	(31,2-41,6)	514
	<b>Flandre Occidentale</b>	35,1	(30,9-39,3)	36,9	(32,7-41,3)	829
	<b>Flandre Orientale</b>	35,4	(31,0-39,8)	35,9	(31,5-40,5)	729
	<b>Limbourg</b>	28,2	(21,5-34,9)	29,0	(22,7-36,2)	308
	<b>Bruxelles</b>	23,8	(21,6-26,0)	22,6	(20,5-24,9)	2243
	<b>Brabant Wallon</b>	26,5	(19,5-33,5)	26,4	(19,8-34,1)	273
	<b>Hainaut</b>	19,3	(15,2-23,4)	18,9	(15,2-23,2)	852
	<b>Liège</b>	17,4	(12,4-22,4)	17,4	(12,7-23,3)	511
	<b>Luxembourg</b>	22,3	(16,5-28,1)	22,1	(17,0-28,3)	365
	<b>Namur</b>	18,9	(13,8-23,9)	19,2	(14,8-24,4)	350
	<b>Communauté Germanophone</b>	36,7	(32,4-41,0)	37,1	(32,7-41,7)	747
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	30,1	(28,6-31,6)			8585

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 94. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PA_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	40,4	(34,5-46,2)	40,0	(34,3-46,1)	371
	<b>Femme</b>	33,3	(27,9-38,7)	33,2	(28,0-38,7)	376
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>18 - 24</b>	49,5	(36,1-62,9)	49,6	(36,6-62,8)	64
	<b>25 - 44</b>	34,2	(26,2-42,2)	34,1	(26,6-42,4)	178
	<b>45 - 64</b>	42,2	(34,9-49,4)	42,1	(35,1-49,5)	290
	<b>65 +</b>	25,1	(17,6-32,5)	25,2	(18,5-33,3)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	13,2	(4,1-22,4)	14,8	(7,4-27,6)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	30,6	(20,4-40,8)	30,9	(21,6-42,1)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	33,2	(25,3-41,2)	32,8	(25,6-40,9)	205
	<b>Enseignement supérieur</b>	44,7	(37,6-51,8)	44,4	(37,1-51,9)	289
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	36,7	(32,4-41,0)			747

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 95. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée (non liées au travail) et/ou qui fait des activités qui demandent au moins un effort physique modéré au travail, Enquête de santé 2018 - Belgique**

PA_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	60,2	(58,1-62,2)	60,0	(57,9-62,1)	4070
	<b>Femme</b>	51,8	(49,8-53,8)	52,2	(50,1-54,3)	4515
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>18 - 24</b>	59,3	(53,8-64,9)	59,1	(53,3-64,7)	557
	<b>25 - 44</b>	60,6	(57,9-63,2)	60,6	(57,9-63,2)	2642
	<b>45 - 64</b>	58,9	(56,4-61,3)	58,9	(56,4-61,4)	3176
	<b>65 +</b>	43,7	(40,8-46,6)	44,1	(41,2-47,1)	2210
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	34,6	(29,2-39,9)	38,6	(33,0-44,7)	630
	<b>Secondaire inférieur</b>	50,7	(46,2-55,1)	53,5	(48,8-58,2)	1106
	<b>Secondaire supérieur</b>	58,1	(55,4-60,8)	58,0	(55,2-60,7)	2576
	<b>Enseignement supérieur</b>	58,4	(56,2-60,6)	57,6	(55,3-59,9)	4110
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	63,5	(59,6-67,4)	63,9	(59,9-67,8)	864
	<b>Brabant Flamand</b>	58,9	(53,6-64,2)	59,4	(53,8-64,8)	514
	<b>Flandre Occidentale</b>	66,5	(62,6-70,5)	68,2	(64,2-72,0)	829
	<b>Flandre Orientale</b>	66,3	(62,0-70,5)	66,9	(62,3-71,1)	729
	<b>Limbourg</b>	64,4	(57,6-71,2)	65,5	(58,5-71,9)	308
	<b>Bruxelles</b>	41,6	(39,2-43,9)	40,1	(37,7-42,6)	2243
	<b>Brabant Wallon</b>	47,7	(40,6-54,8)	47,9	(41,0-54,9)	273
	<b>Hainaut</b>	44,2	(39,5-49,0)	43,9	(39,2-48,7)	852
	<b>Liège</b>	46,2	(40,2-52,3)	46,6	(40,4-52,9)	511
	<b>Luxembourg</b>	51,5	(44,6-58,3)	51,6	(44,8-58,3)	365
	<b>Namur</b>	41,2	(34,5-47,9)	41,9	(35,6-48,6)	350
	<b>Communauté Germanophone</b>	71,6	(67,8-75,5)	72,2	(68,1-76,0)	747
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	55,8	(54,3-57,4)			8585

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 96. Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée (non liées au travail) et/ou qui fait des activités qui demandent au moins un effort physique modéré au travail, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PA_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	74,3	(69,2-79,3)	73,9	(68,5-78,6)	371
	Femme	69,2	(63,7-74,6)	68,9	(63,1-74,2)	376
GROUPE D'AGE	18 - 24	66,5	(52,3-80,8)	66,7	(51,4-79,1)	64
	25 - 44	71,6	(63,9-79,3)	71,6	(63,4-78,6)	178
	45 - 64	75,5	(69,3-81,6)	75,5	(68,9-81,1)	290
	65 +	67,2	(59,6-74,8)	67,5	(59,5-74,5)	215
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	60,2	(44,7-75,6)	62,0	(45,8-75,9)	72
	Secondaire inférieur	77,4	(67,4-87,4)	77,4	(65,5-86,1)	128
	Secondaire supérieur	72,6	(66,2-79,0)	72,5	(65,6-78,4)	205
	Enseignement supérieur	69,5	(63,2-75,9)	68,6	(61,9-74,7)	289
ANNEE	2018	71,6	(67,8-75,5)			747

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 97. Temps moyen (minutes) que la population de 15 ans et plus passe en position assise ou couchée au cours d'une journée, Enquête de santé 2018 - Belgique

PA09_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	360	(349,9-370,1)	362	(352,0-372,3)	4106
	<b>Femme</b>	341	(332,5-350,3)	344	(334,6-352,4)	4536
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	414	(391,4-436,8)	414	(390,8-436,5)	784
	<b>25 - 44</b>	340	(327,0-352,6)	340	(326,8-352,7)	2603
	<b>45 - 64</b>	331	(319,2-341,9)	331	(319,1-341,9)	3110
	<b>65 +</b>	363	(349,1-377,1)	364	(350,0-378,2)	2145
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	377	(350,5-402,9)	373	(345,9-399,0)	621
	<b>Secondaire inférieur</b>	358	(338,8-377,7)	360	(340,1-379,0)	1095
	<b>Secondaire supérieur</b>	333	(319,9-345,4)	334	(321,3-347,2)	2596
	<b>Enseignement supérieur</b>	358	(346,8-368,3)	361	(350,6-372,0)	4167
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	307	(288,4-324,8)	309	(291,1-327,7)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	336	(308,3-363,8)	338	(311,3-365,6)	529
	<b>Flandre Occidentale</b>	318	(297,4-338,0)	319	(299,3-339,6)	850
	<b>Flandre Orientale</b>	407	(386,7-427,5)	409	(388,6-429,6)	740
	<b>Limbourg</b>	319	(284,9-353,3)	321	(288,3-354,6)	311
	<b>Bruxelles</b>	421	(407,4-434,9)	425	(410,8-438,1)	2259
	<b>Brabant Wallon</b>	317	(281,9-351,6)	316	(281,1-350,8)	277
	<b>Hainaut</b>	354	(336,5-372,1)	356	(338,8-373,6)	874
	<b>Liège</b>	313	(288,9-336,4)	315	(291,1-338,9)	519
	<b>Luxembourg</b>	343	(301,4-384,3)	345	(303,7-387,0)	315
	<b>Namur</b>	447	(411,1-482,8)	449	(412,8-484,2)	309
	<b>Communauté Germanophone</b>	364	(342,9-385,6)	366	(344,9-386,4)	768
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	350	(343,1-357,6)			8642

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 98. Temps moyen (minutes) que la population de 15 ans et plus passe en position assise ou couchée au cours d'une journée, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PA09_1		Moyenne brut	CI 95% brut	Moyenne stand*	CI 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	387	(356,6-417,8)	389	(358,5-419,2)	382
	<b>Femme</b>	343	(319,9-365,5)	345	(322,8-367,8)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	456	(383,4-528,4)	455	(383,7-526,2)	86
	<b>25 - 44</b>	362	(318,3-405,2)	362	(318,9-404,4)	178
	<b>45 - 64</b>	334	(306,9-361,7)	334	(307,1-361,5)	289
	<b>65 +</b>	364	(332,3-395,7)	366	(334,1-397,2)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	309	(258,8-358,8)	297	(241,1-353,0)	71
	<b>Secondaire inférieur</b>	326	(276,4-375,1)	335	(283,8-385,8)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	346	(311,0-381,2)	348	(312,2-383,8)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	410	(372,1-448,2)	414	(378,8-449,4)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	364	(342,9-385,6)			768

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression linéaire (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 99. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui court un risque de santé en raison du manque d'activité physique de loisirs, Enquête de santé 2018 – Belgique**

PA10_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	24,4	(22,5-26,2)	24,2	(22,3-26,2)	3573
	<b>Femme</b>	33,0	(30,9-35,0)	32,4	(30,4-34,5)	3892
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	19,0	(15,1-22,8)	18,9	(15,3-23,1)	704
	<b>25 - 44</b>	26,7	(24,0-29,4)	26,5	(23,9-29,3)	2249
	<b>45 - 64</b>	26,7	(24,4-29,1)	26,6	(24,3-29,0)	2737
	<b>65 +</b>	40,7	(37,7-43,7)	40,3	(37,3-43,3)	1775
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	53,8	(47,4-60,3)	50,0	(43,3-56,8)	434
	<b>Secondaire inférieur</b>	42,8	(38,0-47,5)	40,1	(35,2-45,1)	894
	<b>Secondaire supérieur</b>	35,4	(32,6-38,3)	35,3	(32,5-38,3)	2213
	<b>Enseignement supérieur</b>	18,9	(17,1-20,6)	18,8	(17,1-20,6)	3780
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	18,7	(15,4-21,9)	18,1	(15,1-21,6)	793
	<b>Brabant Flamand</b>	24,3	(19,1-29,5)	23,7	(18,9-29,3)	483
	<b>Flandre Occidentale</b>	28,7	(24,8-32,7)	27,3	(23,7-31,3)	771
	<b>Flandre Orientale</b>	24,2	(20,1-28,3)	23,6	(19,8-27,9)	667
	<b>Limbourg</b>	31,2	(23,8-38,6)	29,7	(23,2-37,3)	274
	<b>Bruxelles</b>	30,4	(27,9-32,9)	30,3	(27,8-33,0)	1755
	<b>Brabant Wallon</b>	29,2	(21,4-37,0)	29,3	(22,0-37,8)	246
	<b>Hainaut</b>	40,6	(36,1-45,1)	40,7	(36,2-45,4)	748
	<b>Liège</b>	34,1	(28,5-39,7)	33,0	(27,6-38,9)	452
	<b>Luxembourg</b>	34,6	(27,6-41,7)	34,2	(27,8-41,2)	314
	<b>Namur</b>	38,2	(31,5-44,8)	37,1	(31,0-43,7)	297
	<b>Communauté Germanophone</b>	24,4	(20,3-28,5)	24,1	(20,2-28,5)	665
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	32,9	(31,2-34,6)	34,3	(32,5-36,0)	7800
	<b>2001</b>	35,4	(34,0-36,9)	35,4	(33,9-36,8)	9441
	<b>2004</b>	27,1	(25,7-28,5)	27,2	(25,8-28,7)	8245
	<b>2008</b>	28,3	(26,8-29,9)	28,1	(26,6-29,7)	6918
	<b>2013</b>	27,6	(25,8-29,3)	27,2	(25,4-29,0)	5561
	<b>2018</b>	28,8	(27,3-30,3)	28,1	(26,7-29,7)	7465

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 100. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui court un risque de santé en raison du manque d'activité physique de loisirs, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PA10_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	24,1	(18,5-29,6)	24,4	(19,1-30,8)	335
	<b>Femme</b>	24,7	(19,3-30,1)	24,5	(19,5-30,3)	330
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	20,9	(11,2-30,6)	20,9	(13,0-32,0)	81
	<b>25 - 44</b>	21,7	(13,7-29,7)	21,7	(14,8-30,6)	152
	<b>45 - 64</b>	20,7	(14,3-27,0)	20,7	(15,0-27,7)	263
	<b>65 +</b>	38,1	(29,9-46,3)	38,1	(30,4-46,5)	169
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	44,1	(29,4-58,8)	39,3	(25,9-54,6)	57
	<b>Secondaire inférieur</b>	40,0	(27,1-52,9)	39,4	(27,0-53,3)	107
	<b>Secondaire supérieur</b>	22,0	(14,6-29,5)	22,8	(16,0-31,4)	186
	<b>Enseignement supérieur</b>	17,1	(11,8-22,5)	18,0	(13,0-24,2)	270
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	18,7	(12,3-25,1)	20,4	(14,3-28,1)	233
	<b>2001</b>	17,5	(11,3-23,7)	17,0	(12,1-23,4)	226
	<b>2004</b>	20,5	(13,3-27,7)	21,4	(14,7-30,0)	164
	<b>2008</b>	23,0	(13,9-32,1)	21,6	(14,2-31,4)	167
	<b>2013</b>	23,1	(15,2-31,0)	23,0	(15,9-32,0)	189
	<b>2018</b>	24,4	(20,3-28,5)	24,3	(20,3-28,7)	665

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

### 3. Habitudes alimentaires

Il est bien connu qu'il existe un lien étroit entre la nutrition et la santé. Les études ont démontré qu'un décès cardiométabolique sur deux serait dû à de mauvaises habitudes alimentaires, alors que la consommation d'une quantité suffisante de fruits et légumes (5 portions par jour) est associée à une réduction du taux de mortalité.

#### 3.1. CONSOMMATION DE FRUITS

En Communauté Germanophone en 2018, 59,8% de la population déclare consommer des fruits chaque jour.

Le pourcentage de femmes (65,3%) qui consomment des fruits tous les jours est significativement plus élevé que celui relevé chez les hommes (53,9%). Le pourcentage personnes qui consomment des fruits tous les jours est plus élevé dans le groupe d'âge de 65 ans et plus (68,0%) que dans le groupe d'âge de 25-44 ans (46,4%), une différence significative.

Il n'y a pas de différences significatives en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes qui déclarent de consommer des fruits chaque jour dans la Communauté Germanophone :

- est significativement plus élevé que dans la province de Hainaut (46,6%) ;
- est resté stable depuis 2013 (53,9%).

#### 3.2. CONSOMMATION DE LÉGUMES

En Communauté Germanophone en 2018, 70,5% de la population déclare consommer des légumes chaque jour.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Le pourcentage personnes qui consomment des légumes tous les jours est significativement moins élevé dans le groupe d'âge de 25-44 ans (54,4%) que dans les autres groupes d'âge (71,4% à 80,3%).

Il n'y a pas de différence significative en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes qui déclarent de consommer des légumes chaque jour au sein de la Communauté Germanophone :

- est plus élevé que dans la province de Luxembourg (46,6%) et moins élevé que dans les provinces d'Anvers (82,8%), de Flandre Occidentale (87,0%) et de Flandre Orientale (77,2%) ;
- est resté stable depuis 2013 (71,7%).

#### 3.3. ALLERGIE OU INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

En Communauté Germanophone en 2018, 12,0% de la population indique souffrir d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire. Chez 6,3% des personnes, cette allergie ou intolérance a été confirmée par un médecin, soit 52,5% des personnes présentant une allergie ou intolérance alimentaire.

Le pourcentage de femmes ayant une allergie ou une intolérance alimentaire (15,6%) est significativement plus élevé que celui des hommes (8,2%). Le pourcentage personnes qui souffrent d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire est plus élevé dans le groupe d'âge de 45-64 ans (15,6%) que dans les autres groupes d'âge (9,0% à 11,1%).

Les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (13,1%) sont plus susceptibles d'avoir une allergie ou une tolérance alimentaire que les moins diplômées (6,9% à 12,9%).

Le pourcentage de personnes qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire en Communauté Germanophone est plus élevé que dans les provinces d'Anvers, de Luxembourg (7,0%), de Flandre Occidentale (6,1%), de Limbourg (5,0%) et de Luxembourg (5,5%).

Tableau B 101. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Enquête de santé 2018 - Belgique

NH01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	50,6	(48,6-52,5)	50,9	(48,9-52,8)	5582
	<b>Femme</b>	63,7	(61,9-65,5)	63,7	(61,9-65,5)	6020
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	59,7	(56,9-62,5)	60,1	(57,3-62,9)	2915
	<b>25 - 44</b>	46,6	(43,9-49,4)	46,7	(43,9-49,5)	2916
	<b>45 - 64</b>	57,5	(54,9-60,0)	57,7	(55,1-60,2)	3391
	<b>65 +</b>	67,9	(65,3-70,5)	67,5	(64,8-70,1)	2380
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	52,5	(47,1-58,0)	46,5	(40,9-52,2)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	51,9	(47,9-56,0)	48,6	(44,4-52,9)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	52,5	(49,7-55,2)	53,1	(50,3-55,9)	3400
	<b>Enseignement supérieur</b>	62,0	(59,9-64,1)	63,7	(61,6-65,8)	5751
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	62,9	(59,2-66,6)	63,5	(59,7-67,1)	1139
	<b>Brabant Flamand</b>	56,7	(51,1-62,3)	56,7	(50,9-62,3)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	62,9	(59,0-66,8)	62,6	(58,6-66,5)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	59,7	(55,4-64,0)	60,1	(55,6-64,4)	946
	<b>Limbourg</b>	51,6	(45,0-58,3)	51,3	(44,4-58,2)	425
	<b>Bruxelles</b>	59,3	(57,0-61,7)	60,9	(58,4-63,4)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	61,4	(53,0-69,9)	61,7	(53,0-69,6)	361
	<b>Hainaut</b>	46,6	(42,2-51,1)	46,7	(42,3-51,3)	1116
	<b>Liège</b>	56,2	(50,7-61,8)	56,3	(50,7-61,7)	704
	<b>Luxembourg</b>	47,5	(41,1-53,8)	47,4	(40,9-53,9)	591
	<b>Namur</b>	57,4	(51,4-63,4)	57,4	(51,0-63,6)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	59,8	(55,6-64,0)	59,8	(55,4-64,0)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	55,7	(54,1-57,2)	56,0	(54,4-57,6)	10820
	<b>2018</b>	57,2	(55,8-58,7)	57,5	(56,0-59,0)	11602

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 102. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

NH01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	53,9	(48,3-59,5)	53,6	(47,9-59,2)	456
	<b>Femme</b>	65,3	(60,0-70,7)	65,0	(59,3-70,4)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	62,7	(54,6-70,8)	63,0	(54,6-70,7)	216
	<b>25 - 44</b>	46,4	(38,0-54,8)	46,4	(38,2-54,7)	185
	<b>45 - 64</b>	62,0	(55,7-68,4)	62,3	(55,7-68,4)	296
	<b>65 +</b>	68,0	(60,2-75,8)	67,7	(59,2-75,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	57,9	(44,1-71,8)	50,4	(33,8-67,0)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	57,5	(47,9-67,2)	52,6	(42,9-62,0)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	56,3	(48,1-64,4)	57,1	(48,4-65,4)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	66,1	(59,6-72,6)	68,3	(61,6-74,4)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	53,9	(46,3-61,5)	53,2	(45,6-60,6)	306
	<b>2018</b>	59,8	(55,6-64,0)	59,5	(55,1-63,7)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 103. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Enquête de santé 2018 - Belgique

NH03_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	72,0	(70,2-73,7)	72,4	(70,7-74,1)	5584
	<b>Femme</b>	79,4	(77,9-81,0)	79,5	(77,9-81,0)	6020
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	73,0	(70,4-75,6)	73,3	(70,6-75,9)	2915
	<b>25 - 44</b>	73,6	(71,2-76,0)	73,8	(71,4-76,1)	2916
	<b>45 - 64</b>	76,0	(73,8-78,2)	76,2	(74,0-78,3)	3393
	<b>65 +</b>	82,9	(80,7-85,0)	82,7	(80,5-84,8)	2380
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	65,4	(59,7-71,2)	60,4	(54,1-66,4)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	67,9	(64,1-71,7)	65,5	(61,3-69,4)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	72,4	(69,6-75,2)	73,4	(70,6-76,1)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	81,1	(79,4-82,9)	82,5	(80,8-84,1)	5751
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	82,8	(79,6-85,9)	83,2	(79,9-86,1)	1139
	<b>Brabant Flamand</b>	75,7	(70,4-81,0)	76,1	(70,4-80,9)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	87,0	(84,3-89,8)	87,1	(84,1-89,6)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	77,2	(73,1-81,3)	77,6	(73,2-81,4)	946
	<b>Limbourg</b>	67,4	(60,5-74,2)	67,5	(60,3-73,9)	425
	<b>Bruxelles</b>	70,0	(67,6-72,4)	71,1	(68,6-73,4)	3098
	<b>Brabant Wallon</b>	76,4	(69,1-83,8)	76,9	(69,0-83,3)	361
	<b>Hainaut</b>	71,7	(67,5-76,0)	72,3	(68,0-76,3)	1117
	<b>Liège</b>	74,3	(69,0-79,6)	74,7	(69,1-79,5)	704
	<b>Luxembourg</b>	59,0	(52,4-65,6)	59,6	(52,9-65,9)	593
	<b>Namur</b>	68,9	(63,2-74,7)	69,3	(63,2-74,7)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	70,5	(66,4-74,6)	70,8	(66,5-74,7)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	77,9	(76,6-79,3)	78,4	(77,0-79,8)	10822
	<b>2018</b>	75,8	(74,4-77,1)	76,2	(74,8-77,5)	11604

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 104. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

NH03_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	65,1	(59,6-70,7)	65,1	(59,4-70,5)	456
	<b>Femme</b>	75,7	(70,7-80,6)	75,8	(70,3-80,5)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	71,4	(63,4-79,4)	71,8	(63,3-79,0)	216
	<b>25 - 44</b>	54,4	(45,7-63,1)	54,5	(45,8-63,0)	185
	<b>45 - 64</b>	75,8	(69,6-81,9)	76,1	(69,5-81,7)	296
	<b>65 +</b>	80,3	(73,5-87,0)	80,1	(72,3-86,2)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	72,8	(60,6-85,0)	66,8	(50,4-79,9)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	66,7	(56,5-77,0)	60,5	(48,8-71,0)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	71,1	(63,4-78,7)	73,2	(64,8-80,2)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	74,2	(67,8-80,5)	77,4	(70,9-82,8)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	71,7	(64,3-79,2)	71,9	(63,7-78,9)	306
	<b>2018</b>	70,5	(66,4-74,6)	70,9	(66,6-74,9)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 105. Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

NH01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	53,9	(48,3-59,5)	53,6	(47,9-59,2)	456
	Femme	65,3	(60,0-70,7)	65,0	(59,3-70,4)	472
GROUPE D'AGE	0 - 24	62,7	(54,6-70,8)	63,0	(54,6-70,7)	216
	25 - 44	46,4	(38,0-54,8)	46,4	(38,2-54,7)	185
	45 - 64	62,0	(55,7-68,4)	62,3	(55,7-68,4)	296
	65 +	68,0	(60,2-75,8)	67,7	(59,2-75,1)	231
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	57,9	(44,1-71,8)	50,4	(33,8-67,0)	81
	Secondaire inférieur	57,5	(47,9-67,2)	52,6	(42,9-62,0)	146
	Secondaire supérieur	56,3	(48,1-64,4)	57,1	(48,4-65,4)	255
	Enseignement supérieur	66,1	(59,6-72,6)	68,3	(61,6-74,4)	390
ANNEE	2013	53,9	(46,3-61,5)	53,2	(45,6-60,6)	306
	2018	59,8	(55,6-64,0)	59,5	(55,1-63,7)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 106. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Enquête de santé 2018 - Belgique**

NH12_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,9	(6,0-7,8)	6,7	(5,9-7,7)	5582
	<b>Femme</b>	10,9	(9,9-12,0)	10,7	(9,7-11,8)	6016
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	7,1	(5,8-8,3)	6,9	(5,8-8,3)	2912
	<b>25 - 44</b>	10,9	(9,4-12,4)	10,7	(9,3-12,3)	2916
	<b>45 - 64</b>	10,6	(9,2-12,0)	10,4	(9,1-11,9)	3390
	<b>65 +</b>	6,8	(5,6-8,0)	6,4	(5,4-7,7)	2380
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	4,2	(2,6-5,9)	4,3	(2,9-6,4)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,2	(4,5-7,9)	6,0	(4,6-7,9)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,0	(6,7-9,3)	7,7	(6,5-9,1)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,7	(9,6-11,8)	10,2	(9,2-11,3)	5745
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,3	(5,4-9,1)	7,0	(5,4-8,9)	1138
	<b>Brabant Flamand</b>	9,2	(6,6-11,9)	8,9	(6,6-11,9)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	6,3	(4,6-8,0)	6,1	(4,6-8,0)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	8,9	(6,7-11,0)	8,5	(6,6-10,7)	945
	<b>Limbourg</b>	5,2	(2,9-7,6)	5,0	(3,2-7,9)	425
	<b>Bruxelles</b>	11,9	(10,6-13,2)	11,2	(10,0-12,6)	3095
	<b>Brabant Wallon</b>	12,7	(8,3-17,0)	12,3	(8,6-17,2)	361
	<b>Hainaut</b>	9,9	(7,7-12,2)	9,5	(7,5-11,9)	1117
	<b>Liège</b>	11,8	(9,0-14,6)	11,3	(8,9-14,3)	704
	<b>Luxembourg</b>	5,7	(3,8-7,6)	5,5	(3,9-7,6)	592
	<b>Namur</b>	8,7	(5,4-12,1)	8,5	(5,7-12,3)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	12,0	(9,3-14,7)	11,5	(9,1-14,5)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	9,0	(8,2-9,7)			11598

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 107. Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

NH12_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,2	(5,4-11,0)	7,8	(5,5-11,1)	456
	<b>Femme</b>	15,6	(11,6-19,7)	15,2	(11,6-19,6)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	11,1	(5,3-16,9)	10,7	(6,3-17,7)	216
	<b>25 - 44</b>	10,7	(6,3-15,1)	10,2	(6,7-15,2)	185
	<b>45 - 64</b>	15,6	(10,8-20,5)	15,1	(10,9-20,5)	296
	<b>65 +</b>	9,0	(4,9-13,0)	8,2	(5,1-13,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,0	(0,8-19,2)	9,3	(3,3-23,6)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,9	(1,9-11,8)	5,7	(2,6-11,9)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	12,9	(7,5-18,2)	11,7	(7,5-17,8)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	13,1	(8,6-17,6)	12,4	(8,7-17,4)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	12,0	(9,3-14,7)			928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 4. Consommation d'alcool

La consommation d'alcool est inhérente à notre culture, mais elle n'en reste pas moins dangereuse pour la santé et cela même à des doses modérées. Les dommages liés à l'alcool dépendent de la manière dont on le consomme, la durée et les quantités consommées. Six indicateurs sont retenus pour décrire les habitudes en matière de consommation d'alcool au sein de la Communauté Germanophone. Ils concernent la population âgée de 15 ans et plus. Le premier indicateur (AL01\_1) considère la proportion de personnes qui consomment actuellement de l'alcool, c'est-à-dire celles qui ont bu au moins une boisson alcoolisée au cours des 12 derniers mois ; le deuxième indicateur (AL01\_3) cible les personnes qui boivent de l'alcool au quotidien ; le troisième indicateur (AL05\_4) présente le taux de personnes selon un seuil établi pour déterminer une consommation excessive d'alcool, soit plus de 14 unités d'alcool par semaine pour les femmes et plus de 21 unité pour les hommes ; le quatrième indicateur (AL06\_2) cerne les comportements d'hyper-alcoolisation, soit l'ingestion de 6 verres ou plus de boissons alcoolisées (ce qui correspond à 60 grammes d'éthanol ou plus) au cours d'une même occasion, et ce, à une fréquence d'au moins une fois par semaine ; le cinquième indicateur (AL07\_1) porte sur le comportement de « binge drinking » c'est-à-dire le fait de consommer selon que l'on soit une femme ou un homme, au moins 4 ou 6 boissons alcoolisées en moins de 2 heures ; le dernier indicateur (AL\_2) rend compte de la proportion de personnes ayant eu un rapport problématique à l'alcool au cours des 12 derniers mois. La consommation est considérée comme problématique si la personne a répondu positivement à au moins 2 des 4 items du questionnaire CAGE pour la période considérée.

### 4.1. CONSOMMATION D'ALCOOL

En 2018, 78,8% des membres de la Communauté Germanophone (âgés de 15 ans et plus) consommaient de l'alcool au moment de l'enquête, ce qui est un rien plus élevé qu'au niveau national (76,6%) ou qu'en Région wallonne (77,2%), mais correspond à la proportion de consommateurs en province de Liège (78,0%). Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à consommer de l'alcool, mais la différence n'est pas significative (77,0% versus 80,7%, n.s.). Il y a un gradient socioéconomique au niveau des habitudes de consommation : plus le niveau d'éducation est élevé, plus la proportion de consommateurs est grande. La proportion de consommateurs a baissé en Communauté Germanophone par rapport à 2013 (88,7%).

### 4.2. CONSOMMATION QUOTIDIENNE

Les consommateurs quotidiens d'alcool sont moins nombreux dans la Communauté Germanophone (5,4%) que dans le reste du pays (9,7%) et de la Wallonie (9,8%). La consommation quotidienne concerne autant les femmes (4,9%) que les hommes (6,0%, différence non significative). La proportion de buveurs quotidiens augmente dans les tranches d'âge à partir de 45 ans et plus. Si l'on observe un gradient social dans les taux bruts, il n'est cependant pas significatif après ajustement pour l'âge et le sexe. De la même façon, la différence de prévalence des consommateurs quotidiens entre 2018 (5,4%) et les années précédentes (entre 3,2 et 9,7%) n'est pas statistiquement significative.

### 4.3. CONSOMMATION EXCESSIVE

La surconsommation d'alcool, définie comme plus de 21 verres de boissons alcoolisées par semaine pour les hommes et plus de 14 verres pour les femmes, touche 5,0% des membres de la Communauté Germanophone, ce qui correspond à une diminution par rapport à 2013 (8,6%). La proportion actuelle est comparable la prévalence nationale (5,9% en 2018) et un peu moins élevée que la prévalence dans la Région wallonne (6,6% en 2018) ou de la province liégeoise (7,3%).

La consommation excessive d'alcool est plus répandue parmi les hommes (7,0%) que les femmes (3,0%), comme c'est le cas pour l'ensemble de la Belgique. On trouve un plus grand nombre relatif de consommateurs excessifs parmi les jeunes (15-24 ans) et parmi les personnes avec un diplôme du secondaire supérieur et de l'enseignement supérieur.

#### 4.4. HYPER-ALCOOLISATION

Boire 6 verres ou plus de boissons alcoolisées en une occasion (hyper-alcoolisation) au moins une fois par semaine est une pratique qui concerne 8,2% des habitants de la Communauté Germanophone, ce qui est comparable aux chiffres de la population nationale (7,6%), wallonne (7,5%) et liégeoise (8,8%).

L'hyper-alcoolisation hebdomadaire dans la Communauté est moins fréquente parmi les femmes (3,9%) que parmi les hommes (11,5%), comme c'est le cas dans le reste du pays. Les jeunes de 15-24 ans sont plus nombreux à s'hyper-alcooliser chaque semaine (17,3%) par rapport à leurs aînés de 25-44 ans (5,0%) ou plus âgés (7,2 – 8,4%). Il n'y a pas de gradient socio-économique au niveau du comportement d'hyper-alcoolisation.

Enfin, face à la stabilité temporelle de cet indicateur au niveau national depuis 2008 (entre 7,6 et 8,5%), il semble qu'au sein de la Communauté Germanophone la prévalence de l'hyper-alcoolisation hebdomadaire ait été exceptionnelle en 2013 (16,1%) par rapport à 2008 (8,8%) et 2018 (8,2%).

#### 4.5. BINGE DRINKING

Le « binge drinking » (traduit par l'expression « ivresse ponctuelle») correspond à l'absorption, en moins de 2 heures de temps, d'au moins 6 boissons alcoolisées chez les hommes et au moins 4 chez les femmes. Dans la Communauté Germanophone, 6,8% pratiquent le binge drinking toutes les semaines et 13,5% le font tous les mois mais pas chaque semaine. Ces chiffres sont supérieurs à ceux de l'ensemble de la Belgique, soit 4,3% et 7,1% respectivement, ainsi qu'à ceux de chacune des provinces.

Comme au niveau national, au sein de la Communauté Germanophone plus d'hommes que de femmes s'adonnent au binge drinking hebdomadaire (9,0% pour 4,6%) et mensuel (17,9% pour 9,3%). Cette pratique hebdomadaire est plus répandue chez les jeunes de la Communauté (14% des 15-24 ans) que parmi leurs aînés (4,9% à 5,8%) et que parmi les jeunes de 15-24 ans à l'échelle du pays (5,3%). C'est un mode de consommation qui caractérise aussi davantage la catégorie des diplômés du secondaire supérieur (9,1%) par rapport aux autres catégories socio-éducatives (4,4% à 6,9%). Les tendances dans le temps ne peuvent pas être évaluées par défaut de données comparatives.

#### 4.6. CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE

L'évaluation de la consommation problématique d'alcool est basée sur le test de screening « CAGE » (ou son acronyme français : DETA) et se réfère à la période des 12 derniers mois. En 2018, 7,0% des Belges ont connu des problèmes liés à leur consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois, pour 4,4% des membres de la Communauté Germanophone. Ici, l'usage problématique de l'alcool est plus courant parmi les hommes (5,9%) que les femmes (2,8%) et tend à baisser en fonction de l'âge (6,8% des 14-25 ans à 1,4% des 65+, n.s.). On ne distingue pas clairement un gradient socio-éducatif, mais les diplômés du secondaire supérieur semblent les plus affectés (6,0%), alors que ce sont les diplômés de l'enseignement supérieur qui portent le chapeau au niveau national (9,8%). Aucune comparaison dans le temps n'est possible pour cet indicateur.

**Tableau B 108. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

AL01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	83,4	(81,7-85,0)	83,3	(81,6-84,9)	3761
	<b>Femme</b>	70,1	(68,1-72,1)	70,0	(68,0-72,0)	4106
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	70,7	(66,0-75,5)	70,9	(66,0-75,5)	717
	<b>25 - 44</b>	79,0	(76,7-81,4)	79,7	(77,3-82,0)	2325
	<b>45 - 64</b>	79,6	(77,5-81,7)	80,2	(78,0-82,3)	2876
	<b>65 +</b>	71,3	(68,5-74,0)	72,5	(69,7-75,1)	1949
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	51,3	(44,9-57,6)	51,7	(45,2-58,1)	457
	<b>Secondaire inférieur</b>	59,5	(55,1-64,0)	59,8	(55,0-64,3)	962
	<b>Secondaire supérieur</b>	73,4	(70,9-75,9)	73,9	(71,2-76,4)	2352
	<b>Enseignement supérieur</b>	85,7	(84,0-87,4)	86,5	(84,7-88,1)	3945
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	77,1	(73,3-80,9)	77,5	(73,4-81,0)	843
	<b>Brabant Flamand</b>	79,2	(74,7-83,7)	79,8	(75,1-83,8)	508
	<b>Flandre Occidentale</b>	79,6	(76,2-83,0)	80,6	(77,1-83,7)	828
	<b>Flandre Orientale</b>	79,4	(75,4-83,5)	80,2	(75,7-84,0)	711
	<b>Limbourg</b>	69,2	(62,3-76,2)	69,9	(62,6-76,3)	293
	<b>Bruxelles</b>	70,2	(67,5-72,9)	70,3	(67,4-73,1)	1799
	<b>Brabant Wallon</b>	76,7	(70,0-83,4)	77,6	(70,0-83,7)	257
	<b>Hainaut</b>	72,7	(68,5-76,9)	73,4	(69,1-77,2)	796
	<b>Liège</b>	78,0	(73,2-82,8)	79,0	(74,0-83,2)	474
	<b>Luxembourg</b>	81,6	(76,6-86,7)	82,2	(76,7-86,6)	337
	<b>Namur</b>	81,7	(76,6-86,9)	82,8	(77,3-87,2)	313
	<b>Communauté Germanophone</b>	78,8	(74,9-82,7)	79,5	(75,3-83,2)	708
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	84,1	(82,9-85,3)	84,2	(82,9-85,4)	8259
	<b>2001</b>	80,5	(79,3-81,7)	81,1	(79,9-82,3)	9321
	<b>2004</b>	84,2	(83,1-85,3)	84,9	(83,7-85,9)	9531
	<b>2008</b>	80,4	(79,1-81,8)	81,1	(79,7-82,4)	7573
	<b>2013</b>	81,8	(80,5-83,2)	82,6	(81,2-84,0)	6155
	<b>2018</b>	76,6	(75,2-78,0)	77,4	(75,9-78,7)	7867

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence), Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018,

**Tableau B 109. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AL01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	80,7	(75,5-85,9)	80,9	(75,1-85,7)	357
	<b>Femme</b>	77,0	(71,9-82,0)	77,4	(71,8-82,1)	351
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	74,3	(62,2-86,4)	74,2	(60,6-84,4)	83
	<b>25 - 44</b>	83,6	(77,1-90,0)	83,6	(76,1-89,0)	159
	<b>45 - 64</b>	83,2	(77,1-89,2)	83,2	(76,2-88,5)	276
	<b>65 +</b>	67,6	(59,7-75,6)	67,8	(59,5-75,1)	190
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	46,9	(31,9-61,9)	49,0	(34,0-64,3)	60
	<b>Secondaire inférieur</b>	71,8	(58,8-84,7)	71,5	(55,7-83,3)	121
	<b>Secondaire supérieur</b>	81,9	(76,2-87,6)	82,4	(75,7-87,5)	201
	<b>Enseignement supérieur</b>	85,1	(79,8-90,3)	85,0	(79,2-89,5)	277
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	86,2	(80,5-91,8)	84,7	(77,4-90,0)	244
	<b>2001</b>	80,4	(72,8-88,0)	81,6	(73,2-87,8)	217
	<b>2004</b>	80,5	(73,7-87,4)	81,2	(73,6-87,0)	199
	<b>2008</b>	84,3	(77,4-91,2)	87,4	(80,3-92,2)	185
	<b>2013</b>	88,7	(83,8-93,7)	89,9	(84,1-93,7)	205
	<b>2018</b>	78,8	(74,9-82,7)	80,1	(75,6-84,0)	708

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 110. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons alcoolisées, Enquête de santé 2018 - Belgique**

AL01_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	13,5	(12,0-15,0)	9,5	(8,0-11,3)	3761
	<b>Femme</b>	6,1	(5,3-7,0)	3,9	(3,2-4,7)	4106
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,6	(0,0-1,3)	0,6	(0,2-1,5)	717
	<b>25 - 44</b>	3,9	(2,9-4,9)	3,5	(2,7-4,5)	2325
	<b>45 - 64</b>	13,2	(11,4-15,0)	12,2	(10,6-14,2)	2876
	<b>65 +</b>	17,1	(14,9-19,3)	16,5	(14,5-18,9)	1949
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,0	(6,4-13,7)	4,3	(2,7-6,5)	457
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,8	(6,4-11,2)	4,0	(2,9-5,6)	962
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,1	(6,8-9,5)	4,8	(3,8-6,1)	2352
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,9	(9,4-12,3)	7,5	(6,2-9,1)	3945
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	10,6	(8,0-13,1)	6,5	(4,8-8,7)	843
	<b>Brabant Flamand</b>	9,5	(6,3-12,7)	5,9	(4,0-8,5)	508
	<b>Flandre Occidentale</b>	11,0	(8,5-13,6)	6,3	(4,7-8,3)	828
	<b>Flandre Orientale</b>	8,6	(6,1-11,1)	5,2	(3,7-7,3)	711
	<b>Limbourg</b>	4,5	(1,9-7,2)	2,5	(1,3-4,6)	293
	<b>Bruxelles</b>	11,7	(10,1-13,3)	8,5	(7,0-10,3)	1799
	<b>Brabant Wallon</b>	12,1	(7,0-17,1)	7,6	(4,8-11,9)	257
	<b>Hainaut</b>	9,4	(6,6-12,2)	6,1	(4,4-8,5)	796
	<b>Liège</b>	9,8	(6,8-12,8)	6,1	(4,3-8,5)	474
	<b>Luxembourg</b>	6,4	(3,2-9,6)	3,8	(2,3-6,3)	337
	<b>Namur</b>	12,4	(8,2-16,7)	7,9	(5,0-12,2)	313
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,4	(3,4-7,5)	3,1	(2,0-4,8)	708
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	7,7	(6,8-8,6)	6,6	(5,8-7,5)	8259
	<b>2001</b>	9,7	(8,9-10,5)	7,8	(7,0-8,5)	9321
	<b>2004</b>	9,2	(8,4-10,0)	7,2	(6,5-8,0)	9531
	<b>2008</b>	12,0	(11,0-13,1)	9,4	(8,6-10,4)	7573
	<b>2013</b>	14,2	(13,0-15,5)	10,8	(9,8-11,9)	6155
	<b>2018</b>	9,7	(8,8-10,6)	7,1	(6,4-7,8)	7867

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018,

Tableau B 111. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons alcoolisées, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

AL01_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,0	(3,3-8,8)	3,6	(1,7-7,5)	357
	<b>Femme</b>	4,9	(2,2-7,5)	2,8	(1,3-5,7)	351
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,4	(0,0-10,9)	4,3	(1,0-16,6)	83
	<b>25 - 44</b>	0,5	(0,0-1,4)	0,5	(0,1-3,2)	159
	<b>45 - 64</b>	7,0	(3,1-10,9)	6,9	(3,9-12,1)	276
	<b>65 +</b>	9,5	(4,7-14,4)	9,5	(5,7-15,6)	190
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	1,4	(0,0-4,3)	0,4	(0,1-3,3)	60
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,2	(0,0-10,4)	2,1	(0,6-6,5)	121
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,8	(0,7-8,9)	2,9	(1,0-8,7)	201
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,5	(3,2-9,8)	4,6	(2,4-8,7)	277
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	3,3	(0,0-6,9)	3,5	(1,1-10,1)	244
	<b>2001</b>	3,5	(1,0-5,9)	3,2	(1,6-6,5)	217
	<b>2004</b>	3,2	(0,0-6,5)	2,9	(1,1-7,6)	199
	<b>2008</b>	6,7	(1,0-12,4)	5,7	(2,4-12,8)	185
	<b>2013</b>	9,7	(4,3-15,1)	8,7	(4,8-15,3)	205
	<b>2018</b>	5,4	(3,4-7,5)	4,7	(3,1-7,0)	708

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 112. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est considérée excessive (F >14, M > 21 verres par semaine), Enquête de santé 2018 - Belgique

AL05_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	7,6	(6,4-8,8)	7,2	(6,2-8,4)	3686
	Femme	4,3	(3,5-5,0)	4,1	(3,4-4,9)	4014
GROUPE D'AGE	15 - 24	5,4	(3,1-7,8)	5,2	(3,3-7,9)	711
	25 - 44	4,7	(3,6-5,8)	4,5	(3,6-5,7)	2287
	45 - 64	8,2	(6,7-9,7)	7,9	(6,6-9,5)	2810
	65 +	4,1	(3,0-5,1)	4,0	(3,1-5,2)	1892
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	4,7	(2,3-7,1)	4,8	(2,8-8,1)	451
	Secondaire inférieur	4,0	(2,4-5,6)	3,8	(2,5-5,7)	941
	Secondaire supérieur	5,6	(4,4-6,9)	5,1	(4,1-6,4)	2302
	Enseignement supérieur	6,7	(5,5-7,8)	6,1	(5,1-7,3)	3857
PROVINCE	Anvers	5,9	(3,7-8,1)	5,3	(3,7-7,6)	823
	Brabant Flamand	4,0	(2,0-5,9)	3,6	(2,2-5,9)	498
	Flandre Occidentale	6,6	(4,5-8,7)	6,1	(4,5-8,4)	812
	Flandre Orientale	5,1	(3,1-7,1)	4,6	(3,1-6,9)	687
	Limbourg	3,4	(0,3-6,6)	3,2	(1,3-7,9)	286
	Bruxelles	7,3	(6,0-8,6)	6,9	(5,7-8,4)	1768
	Brabant Wallon	8,7	(4,1-13,3)	7,9	(4,6-13,2)	253
	Hainaut	5,7	(3,8-7,5)	5,2	(3,7-7,2)	782
	Liège	7,3	(4,4-10,2)	6,8	(4,6-10,0)	462
	Luxembourg	3,3	(1,4-5,3)	3,0	(1,6-5,3)	328
	Namur	9,1	(5,1-13,2)	8,7	(5,4-13,5)	309
	Communauté Germanophone	5,0	(3,0-7,0)	4,4	(2,9-6,6)	692
ANNEE	1997	7,0	(6,2-7,8)	6,4	(5,7-7,3)	8061
	2001	9,3	(8,4-10,1)	8,7	(7,9-9,6)	8817
	2004	9,0	(8,1-9,8)	8,4	(7,6-9,2)	9051
	2008	7,9	(7,0-8,8)	7,3	(6,5-8,2)	7295
	2013	6,4	(5,6-7,3)	5,9	(5,2-6,7)	5990
	2018	5,9	(5,1-6,6)	5,4	(4,7-6,1)	7700

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence) Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 113. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est considérée excessive (F >14 verres, M > 21 verres par semaine), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AL05_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,0	(3,6-10,4)	6,3	(3,5-11,1)	350
	<b>Femme</b>	3,0	(1,2-4,9)	2,8	(1,5-5,1)	342
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,5	(2,2-16,9)	8,7	(4,1-17,5)	83
	<b>25 - 44</b>	3,0	(0,0-7,1)	2,8	(0,8-9,5)	156
	<b>45 - 64</b>	5,4	(2,1-8,7)	4,9	(2,5-9,5)	268
	<b>65 +</b>	3,7	(0,8-6,6)	3,4	(1,5-7,7)	185
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,6	(0,0-6,5)	2,3	(0,5-11,0)	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	1,4	(0,0-3,6)	1,2	(0,2-5,5)	117
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,5	(1,6-11,4)	5,4	(2,4-11,7)	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,4	(3,1-9,6)	5,3	(2,8-9,7)	272
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	2,0	(0,0-4,4)	1,5	(0,4-5,3)	235
	<b>2001</b>	5,0	(2,0-8,0)	3,8	(2,0-7,3)	193
	<b>2004</b>	7,1	(3,1-11,1)	6,1	(3,3-10,9)	188
	<b>2008</b>	5,6	(0,6-10,5)	4,6	(2,0-10,1)	175
	<b>2013</b>	8,6	(3,5-13,6)	7,2	(4,0-12,8)	199
	<b>2018</b>	5,0	(3,0-7,0)	3,9	(2,5-5,9)	692

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 114. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par occasion au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique

AL06_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	11,5	(10,0-13,0)	11,0	(9,7-12,5)	3647
	<b>Femme</b>	3,9	(3,1-4,6)	3,8	(3,1-4,6)	3977
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,4	(7,4-13,5)	9,1	(6,6-12,3)	704
	<b>25 - 44</b>	8,4	(6,7-10,0)	7,4	(6,1-9,0)	2284
	<b>45 - 64</b>	8,1	(6,7-9,6)	7,1	(5,9-8,6)	2789
	<b>65 +</b>	4,1	(3,1-5,1)	3,7	(2,8-4,8)	1847
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,8	(3,2-8,5)	6,2	(3,8-9,9)	447
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,1	(3,4-6,9)	5,0	(3,5-7,1)	917
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,6	(6,9-10,3)	7,1	(5,8-8,7)	2278
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,8	(6,5-9,0)	6,4	(5,4-7,6)	3836
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	8,0	(5,6-10,4)	6,6	(4,8-9,0)	811
	<b>Brabant Flamand</b>	7,7	(4,9-10,6)	6,5	(4,4-9,6)	489
	<b>Flandre Occidentale</b>	8,6	(6,3-10,9)	7,5	(5,7-9,9)	798
	<b>Flandre Orientale</b>	7,5	(5,0-10,0)	6,3	(4,5-8,9)	691
	<b>Limbourg</b>	5,3	(1,8-8,9)	4,7	(2,4-8,9)	287
	<b>Bruxelles</b>	7,3	(5,8-8,7)	6,0	(4,8-7,5)	1761
	<b>Brabant Wallon</b>	4,4	(1,9-6,9)	3,6	(2,0-6,4)	251
	<b>Hainaut</b>	7,1	(5,0-9,2)	5,9	(4,3-8,1)	768
	<b>Liège</b>	8,8	(5,0-12,6)	7,8	(5,1-11,8)	462
	<b>Luxembourg</b>	8,7	(5,2-12,2)	7,3	(4,7-11,0)	324
	<b>Namur</b>	7,3	(4,0-10,6)	6,4	(4,0-10,1)	307
	<b>Communauté Germanophone</b>	8,2	(5,9-10,6)	6,8	(5,0-9,2)	675
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	8,1	(7,2-9,0)	6,6	(5,8-7,5)	7521
	<b>2013</b>	8,5	(7,5-9,4)	7,0	(6,2-7,9)	5967
	<b>2018</b>	7,6	(6,7-8,5)	6,2	(5,5-7,0)	7624

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 115. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par occasion au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AL06_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	11,2	(7,5-14,9)	10,4	(7,3-14,5)	343
	<b>Femme</b>	5,3	(2,4-8,2)	4,9	(2,8-8,4)	332
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	17,3	(7,8-26,8)	16,1	(9,0-27,2)	79
	<b>25 - 44</b>	5,0	(1,8-8,2)	4,6	(2,4-8,6)	156
	<b>45 - 64</b>	7,2	(3,6-10,8)	6,7	(3,8-11,4)	263
	<b>65 +</b>	8,4	(3,7-13,0)	8,0	(4,5-14,0)	177
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,8	(1,6-20,1)	10,9	(4,5-24,3)	58
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,1	(1,3-10,8)	5,7	(2,5-12,4)	111
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,6	(4,7-14,6)	8,0	(4,7-13,0)	194
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,7	(4,3-11,0)	6,2	(3,6-10,4)	267
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	8,8	(2,3-15,3)	7,3	(3,9-13,4)	185
	<b>2013</b>	16,1	(10,1-22,0)	14,0	(9,2-20,7)	200
	<b>2018</b>	8,2	(5,9-10,6)	6,4	(4,4-9,1)	675

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 116. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Enquête de santé 2018 - Belgique

AL07_1		Ne boit pas, plus, peu	Pas an dernier	Moins d'1/mois	Chaque mois	Chaque sem,	N
SEXE	Homme	42,1	22,9	20,2	8,8	6,0	3623
	Femme	64,8	12,3	14,8	5,4	2,7	3981
GROUPE D'AGE	15 - 24	43,7	9,9	26,6	14,4	5,3	702
	25 - 44	45,6	19,3	21,8	9,2	4,1	2275
	45 - 64	54,0	19,0	16,2	5,9	4,9	2783
	65 +	70,7	16,3	8,1	2,0	3,0	1844
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	69,2	16,8	7,9	2,1	4,0	447
	Secondaire inférieur	67,9	13,5	11,2	4,5	2,8	910
	Secondaire supérieur	53,2	16,8	18,1	7,1	4,8	2264
	Enseignement supérieur	48,8	18,9	19,7	8,3	4,4	3838
PROVINCE	Anvers	53,8	17,8	16,3	8,1	4,1	807
	Brabant Flamand	57,2	16,3	16,6	7,3	2,4	493
	Flandre Occidentale	51,8	22,5	15,3	5,4	5,0	797
	Flandre Orientale	50,8	22,2	16,9	6,2	3,9	684
	Limbourg	62,5	12,6	13,6	6,3	5,1	287
	Bruxelles	60,6	15,0	15,1	5,2	4,0	1764
	Brabant Wallon	52,8	15,4	26,2	3,6	2,0	252
	Hainaut	52,2	16,8	19,3	6,5	5,1	771
	Liège	50,8	12,6	21,1	9,6	5,9	459
	Luxembourg	47,1	17,7	20,7	10,4	4,1	322
	Namur	52,2	15,1	17,6	11,5	3,5	303
	Communauté Germanophone	34,5	17,0	28,2	13,5	6,8	665
ANNEE	2018	53,8	17,5	17,4	7,1	4,3	7604

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 117. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

AL07_1		Ne boit pas, plus, peu	Pas l'an dernier	Moins d'1x /mois	Chaque mois	Chaque sem,	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	30,6	17,5	25,0	17,9	9,0	333
	<b>Femme</b>	38,3	16,5	31,3	9,3	4,6	332
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	36,1	6,7	25,5	17,7	14,0	80
	<b>25 - 44</b>	24,9	16,7	33,6	19,9	4,9	154
	<b>45 - 64</b>	31,7	19,8	30,0	12,6	5,8	263
	<b>65 +</b>	52,4	19,3	19,1	3,4	5,8	168
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	67,4	8,8	14,3	5,0	4,4	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	39,1	22,6	20,0	11,4	6,9	108
	<b>Secondaire supérieur</b>	30,7	11,9	34,8	13,5	9,1	192
	<b>Enseignement supérieur</b>	30,4	17,6	28,9	17,7	5,4	267
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	34,5	17,0	28,2	13,5	6,8	665

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 118. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté un usage problématique de l'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Belgique**

<b>AL_2</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	9,5	(8,1-10,9)	8,6	(7,3-10,2)	3619
	<b>Femme</b>	4,7	(3,8-5,6)	4,4	(3,6-5,3)	3909
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,8	(6,7-13,0)	9,2	(6,7-12,7)	709
	<b>25 - 44</b>	7,5	(6,1-8,9)	7,1	(5,9-8,5)	2268
	<b>45 - 64</b>	8,5	(6,7-10,2)	8,0	(6,4-9,9)	2736
	<b>65 +</b>	2,7	(1,6-3,8)	2,6	(1,7-3,9)	1815
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,1	(0,1-4,1)	2,4	(0,9-6,2)	433
	<b>Secondaire inférieur</b>	2,5	(1,2-3,9)	2,6	(1,5-4,5)	906
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,1	(3,7-6,5)	4,3	(3,3-5,7)	2245
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,8	(8,4-11,3)	8,5	(7,2-10,0)	3801
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	6,7	(4,7-8,8)	5,8	(4,2-7,8)	809
	<b>Brabant Flamand</b>	5,5	(3,2-7,7)	4,7	(3,0-7,1)	482
	<b>Flandre Occidentale</b>	6,3	(4,1-8,5)	5,7	(4,0-8,0)	789
	<b>Flandre Orientale</b>	6,5	(4,3-8,6)	5,5	(3,9-7,8)	684
	<b>Limbourg</b>	6,1	(2,5-9,6)	5,5	(3,0-9,9)	282
	<b>Bruxelles</b>	8,1	(6,6-9,6)	6,9	(5,6-8,5)	1728
	<b>Brabant Wallon</b>	8,6	(4,0-13,1)	7,3	(4,3-12,1)	248
	<b>Hainaut</b>	8,1	(4,7-11,4)	6,9	(4,5-10,4)	762
	<b>Liège</b>	9,2	(5,6-12,8)	8,3	(5,4-12,5)	455
	<b>Luxembourg</b>	8,3	(5,0-11,6)	7,1	(4,6-10,8)	319
	<b>Namur</b>	5,6	(2,2-9,1)	4,9	(2,6-9,0)	296
	<b>Communauté Germanophone</b>	4,4	(2,5-6,2)	3,6	(2,3-5,6)	674
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	7,0	(6,2-7,9)			7528

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 119. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté un usage problématique de l'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AL_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,9	(2,8-9,1)	5,1	(2,9-8,7)	342
	Femme	2,8	(0,9-4,7)	2,4	(1,1-5,2)	332
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,8	(0,0-14,0)	6,3	(2,3-16,2)	83
	25 - 44	4,9	(1,0-8,9)	4,6	(2,1-9,6)	158
	45 - 64	4,6	(1,8-7,3)	4,3	(2,1-8,4)	264
	65 +	1,4	(0,0-3,4)	1,3	(0,3-6,1)	169
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	3,3	(0,0-9,7)	4,0	(0,6-22,8)	56
	Secondaire inférieur	1,0	(0,0-3,1)	0,9	(0,1-6,5)	109
	Secondaire supérieur	6,0	(1,7-10,4)	4,8	(2,4-9,6)	194
	Enseignement supérieur	4,9	(2,0-7,9)	3,7	(1,6-8,4)	268
ANNEE	2018	4,4	(2,5-6,2)			674

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 5. L'Usage du tabac

La consommation de tabac représente une des principales causes de décès évitables dans le monde et elle est la première cause de décès prématuré en Europe. Deux indicateurs fondamentaux de l'usage du tabac sont présentés ici. Le premier (TA06\_1), plus détaillé dans les tableaux, définit le statut tabagique des individus selon 4 catégories : les fumeurs quotidiens (qui ont fumé plus de 100 cigarettes dans leur vie et qui fument actuellement tous les jours), les fumeurs occasionnels (qui ont fumé plus de 100 cigarettes dans leur vie et qui fument actuellement occasionnellement), les anciens fumeurs (qui ont fumé plus de 100 cigarettes dans leur vie mais ne fument pas actuellement) et les personnes qui n'ont jamais fumé (ou moins de 100 cigarettes dans leur vie). Le second indicateur se centre sur les fumeurs quotidiens uniquement (TA06\_3), tous produits du tabac confondus. Tous les indicateurs tabagiques repris dans le rapport national ne sont toutefois pas examinés ici à cause des sous-échantillons exigus à ce niveau d'analyse au sein de l'échantillon germanophone.

### 5.1. USAGE DU TABAC

Au niveau national, un peu moins d'une personne sur cinq (19,4%) de 15 ans et plus est fumeur en 2018 (soit 15,4% de fumeurs quotidiens et 4,0% de fumeurs occasionnels) et 80,6% de la population est non-fumeur (23,1% d'ex-fumeurs et 57,5% qui n'ont jamais fumé ou du moins pas plus de 100 cigarettes en tout dans leur vie). Il s'agit donc d'une baisse relative par rapport aux résultats de 2013, où l'on comptait 23,0% de fumeurs et 77,0% de non-fumeurs. On observe à la fois un plus grand nombre relatif d'ex-fumeurs (de 21,3% en 2013 à 23,1% en 2018) que de personnes qui n'ont jamais acquis l'habitude tabagique (de 55,8% en 2013 à 57,5% en 2018).

Au sein de la Communauté Germanophone, les taux sont similaires aux chiffres nationaux avec 19,0% de fumeurs (14,0% quotidiens, 5,0% occasionnels) et 79,0% de non-fumeurs. Ici, ce sont surtout les individus qui qui n'ont jamais commencé de fumer qui a progressé parmi les non-fumeurs (51,0% en 2013 à 58,3% en 2018), alors que le nombre d'ex-fumeurs tend à diminuer (25,0% en 2013 et seulement 22,7% en 2018). Notons que les chiffres du tabagisme journalier sont ici meilleurs que pour la province liégeoise, où l'on enregistre 20,7% de fumeurs quotidiens, le taux le plus élevé du pays.

Contrairement à ce qui est observé au niveau national, dans la Communauté Germanophone autant de femmes que d'hommes fument quotidiennement (14,4% et 13,6% respectivement). Elles sont toutefois plus nombreuses que les hommes à n'avoir jamais fumé de leur vie (61,6% pour 54,9% des hommes). Les jeunes de 15-24 ans de la Communauté sont nombreux à n'avoir encore jamais fumé (83,0%), une proportion un rien plus élevée qu'au niveau national (80,9%) mais comparable à celle de la province de Liège (82,8% des 15-24 ans).

On trouve le plus grand nombre relatif de fumeurs quotidiens dans la classe d'âge de 25 à 44 ans (19,2%). Quant au statut social, les personnes ayant suivi des études supérieures sont moins souvent des fumeurs quotidiens (6,8%) que celles avec un diplôme du secondaire (20,6-24,0%). Les personnes sans diplômes ou un diplôme de l'école primaire sont aussi moins nombreuses à fumer au quotidien (6,5%).

Tableau B 120. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le comportement tabagique, Enquête de santé 2018 – Belgique

TA06_1		Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Ex fumeur	Jamais fumé	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	18,9	5,6	27,6	47,9	3744
	<b>Femme</b>	12,1	2,5	18,8	66,6	4085
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	11,1	4,4	3,7	80,9	713
	<b>25 - 44</b>	19,3	6,2	17,6	56,9	2314
	<b>45 - 64</b>	18,8	3,4	27,0	50,8	2868
	<b>65 +</b>	6,7	1,6	34,5	57,2	1934
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	14,2	2,6	22,0	61,2	459
	<b>Secondaire inférieur</b>	22,5	1,9	25,9	49,7	955
	<b>Secondaire supérieur</b>	21,0	3,1	24,9	51,1	2331
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,1	5,3	21,3	63,3	3934
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	13,6	3,3	24,7	58,4	836
	<b>Brabant Flamand</b>	11,5	4,6	19,1	64,8	508
	<b>Flandre Occidentale</b>	14,2	3,2	27,9	54,6	827
	<b>Flandre Orientale</b>	14,2	5,1	26,4	54,2	705
	<b>Limbourg</b>	12,0	4,1	27,5	56,4	292
	<b>Bruxelles</b>	16,6	6,3	18,8	58,3	1787
	<b>Brabant Wallon</b>	18,0	4,4	20,0	57,6	257
	<b>Hainaut</b>	18,8	3,2	16,8	61,2	789
	<b>Liège</b>	20,7	3,5	24,6	51,2	476
	<b>Luxembourg</b>	18,0	2,0	26,9	53,1	336
	<b>Namur</b>	15,3	2,2	21,5	61,0	309
	<b>Communauté Germanophone</b>	14,0	5,0	22,7	58,3	707
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	25,5	4,8	24,6	45,1	7763
	<b>2001</b>	24,1	4,5	30,7	40,7	9176
	<b>2004</b>	24,0	3,8	20,1	52,1	8683
	<b>2008</b>	20,7	3,9	22,0	53,3	7365
	<b>2013</b>	18,9	4,1	21,3	55,8	6216
	<b>2018</b>	15,4	4,0	23,1	57,5	7829

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 121. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le comportement tabagique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

TA06_1		Fumeur quotidien	Fumeur occasionnel	Ex fumeur	Jamais fumé	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	13,6	6,9	24,6	54,9	358
	<b>Femme</b>	14,4	3,1	20,9	61,6	349
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,1	3,6	3,2	83,0	83
	<b>25 - 44</b>	19,2	5,8	21,6	53,4	159
	<b>45 - 64</b>	14,1	7,2	26,3	52,4	275
	<b>65 +</b>	9,9	0,7	30,3	59,1	190
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,5	1,6	22,4	69,5	63
	<b>Secondaire inférieur</b>	24,0	6,4	21,5	48,0	118
	<b>Secondaire supérieur</b>	20,6	7,4	21,6	50,4	202
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,8	3,9	22,1	67,1	276
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	20,5	9,3	20,8	49,4	234
	<b>2001</b>	25,6	7,1	30,9	36,4	212
	<b>2004</b>	25,2	4,4	20,0	50,3	180
	<b>2008</b>	18,1	3,5	20,5	57,9	180
	<b>2013</b>	19,0	5,0	25,0	51,0	210
	<b>2018</b>	14,0	5,0	22,7	58,3	707

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 122. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui fume actuellement tous les jours, Enquête de santé 2018 – Belgique

TA06_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	18,9	(17,1-20,7)	17,3	(15,7-19,0)	3744
	<b>Femme</b>	12,1	(10,8-13,5)	11,1	(9,8-12,5)	4085
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	11,1	(8,2-14,0)	10,7	(8,2-13,9)	713
	<b>25 - 44</b>	19,3	(17,0-21,6)	19,0	(16,8-21,4)	2314
	<b>45 - 64</b>	18,8	(16,7-20,9)	18,5	(16,5-20,7)	2868
	<b>65 +</b>	6,7	(5,3-8,2)	6,6	(5,3-8,3)	1934
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	14,2	(10,0-18,3)	18,0	(13,4-23,8)	459
	<b>Secondaire inférieur</b>	22,5	(18,9-26,2)	24,6	(20,8-28,9)	955
	<b>Secondaire supérieur</b>	21,0	(18,5-23,5)	18,3	(16,1-20,8)	2331
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,1	(8,7-11,5)	8,0	(6,8-9,3)	3934
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	13,6	(10,6-16,6)	11,9	(9,3-15,0)	836
	<b>Brabant Flamand</b>	11,5	(8,3-14,7)	10,1	(7,5-13,3)	508
	<b>Flandre Occidentale</b>	14,2	(11,2-17,3)	13,3	(10,6-16,5)	827
	<b>Flandre Orientale</b>	14,2	(10,5-18,0)	12,7	(9,7-16,4)	705
	<b>Limbourg</b>	12,0	(6,8-17,3)	11,0	(6,9-17,0)	292
	<b>Bruxelles</b>	16,6	(14,6-18,6)	14,3	(12,5-16,4)	1787
	<b>Brabant Wallon</b>	18,0	(11,1-24,9)	16,7	(11,2-24,1)	257
	<b>Hainaut</b>	18,8	(15,3-22,3)	16,9	(13,9-20,5)	789
	<b>Liège</b>	20,7	(15,9-25,5)	19,2	(14,9-24,3)	476
	<b>Luxembourg</b>	18,0	(12,2-23,8)	16,2	(11,4-22,4)	336
	<b>Namur</b>	15,3	(9,9-20,6)	14,1	(9,7-20,1)	309
	<b>Communauté Germanophone</b>	14,0	(10,7-17,3)	12,5	(9,7-15,9)	707
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	25,5	(24,0-27,1)	22,6	(21,1-24,1)	7763
	<b>2001</b>	24,1	(22,8-25,4)	22,2	(21,0-23,5)	9176
	<b>2004</b>	24,0	(22,6-25,4)	22,0	(20,7-23,4)	8683
	<b>2008</b>	20,7	(19,3-22,2)	19,1	(17,7-20,5)	7365
	<b>2013</b>	18,9	(17,4-20,4)	17,5	(16,1-19,0)	6216
	<b>2018</b>	15,4	(14,2-16,6)	14,2	(13,1-15,4)	7829

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 123. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui fume actuellement tous les jours, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

TA06_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	13,6	(9,4-17,8)	13,2	(9,6-17,9)	358
	<b>Femme</b>	14,4	(10,1-18,7)	14,1	(10,3-19,1)	349
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,1	(3,6-16,7)	10,1	(5,3-18,6)	83
	<b>25 - 44</b>	19,2	(12,0-26,3)	19,2	(13,1-27,3)	159
	<b>45 - 64</b>	14,1	(8,7-19,4)	14,1	(9,5-20,3)	275
	<b>65 +</b>	9,9	(3,8-16,0)	9,8	(5,2-17,7)	190
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,5	(0,3-12,8)	7,5	(2,7-19,1)	63
	<b>Secondaire inférieur</b>	24,0	(12,7-35,3)	25,6	(15,4-39,4)	118
	<b>Secondaire supérieur</b>	20,6	(13,4-27,8)	19,8	(13,9-27,3)	202
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,8	(3,5-10,2)	6,1	(3,5-10,4)	276
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	20,5	(13,1-28,0)	18,5	(12,6-26,3)	234
	<b>2001</b>	25,6	(14,9-36,3)	24,7	(15,7-36,5)	212
	<b>2004</b>	25,2	(16,6-33,8)	24,0	(16,6-33,3)	180
	<b>2008</b>	18,1	(10,6-25,5)	18,3	(12,0-26,9)	180
	<b>2013</b>	19,0	(12,3-25,8)	18,6	(12,7-26,4)	210
	<b>2018</b>	14,0	(10,7-17,3)	13,4	(10,5-17,1)	707

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 6. Usage de la cigarette électronique

L'appellation générique de « cigarette électronique » (ou e-cigarette) couvre un ensemble de petits appareils imitant les items classiques du tabac (cigarettes, cigares, pipes, narghilés) mais qui génèrent un aérosol (de la vapeur) à la place de la fumée, réduisant ainsi les risques dus à la combustion du tabac. Le liquide (ou « e-liquide ») présent dans une capsule et chauffé par une résistance, est composé d'eau, de propylène glycol, de glycérine, d'arômes ou d'extraits de tabac, auxquels peut être ajoutée de la nicotine à des niveaux de concentration variables. L'e-cigarette a été utilisée au départ comme substitut nicotinique lors du sevrage tabagique. Or, si l'on peut se réjouir de son rôle premier, il faut toutefois garder une certaine réserve : on compte moins de fumeurs traditionnels qui abandonnent le tabac que de nouveaux candidats au « vapotage ». Certaines recherches préconisent d'ailleurs que la cigarette électronique ouvre la voie au tabagisme classique auprès des adolescents, bien que les conclusions dans ce domaine doivent encore être étayées par des études longitudinales. Face à l'essor rapide de l'e-cigarette et le peu de contrôle exercé à son égard, les effets à long terme de ces produits sur la santé n'ont pas encore pu être pleinement évalués. Or, les solutions d'e-liquides contiennent parfois des substances qui, chauffées ou inhalées, deviennent allergènes, irritantes ou toxiques. L'analyse de certains aérosols ont notamment mis en évidence la présence de composants nocifs (formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine, ...) et de particules de métaux lourds (plomb, arsenic, nickel, chrome, cadmium, ...). L'enquête de santé de 2018 a introduit un module destiné à évaluer l'usage de l'e-cigarette au sein la population de Belgique. Plusieurs indicateurs sont présentés ci-après.

On s'intéresse ici aux indicateurs qui ont trait à l'usage et la fréquence d'utilisation de la cigarette électronique : la proportion de personnes qui l'ont déjà essayée au cours de leur vie (EC01\_1), la distribution des personnes selon qu'elles utilisent l'e-cigarette quotidiennement, occasionnellement, plus du tout, ou ne l'ont jamais utilisée (EC02\_1, uniquement dans les tableaux) et la proportion des personnes qui indiquent l'utiliser au moment de l'enquête (EC02\_2, somme des personnes qui l'utilisent tous les jours et occasionnellement).

En Belgique en 2018, 15,5% de la population âgée de 15 ans et plus a déjà essayé la cigarette électronique au moins une fois dans sa vie, 4,1% l'utilise au moment de l'enquête et 1,4% l'utilise quotidiennement.

En Communauté Germanophone, les chiffres sont proches des taux nationaux (différences non significatives) : 13,9% l'ont déjà essayée, 3,8% l'utilisent encore au moment de l'enquête (1,1% quotidiennement). La cigarette électronique est moins populaire dans la Communauté que dans la province de Liège, où 20,5% l'ont essayée (différence significative), mais où seuls 4,5% l'utilisent encore (n.s.). Un peu plus d'hommes que de femmes ont essayé la cigarette électronique au sein de la Communauté (15,5% et 12,3%), cette différence n'étant toutefois pas significative. Les hommes sont par contre plus nombreux que les femmes à être des usagers actuels, c'est-à-dire au moment de l'enquête (respectivement 5,6% et 2,7%), une différence significative même après ajustement pour l'âge. La proportion de ceux qui ont expérimenté l'e-cigarette se réduit avec l'âge : de 22,1% chez les jeunes de 15-24 ans à 4,7% chez les aînés de 65 ans et plus. L'usage actuel de l'e-cigarette n'est lui pas lié à l'âge. Le statut social, représenté par le niveau d'éducation, n'est pas un élément déterminant pour l'utilisation de la cigarette électronique dans la Communauté. En revanche, au niveau national, les personnes qui ont essayé ou qui utilisent encore l'e-cigarette au moment de l'enquête se concentrent parmi les diplômés du secondaire supérieur (par opposition aux autres classes d'éducation).

Tableau B 124. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà essayé la cigarette électronique au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Belgique

EC01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	19,4	(17,4-21,3)	16,9	(15,2-18,7)	3613
	<b>Femme</b>	11,9	(10,5-13,2)	10,2	(8,9-11,6)	3891
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	25,4	(20,9-29,9)	24,7	(20,7-29,3)	695
	<b>25 - 44</b>	22,2	(19,7-24,8)	21,8	(19,4-24,4)	2271
	<b>45 - 64</b>	12,9	(11,1-14,8)	12,6	(10,8-14,6)	2729
	<b>65 +</b>	4,4	(3,2-5,7)	4,3	(3,2-5,8)	1809
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	9,4	(5,4-13,3)	11,9	(7,9-17,5)	429
	<b>Secondaire inférieur</b>	12,3	(9,3-15,2)	13,6	(10,8-17,1)	898
	<b>Secondaire supérieur</b>	20,5	(17,8-23,2)	17,0	(14,7-19,7)	2201
	<b>Enseignement supérieur</b>	13,7	(12,1-15,4)	10,4	(9,0-12,0)	3835
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	15,7	(12,5-18,9)	13,1	(10,5-16,2)	796
	<b>Brabant Flamand</b>	12,2	(8,5-15,8)	9,9	(7,1-13,6)	485
	<b>Flandre Occidentale</b>	10,9	(8,0-13,7)	9,7	(7,4-12,6)	784
	<b>Flandre Orientale</b>	16,5	(12,6-20,5)	14,0	(10,9-17,9)	679
	<b>Limbourg</b>	15,8	(9,5-22,1)	14,2	(9,1-21,5)	281
	<b>Bruxelles</b>	15,9	(13,7-18,1)	12,3	(10,5-14,4)	1731
	<b>Brabant Wallon</b>	17,3	(10,8-23,8)	14,4	(9,5-21,1)	246
	<b>Hainaut</b>	17,3	(13,6-21,1)	14,3	(11,4-17,8)	748
	<b>Liège</b>	20,6	(15,7-25,6)	18,5	(14,2-23,7)	459
	<b>Luxembourg</b>	14,0	(9,4-18,6)	11,5	(8,0-16,2)	317
	<b>Namur</b>	13,0	(8,1-18,0)	11,2	(7,4-16,6)	305
	<b>Communauté Germanophone</b>	13,9	(10,4-17,3)	11,6	(8,8-15,0)	673
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	15,5	(14,3-16,8)			7504

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 125. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà essayé la cigarette électronique au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

EC01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	15,5	(10,7-20,2)	13,7	(9,7-19,0)	342
	<b>Femme</b>	12,3	(8,1-16,5)	10,9	(7,5-15,6)	331
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	22,2	(12,2-32,3)	22,1	(13,7-33,5)	78
	<b>25 - 44</b>	19,8	(12,7-27,0)	19,7	(13,6-27,7)	160
	<b>45 - 64</b>	11,3	(6,3-16,4)	11,2	(7,1-17,3)	262
	<b>65 +</b>	4,7	(0,9-8,5)	4,7	(2,1-10,3)	173
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	12,3	(3,8-20,8)	14,2	(6,9-27,0)	107
	<b>Secondaire supérieur</b>	16,3	(10,2-22,5)	13,9	(9,0-20,8)	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	14,5	(9,1-19,9)	11,9	(7,6-18,1)	270
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	13,9	(10,4-17,3)			673

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 126. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'usage de la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Belgique

EC02_1		Usage quotidien	Usage occasionnel	Usage abandonné	Jamais utilisé	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,8	3,7	13,8	80,6	3613
	<b>Femme</b>	1,0	1,7	9,1	88,1	3891
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,6	4,9	19,9	74,6	695
	<b>25 - 44</b>	2,2	3,2	16,8	77,8	2271
	<b>45 - 64</b>	1,8	2,8	8,3	87,1	2729
	<b>65 +</b>	0,1	0,7	3,7	95,6	1809
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,7	1,4	7,3	90,6	429
	<b>Secondaire inférieur</b>	2,4	2,1	7,7	87,7	898
	<b>Secondaire supérieur</b>	1,8	4,5	14,1	79,5	2201
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,0	1,8	10,9	86,3	3835
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	1,5	3,8	10,4	84,3	796
	<b>Brabant Flamand</b>	1,3	2,2	8,6	87,8	485
	<b>Flandre Occidentale</b>	1,2	2,5	7,1	89,1	784
	<b>Flandre Orientale</b>	1,0	3,9	11,7	83,5	679
	<b>Limbourg</b>	2,4	1,4	12,0	84,2	281
	<b>Bruxelles</b>	1,7	1,7	12,5	84,1	1731
	<b>Brabant Wallon</b>	0,0	2,2	15,1	82,7	246
	<b>Hainaut</b>	2,3	1,7	13,4	82,7	748
	<b>Liège</b>	0,8	3,7	16,1	79,4	459
	<b>Luxembourg</b>	0,4	1,5	12,1	86,0	317
	<b>Namur</b>	1,5	2,2	9,3	87,0	305
	<b>Communauté Germanophone</b>	1,1	2,8	10,0	86,1	673
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	1,4	2,7	11,4	84,5	7504

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 127. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'usage de la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

EC02_1		Usage quotidien	Usage occasionnel	Usage abandonné	Jamais utilisé	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,2	3,0	11,3	84,5	342
	<b>Femme</b>	0,9	2,5	8,8	87,7	331
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,7	4,0	16,6	77,8	78
	<b>25 - 44</b>	0,9	1,0	17,8	80,2	160
	<b>45 - 64</b>	1,1	4,0	6,3	88,7	262
	<b>65 +</b>	0,8	1,9	2,0	95,3	173
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	0,0	0,0	100,0	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	1,1	1,2	10,0	87,7	107
	<b>Secondaire supérieur</b>	0,4	3,1	12,8	83,7	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	0,3	3,0	11,2	85,5	270
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	1,1	2,8	10,0	86,1	673

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 128. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui utilise actuellement\* la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Belgique

EC02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,6	(4,5-6,7)	4,4	(3,6-5,5)	3613
	<b>Femme</b>	2,7	(2,0-3,5)	2,2	(1,7-2,9)	3891
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,5	(2,9-8,1)	5,1	(3,2-8,0)	695
	<b>25 - 44</b>	5,4	(4,0-6,8)	5,1	(4,0-6,6)	2271
	<b>45 - 64</b>	4,6	(3,4-5,8)	4,4	(3,3-5,7)	2729
	<b>65 +</b>	0,7	(0,3-1,2)	0,7	(0,4-1,3)	1809
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,1	(0,3-3,8)	2,5	(1,1-5,7)	429
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,5	(2,6-6,4)	4,5	(3,0-6,7)	898
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,3	(4,8-7,9)	4,6	(3,4-6,1)	2201
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,8	(2,0-3,6)	1,9	(1,4-2,6)	3835
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	5,3	(3,2-7,4)	3,9	(2,6-5,9)	796
	<b>Brabant Flamand</b>	3,6	(1,7-5,4)	2,6	(1,5-4,5)	485
	<b>Flandre Occidentale</b>	3,7	(2,0-5,4)	3,0	(1,8-4,8)	784
	<b>Flandre Orientale</b>	4,9	(2,7-7,0)	3,7	(2,4-5,6)	679
	<b>Limbourg</b>	3,8	(0,3-7,3)	3,0	(1,1-7,8)	281
	<b>Bruxelles</b>	3,4	(2,4-4,4)	2,4	(1,7-3,4)	1731
	<b>Brabant Wallon</b>	2,2	(0,1-4,4)	1,6	(0,6-4,3)	246
	<b>Hainaut</b>	4,0	(2,1-5,8)	2,9	(1,8-4,6)	748
	<b>Liège</b>	4,5	(2,1-6,9)	3,5	(2,0-6,1)	459
	<b>Luxembourg</b>	1,9	(0,1-3,7)	1,4	(0,5-3,5)	317
	<b>Namur</b>	3,7	(1,3-6,1)	2,9	(1,5-5,6)	305
	<b>Communauté Germanophone</b>	3,8	(1,6-6,1)	2,8	(1,5-5,2)	673
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	4,1	(3,5-4,8)			7504

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

(\*) Actuellement = quotidiennement ou occasionnellement

**Tableau B 129. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui utilise actuellement\* la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

EC02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,2	(1,1-7,3)	3,7	(1,7-7,8)	342
	<b>Femme</b>	3,5	(0,8-6,2)	3,1	(1,5-6,2)	331
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,7	(0,0-11,8)	5,6	(1,9-15,7)	78
	<b>25 - 44</b>	2,0	(0,0-4,0)	2,0	(0,7-5,1)	160
	<b>45 - 64</b>	5,0	(1,2-8,9)	5,0	(2,3-10,6)	262
	<b>65 +</b>	2,7	(0,0-5,8)	2,7	(0,9-8,1)	173
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	2,3	(0,0-5,4)	1,9	(0,5-7,2)	107
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,5	(0,0-7,1)	3,2	(1,2-8,5)	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,3	(0,0-6,7)	3,1	(1,2-7,9)	270
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	3,8	(1,6-6,1)			673

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

(\*) Actuellement = quotidiennement ou occasionnellement

## 7. Consommation de drogues

Le monitoring de l'usage des drogues illicites et de son évolution dans le temps au sein de la population est une responsabilité de santé publique en raison des conséquences sanitaires et psychosociales liée à leur consommation et de la charge que cela représente pour la société. Les indicateurs relatifs à l'usage de substances illicites sont présentés pour les groupes d'âge entre 15 et 64 ans. En dehors de ces âges, l'utilisation de ces produits est trop rare pour pouvoir produire des statistiques valides dans la population générale ; de même est-il déconseillé d'effectuer des analyses au niveau de sous-échantillons, car les marges d'erreurs deviennent trop importantes. Ce rapport dévolu à la Communauté Germanophone se centre donc principalement sur les résultats de l'usage récent (ID03\_1) et de l'usage problématique du cannabis (ID04\_2) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête, ainsi que de l'usage récent d'une drogue autre que le cannabis (ID07\_2), quelle qu'elle soit (cocaïne, crack, ecstasy, amphétamine, métamphétamines, opioïdes, héroïne, LSD, etc.).

### 7.1. L'USAGE RÉCENT DE CANNABIS

Au niveau national, 22,6% de la population âgée de 15 à 64 ans déclare avoir déjà essayé le cannabis à un moment de son existence et 7,0% en a consommé au moins une fois au cours des 12 mois précédant l'enquête. Ce résultat se reflète également au niveau de la Communauté Germanophone, où 21,1% ont déjà pris du cannabis, mais 5,9% en ont consommé dans les 12 derniers mois. Ce taux ne diffère pas de manière significative après ajustement pour l'âge et le sexe de celui obtenu au niveau de la province de Liège (7,8%).

La différence quant à l'usage récent du cannabis chez les femmes (4,7%) et chez les hommes (7,1%) de la Communauté Germanophone n'est pas statistiquement significative, ce qui dénote des résultats nationaux où 3,7% des femmes et 10,4% des hommes en ont consommé dans les 12 mois, une différence significative après ajustement pour l'âge.

Dans la Communauté, les jeunes de 15-24 ans ayant récemment consommé du cannabis (10,7%) ne sont pas plus nombreux à l'avoir fait, en termes relatifs, que leurs aînés (10,9% des 25-44 ans), alors qu'au niveau national la différence de prévalence au sein des deux groupes est significative (15,5% et 10,1% respectivement). Bien qu'il ne s'agisse que d'une tendance, les personnes avec un niveau d'éducation du secondaire inférieur au sein de la Communauté sont plus enclins à consommer du cannabis (9,2% dans les 12 mois) que les personnes avec un niveau du secondaire supérieur (6,7%, n.s.) ou plus (5,7%, n.s.).

L'usage du cannabis au sein de la Communauté Germanophone poursuit sa lente augmentation dans le temps, bien que les différences ne soient pas encore statistiquement significatives : il passe de 1,6% en 2008 à 4,2% en 2013 et à 5,9% en 2018. Au niveau de la Belgique en général, la hausse de l'usage de cannabis a surtout été marquée entre 2013 et 2018 (de 4,6% à 7,0%).

### 7.2. L'USAGE PROBLÉMATIQUE DE CANNABIS

Cet indicateur, mesuré par les 6 items du questionnaire CAST (*Cannabis Abuse Screening Test*) fait partie de l'enquête de santé pour la première fois. En Communauté Germanophone, comme pour la Belgique entière, 3,1% de la population de 15-64 ans présente un usage problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois (soit 2,2% des femmes et 3,9% des hommes). L'usage problématique apparaît principalement dans la tranche d'âge de 25 à 44 ans (8,2%) et parmi les personnes avec un faible niveau d'instruction (secondaire inférieur : 7,7%).

### 7.3. L'USAGE D'UNE DROGUE AUTRE QUE LE CANNABIS

Les membres de la Communauté Germanophone sont un peu moins nombreux (1,6%) que dans le reste du pays (2,9%) ou de la province liégeoise (3,1%) à avoir pris d'autres drogues (que le cannabis) au cours des 12

derniers mois. Ces autres drogues sont un peu plus populaires auprès des hommes (2,0%) que des femmes (1,1%), mais concernent autant les jeunes d 15-24 ans (2,5%) que leurs aînés (2,6% des 25-44 ans). Il s'agit d'une consommation qui intéresserait davantage les deux classes plus éduquées (1,3%-2,4%) par rapport aux deux classes moins éduquées (à interpréter avec prudence vu les petits nombres dans l'échantillon). Comme au niveau national, la consommation de ces autres substances est en hausse au sein de la Communauté.

**Tableau B 130. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Enquête de santé 2018 – Belgique**

ID01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	28,1	(25,7-30,5)	26,7	(24,3-29,2)	2773
	<b>Femme</b>	17,3	(15,5-19,1)	15,7	(13,9-17,6)	3023
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	25,7	(21,4-29,9)	25,0	(21,0-29,4)	708
	<b>25 - 44</b>	33,7	(31,0-36,5)	33,5	(30,8-36,3)	2298
	<b>45 - 64</b>	11,5	(9,8-13,2)	11,1	(9,5-12,9)	2790
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	14,5	(7,7-21,4)	13,2	(7,9-21,3)	189
	<b>Secondaire inférieur</b>	16,3	(11,6-21,0)	16,0	(11,9-21,2)	528
	<b>Secondaire supérieur</b>	19,1	(16,2-22,0)	16,9	(14,3-19,9)	1764
	<b>Enseignement supérieur</b>	26,1	(23,9-28,3)	23,8	(21,7-26,2)	3214
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	25,1	(20,9-29,4)	23,4	(19,6-27,7)	629
	<b>Brabant Flamand</b>	22,0	(16,6-27,3)	20,0	(15,4-25,6)	358
	<b>Flandre Occidentale</b>	20,9	(16,2-25,6)	19,5	(15,3-24,5)	583
	<b>Flandre Orientale</b>	21,0	(16,3-25,7)	19,1	(14,9-24,1)	535
	<b>Limbourg</b>	14,9	(8,1-21,8)	13,0	(7,9-20,5)	198
	<b>Bruxelles</b>	30,2	(27,2-33,2)	26,0	(23,1-29,2)	1380
	<b>Brabant Wallon</b>	26,4	(18,6-34,3)	25,1	(17,9-34,0)	196
	<b>Hainaut</b>	20,4	(16,0-24,8)	18,4	(14,4-23,1)	593
	<b>Liège</b>	22,8	(17,2-28,5)	21,5	(16,2-27,9)	330
	<b>Luxembourg</b>	20,5	(13,8-27,2)	18,8	(13,2-26,1)	258
	<b>Namur</b>	23,7	(16,1-31,3)	21,7	(15,2-29,9)	229
	<b>Communauté Germanophone</b>	21,1	(16,4-25,8)	20,1	(15,7-25,3)	507
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	10,7	(9,6-11,7)	7,9	(7,1-8,8)	7335
	<b>2004</b>	13,0	(11,8-14,3)	10,1	(9,1-11,3)	6655
	<b>2008</b>	14,3	(13,0-15,7)	11,6	(10,5-12,9)	5549
	<b>2013</b>	15,0	(13,4-16,5)	12,4	(11,1-13,9)	4931
	<b>2018</b>	22,6	(21,0-24,2)	20,1	(18,5-21,8)	5796

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 131. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

ID01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	22,7	(16,7-28,8)	22,4	(17,1-28,8)	258
	<b>Femme</b>	19,4	(13,4-25,4)	18,9	(13,2-26,3)	249
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	18,8	(8,6-29,0)	18,8	(10,7-30,8)	80
	<b>25 - 44</b>	35,0	(26,2-43,9)	35,0	(26,8-44,1)	159
	<b>45 - 64</b>	12,0	(7,4-16,7)	12,0	(8,0-17,6)	268
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	15,1	(0,0-35,0)	10,4	(2,6-33,6)	17
	<b>Secondaire inférieur</b>	10,7	(0,1-21,4)	12,2	(4,7-28,2)	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	27,2	(18,3-36,0)	26,7	(18,2-37,2)	162
	<b>Enseignement supérieur</b>	19,8	(13,0-26,5)	18,1	(12,5-25,4)	239
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	9,8	(1,5-18,0)	8,3	(3,4-19,0)	164
	<b>2004</b>	7,9	(3,0-12,8)	7,3	(3,8-13,6)	141
	<b>2008</b>	6,5	(1,5-11,6)	6,8	(3,0-14,4)	115
	<b>2013</b>	18,9	(11,4-26,5)	18,6	(11,8-28,0)	176
	<b>2018</b>	21,1	(16,4-25,8)	20,9	(16,5-26,1)	507

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 132. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

ID03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,4	(8,7-12,0)	7,3	(6,1-8,8)	2770
	<b>Femme</b>	3,7	(2,9-4,5)	2,5	(1,9-3,3)	3020
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	15,5	(11,8-19,2)	13,9	(10,7-17,8)	708
	<b>25 - 44</b>	10,1	(8,3-11,8)	9,1	(7,6-10,8)	2295
	<b>45 - 64</b>	1,4	(0,9-1,9)	1,2	(0,8-1,8)	2787
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,4	(2,6-12,1)	4,0	(1,8-8,5)	189
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,4	(3,2-9,5)	4,7	(2,8-7,6)	527
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,8	(5,0-8,6)	3,9	(2,9-5,3)	1763
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,1	(5,9-8,4)	4,3	(3,3-5,4)	3210
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,3	(5,0-9,6)	4,5	(3,1-6,6)	628
	<b>Brabant Flamand</b>	6,5	(3,3-9,7)	4,0	(2,2-6,9)	358
	<b>Flandre Occidentale</b>	4,9	(2,5-7,3)	3,0	(1,8-5,1)	582
	<b>Flandre Orientale</b>	7,2	(4,6-9,9)	4,6	(3,0-6,8)	534
	<b>Limbourg</b>	2,4	(0,0-6,2)	1,4	(0,3-6,5)	198
	<b>Bruxelles</b>	12,4	(10,1-14,7)	7,4	(5,7-9,5)	1379
	<b>Brabant Wallon</b>	5,3	(1,4-9,2)	3,0	(1,3-6,6)	196
	<b>Hainaut</b>	6,9	(3,9-9,9)	4,1	(2,6-6,3)	592
	<b>Liège</b>	7,8	(3,9-11,8)	5,1	(2,9-8,8)	330
	<b>Luxembourg</b>	6,8	(2,9-10,7)	4,2	(2,2-7,9)	257
	<b>Namur</b>	4,7	(1,6-7,8)	2,7	(1,4-5,4)	229
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,9	(3,3-8,6)	3,7	(2,3-6,0)	507
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	5,0	(4,3-5,8)	2,8	(2,3-3,3)	6636
	<b>2008</b>	5,1	(4,2-5,9)	2,9	(2,4-3,6)	5534
	<b>2013</b>	4,6	(3,6-5,5)	2,7	(2,1-3,4)	4925
	<b>2018</b>	7,0	(6,0-7,9)	4,3	(3,7-5,1)	5790

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 133. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

ID03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,1	(3,3-11,0)	4,5	(2,4-8,3)	258
	<b>Femme</b>	4,7	(1,5-7,9)	2,9	(1,1-7,2)	249
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,7	(2,5-18,8)	10,5	(4,9-20,8)	80
	<b>25 - 44</b>	10,9	(5,1-16,6)	10,7	(6,1-18,0)	159
	<b>45 - 64</b>	0,8	(0,0-1,9)	0,8	(0,2-3,2)	268
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	17
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,2	(0,0-19,6)	10,0	(3,1-28,0)	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,7	(1,7-11,7)	3,4	(1,3-8,5)	162
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,7	(2,0-9,4)	2,9	(1,2-7,1)	239
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	2,1	(0,0-4,4)	1,6	(0,5-5,2)	140
	<b>2008</b>	1,6	(0,0-4,4)	1,3	(0,3-6,6)	114
	<b>2013</b>	4,2	(0,1-8,4)	3,4	(1,0-10,6)	175
	<b>2018</b>	5,9	(3,3-8,6)	4,9	(3,0-7,9)	507

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 134. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

ID04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,5	(4,3-6,6)	4,0	(3,2-5,1)	2768
	<b>Femme</b>	0,8	(0,5-1,1)	0,5	(0,3-0,8)	3020
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,3	(2,6-5,9)	2,8	(1,8-4,2)	707
	<b>25 - 44</b>	5,2	(3,9-6,5)	3,5	(2,7-4,6)	2295
	<b>45 - 64</b>	0,8	(0,4-1,1)	0,5	(0,3-0,8)	2786
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,1	(2,4-11,9)	3,3	(1,5-7,3)	189
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,3	(2,5-8,1)	3,0	(1,7-5,1)	527
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,3	(2,2-4,5)	1,5	(1,0-2,3)	1761
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,3	(1,6-3,0)	1,0	(0,7-1,5)	3210
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	3,0	(1,6-4,4)	1,5	(0,9-2,4)	628
	<b>Brabant Flamand</b>	2,9	(1,1-4,8)	1,4	(0,7-2,8)	358
	<b>Flandre Occidentale</b>	2,3	(0,4-4,2)	1,2	(0,5-2,6)	581
	<b>Flandre Orientale</b>	3,6	(1,5-5,7)	1,8	(1,0-3,2)	534
	<b>Limbouurg</b>	0,2	(0,0-0,5)	0,1	(0,0-0,5)	198
	<b>Bruxelles</b>	5,8	(4,3-7,4)	2,6	(1,8-3,8)	1379
	<b>Brabant Wallon</b>	2,5	(0,0-5,1)	1,2	(0,4-3,5)	196
	<b>Hainaut</b>	3,2	(1,5-5,0)	1,6	(0,9-2,8)	592
	<b>Liège</b>	2,5	(0,5-4,5)	1,3	(0,6-3,0)	330
	<b>Luxembourg</b>	2,8	(0,6-5,0)	1,4	(0,6-3,3)	257
	<b>Namur</b>	2,8	(0,5-5,1)	1,4	(0,6-3,3)	228
	<b>Communauté Germanophone</b>	3,1	(1,1-5,0)	1,6	(0,8-3,2)	507
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	3,1	(2,5-3,7)			5788

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 135. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

ID04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,9	(1,0-6,9)	258
	<b>Femme</b>	2,2	(0,0-4,7)	249
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,4	(0,0-3,2)	80
	<b>25 - 44</b>	8,2	(2,7-13,8)	159
	<b>45 - 64</b>	0,0	(0,0-0,0)	268
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	17
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,7	(0,0-17,6)	63
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,3	(0,0-6,8)	162
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,2	(0,0-4,6)	239
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	3,1	(1,1-5,0)	507

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 136. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

ID07_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,5	(3,3-5,7)	3,2	(2,4-4,2)	2522
	<b>Femme</b>	1,4	(0,9-1,9)	1,0	(0,6-1,5)	2725
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	3,3	(1,4-5,2)	2,8	(1,5-4,9)	664
	<b>25 - 44</b>	5,2	(3,8-6,5)	4,5	(3,5-5,8)	2127
	<b>45 - 64</b>	0,7	(0,3-1,0)	0,6	(0,3-1,0)	2456
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,9	(0,0-7,1)	1,7	(0,4-7,2)	157
	<b>Secondaire inférieur</b>	3,8	(0,7-6,8)	2,5	(1,1-5,5)	442
	<b>Secondaire supérieur</b>	2,8	(1,6-3,9)	1,6	(1,0-2,6)	1538
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,9	(2,0-3,8)	1,7	(1,2-2,5)	3024
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	4,1	(2,3-5,9)	2,5	(1,5-4,0)	581
	<b>Brabant Flamand</b>	2,2	(0,7-3,7)	1,3	(0,6-2,7)	323
	<b>Flandre Occidentale</b>	2,2	(0,0-4,4)	1,4	(0,5-3,7)	534
	<b>Flandre Orientale</b>	4,1	(1,8-6,4)	2,5	(1,4-4,4)	498
	<b>Limbourg</b>	2,2	(0,0-6,4)	1,3	(0,2-9,2)	175
	<b>Bruxelles</b>	4,7	(3,2-6,1)	2,5	(1,6-3,8)	1274
	<b>Brabant Wallon</b>	0,3	(0,0-1,0)	0,2	(0,0-1,4)	181
	<b>Hainaut</b>	1,9	(0,4-3,3)	1,1	(0,5-2,5)	497
	<b>Liège</b>	3,1	(0,6-5,7)	2,0	(0,9-4,5)	299
	<b>Luxembourg</b>	2,1	(0,0-4,4)	1,2	(0,4-3,9)	218
	<b>Namur</b>	0,2	(0,0-0,7)	0,1	(0,0-1,0)	209
	<b>Communauté Germanophone</b>	1,6	(0,0-3,1)	1,0	(0,4-2,7)	458
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	1,5	(1,1-2,0)	0,9	(0,6-1,2)	5481
	<b>2013</b>	0,8	(0,5-1,2)	0,5	(0,3-0,7)	4846
	<b>2018</b>	2,9	(2,3-3,6)	1,8	(1,4-2,3)	5247

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 137. Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

ID07_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	2,0	(0,1-3,9)	1,6	(0,7-3,4)	236
	<b>Femme</b>	1,1	(0,0-2,6)	0,9	(0,2-3,3)	222
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	2,5	(0,0-6,5)	2,4	(0,4-12,1)	74
	<b>25 - 44</b>	2,6	(0,0-5,3)	2,5	(0,9-6,7)	150
	<b>45 - 64</b>	0,5	(0,0-1,1)	0,4	(0,1-1,9)	234
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	16
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	57
	<b>Secondaire supérieur</b>	1,3	(0,0-3,3)	1,0	(0,2-3,9)	139
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,4	(0,0-5,4)	1,8	(0,5-6,1)	225
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	0,1	(0,0-0,4)	0,1	(0,0-0,8)	104
	<b>2013</b>	0,4	(0,0-1,3)	0,3	(0,0-2,0)	168
	<b>2018</b>	1,6	(0,0-3,1)	1,1	(0,3-3,1)	458

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 8. Les jeux de hasard et d'argent

Les jeux de hasard et d'argent (JHA) renvoient à des jeux dont le dénouement est aléatoire (jet de dés, distribution de cartes, tirage...) alors qu'un engagement financier (mise, pari) est associé à l'issue de la partie (gain ou perte). Cela comprend à la fois les jeux de casino (roulette, machines à sous, jeux de dés, poker, blackjack...), les jeux de pronostics tels que les paris sportifs, mais aussi les jeux de tirage ou de grattage de la loterie. En Belgique, le marché et l'exploitation de ces jeux est encadrée dans la législation depuis 2011 par l'octroi de licences distinctives, assorties de modalités contraignantes. On observe toutefois une augmentation du nombre de licences (surtout pour les sites et les applications de jeux en ligne), un nombre croissant de joueurs enregistrés sur ces sites, des montants de plus en plus élevés engagés par les joueurs, mais aussi, un foisonnement de sites interdits et clandestins qui attirent des jeunes en dessous de l'âge légal (18 ans) pour y participer.

Les dangers que présentent les jeux de hasard résident dans l'appât du gain, l'attrait pour la prise de risque, l'illusion d'un certain contrôle, l'excitation émotionnelle et l'envie de récupérer ses pertes. Peut alors s'installer une dépendance aux jeux, c'est-à-dire une addiction comportementale qui mène à des dommages importants dans les domaines financier, professionnel, social et familial, et qui affecte la santé physique et mentale du joueur. Heureusement, la majorité des personnes qui s'essaient aux JHA gardent une pratique ludique et mesurée, mais certaines perdent le contrôle et glissent vers une pathologie du jeu qui revêt une dimension problématique.

L'enquête de santé tente pour la première fois en 2018 de dresser un état des lieux de la pratique des JHA dans la population âgée de 15 ans et plus, et ce, en vertu des répercussions qu'ils peuvent avoir dans la sphère de la santé publique. Les indicateurs présentés dans ce rapport estiment le pourcentage d'individus qui ont joué à des JHA au moins une fois au cours des 12 derniers mois (GA01\_1 : joueurs actifs), ceux qui ont joué en ligne (GA03\_1 : via internet ou des applications) et ceux qui ont joué de manière traditionnelle (GA02\_1 : hors ligne), les joueurs hebdomadaires (GA\_1), ceux qui dépensent au moins 40 euros par mois sur des jeux (GA04\_1) et la prévalence des joueurs pathologiques (GA05\_1 : dépendance au jeu).

### 8.1. NOMBRE DE JOUEURS ACTIFS, EN LIGNE, HORS LIGNE

En Belgique, 30,8% de la population de 15 ans et plus a déclaré avoir dépensé de l'argent pour un JHA au cours des 12 mois précédant l'enquête de 2018. Les joueurs traditionnels (hors ligne) représentent 28,6% de la population pour 7,9% de joueurs en ligne (ces proportions incluent des joueurs qui pratiquent à la fois en ligne et hors ligne).

En Communauté Germanophone, la proportion de joueurs actifs (27,4%) est un peu moins élevée que dans la province de Liège (30,4%) et en Belgique dans sa totalité (30,8%), mais les différences ne sont pas statistiquement significatives après ajustement pour l'âge et le sexe. La pratique traditionnelle (hors ligne) des JHA intéresse 24,6% des habitants de la Communauté, alors que 4,2% sont actifs en ligne.

La proportion de femmes actives au jeu (20,7%) est significativement moins élevée que celle des hommes (34,3%), une différence de genre qui est également observée au niveau national. Les jeunes de 15-24 ans et les aînés de 65 ans ou plus sont moins actifs en matière de JHA (respectivement 17,4% et 23,5%) que les individus de 25-64 ans (29,5% – 32,1%). Bien que la tendance en fonction de l'âge soit similaire à ce que l'on trouve au niveau national, en Communauté Germanophone elle n'est pas significative sur le plan statistique. On observe un gradient socio-économique dans la pratique des JHA : 7,5% sont actifs en cette matière parmi les personnes sans diplôme ou avec un diplôme de l'école primaire, 23,2% parmi les personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur et 30,5 à 31,2% parmi celles qui ont un niveau d'éducation plus élevé.

En Communauté Germanophone, la différence de genre n'est pas liée à un mode d'accès au jeu : elle est significative à la fois pour ce qui concerne les modes de jeux traditionnels (19,1% des femmes et 30,4% des

hommes) et les jeux en ligne (0,7% des femmes et 7,8% des hommes). Sans surprise, les jeux en ligne sont plus souvent pratiqués parmi les jeunes (5,9% des 15-24 ans) que parmi les aînés (2,1% des 65+ ans, n.s.). Les jeux en mode traditionnel attirent quant à eux moins de jeunes (12,8% des 15-24 ans) que les individus plus âgés (21,1% à 29,3%). Les jeux en ligne sont aussi plus fréquents chez les personnes les plus éduquées (7,4% des diplômés du supérieur pour 1,6% des moins éduqués) – mais on observe aussi cette différence par niveau d'éducation pour le mode d'accès traditionnel aux jeux (12,8% des moins éduqués pour 27,8% des plus éduqués).

### **Jeux de prédilection**

En Communauté Germanophone, les jeux qui ont emporté la plus grande adhésion sont les jeux de loterie (23,9%), et loin derrière, les jeux de casino (2,5%), le poker (1,9%), les paris sportifs (1,4%) et les autres jeux (1,9%). Parmi les joueurs des 12 derniers mois, 89,2% ont misé sur des jeux de la loterie, 7,7% se sont adonnés à des jeux de casino, 5,7% ont participé à des paris sportifs, 4,6% ont joué au poker et 4,6% à d'autres JHA.

## **8.2. JOUEURS HEBDOMADAIRES**

Les données présentées ci-dessous ont trait à la proportion d'individus qui ont rapporté la pratique d'au moins un type de jeu, quel qu'il soit et quel qu'en soit le canal d'accès (hors ligne / en ligne), au moins une fois par semaine. Attention, le questionnaire évalue la fréquence par type de jeu, ce qui implique que l'on ne peut identifier les joueurs qui jouent chaque semaine, mais à des jeux différents d'une fois à l'autre.

En 2018, on dénombre en Belgique 9,7% de joueurs hebdomadaires au sein de la population âgée de 15 ans et plus, ils sont 9,3% dans la province de Liège et 7,6% dans la Communauté Germanophone (différence n.s.). On trouve aussi plus de joueurs hebdomadaires parmi les hommes de la Communauté (11,7%) que parmi les femmes (3,6%), et cette différence est significative. La part de joueurs hebdomadaires tend à augmenter à partir de 45 ans (de moins de 5% avant cet âge à 10-13% par après). Il n'y a pas de gradient socio-économique qui ressort distinctement.

## **8.3. DÉPENSE 40 € / MOIS OU PLUS**

On se réfère ici aux personnes âgées de 15 ans et plus qui déclarent consacrer au moins 40 euros par mois à des JHA (sans compter leurs gains éventuels).

Au niveau national, 3,8% de la population âgée de 15 ans et plus affecte au moins 40 € par mois pour des JHA ; dans la province liégeoise, il s'agit de 4,1% de la population et 4,6% en Communauté Germanophone. Plus d'hommes (7,1%) que de femmes (2,2%) de la Communauté dépensent au moins 40 € par mois pour des JHA, et la proportion tend à augmenter progressivement avec l'âge (1,8% des plus jeunes à 6,6% des 45-64 ans). La proportion de joueurs qui dépensent autant est la plus élevée parmi les personnes les plus privilégiées sur le plan socio-éducatif (6,7% des diplômés du supérieur dépensent 40+€/mois en JHA).

## **8.4. JOUEURS PATHOLOGIQUES**

La dépendance au jeu a été évaluée chez les personnes qui dépensent au moins 40 euros par mois pour des jeux de hasard ou des paris (question filtre). L'indicateur (GA05\_1), basé sur un questionnaire de dépistage d'une pratique problématique du jeu (le PGSI, 2001) propose 4 classes de « sévérité » du risque encouru : non-problématique (qui inclut également les non-joueurs et ceux qui dépensent moins de 40 euros par mois) ; faible risque ; risque modéré et risque élevé de dépendance aux jeux.

Les résultats indiquent qu'en Belgique, 99,1% de la population ne présente pas de risque de jeu pathologique et les chiffres sont similaires en Communauté Germanophone. Les chiffres étant ce qu'ils sont, les tableaux sont présentés à titre informatif en fin de chapitre (GA05\_1), mais des analyses détaillées ne sont pas opportunes dans ce cadre (trop petits nombres de personnes pour des statistiques fiables).

Tableau B 138. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir misé au moins une fois sur un jeu de hasard au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

GA01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	38,5	(36,3-40,7)	37,6	(35,3-39,9)	3673
	<b>Femme</b>	23,5	(21,7-25,3)	22,6	(20,9-24,4)	4019
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	20,3	(16,0-24,7)	19,4	(15,7-23,8)	708
	<b>25 - 44</b>	35,9	(33,1-38,8)	35,5	(32,7-38,5)	2307
	<b>45 - 64</b>	34,2	(31,7-36,7)	33,8	(31,3-36,3)	2823
	<b>65 +</b>	23,4	(20,8-26,0)	23,2	(20,6-25,9)	1854
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	20,6	(15,0-26,2)	22,8	(17,3-29,5)	433
	<b>Secondaire inférieur</b>	26,0	(22,3-29,7)	26,2	(22,5-30,4)	930
	<b>Secondaire supérieur</b>	35,7	(32,9-38,6)	34,1	(31,3-37,0)	2280
	<b>Enseignement supérieur</b>	30,1	(27,9-32,2)	28,0	(25,9-30,2)	3907
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	31,0	(27,1-34,8)	29,1	(25,4-33,1)	816
	<b>Brabant Flamand</b>	31,5	(26,2-36,8)	29,9	(24,9-35,5)	491
	<b>Flandre Occidentale</b>	33,4	(29,1-37,7)	32,6	(28,5-37,0)	819
	<b>Flandre Orientale</b>	31,9	(27,6-36,3)	30,5	(26,3-34,9)	699
	<b>Limbourg</b>	28,3	(22,5-34,1)	27,1	(21,6-33,3)	290
	<b>Bruxelles</b>	25,7	(23,2-28,2)	23,6	(21,3-26,2)	1768
	<b>Brabant Wallon</b>	30,5	(22,3-38,6)	29,5	(22,1-38,3)	250
	<b>Hainaut</b>	33,1	(28,6-37,6)	31,7	(27,3-36,4)	778
	<b>Liège</b>	30,4	(24,8-36,0)	29,5	(24,3-35,3)	468
	<b>Luxembourg</b>	25,5	(19,7-31,4)	24,0	(18,7-30,3)	324
	<b>Namur</b>	27,4	(21,4-33,3)	26,4	(20,7-32,9)	308
	<b>Communauté Germanophone</b>	27,4	(23,4-31,3)	26,0	(22,3-30,0)	681
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	30,8	(29,3-32,3)			7692

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 139. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir misé au moins une fois sur un jeu de hasard au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

GA01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	34,3	(28,6-39,9)	33,8	(28,3-39,6)	341
	<b>Femme</b>	20,7	(15,7-25,6)	20,3	(15,8-25,6)	340
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	17,4	(8,0-26,9)	16,7	(9,5-27,8)	80
	<b>25 - 44</b>	32,1	(23,7-40,5)	31,3	(23,6-40,2)	158
	<b>45 - 64</b>	29,5	(23,3-35,7)	28,9	(23,0-35,6)	269
	<b>65 +</b>	23,5	(16,6-30,3)	23,4	(17,3-31,0)	174
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,5	(0,8-14,3)	7,1	(2,9-16,1)	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	23,2	(13,4-32,9)	21,8	(14,0-32,4)	115
	<b>Secondaire supérieur</b>	31,2	(23,6-38,8)	31,0	(24,1-38,9)	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	30,5	(24,1-37,0)	29,3	(23,1-36,3)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	27,4	(23,4-31,3)			681

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 140. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué hors ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

GA02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	35,8	(33,5-38,0)	34,7	(32,4-37,0)	3659
	<b>Femme</b>	21,8	(20,1-23,6)	20,9	(19,2-22,6)	4005
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	17,4	(13,2-21,5)	16,6	(13,0-20,8)	707
	<b>25 - 44</b>	33,6	(30,7-36,4)	33,1	(30,3-36,1)	2301
	<b>45 - 64</b>	32,1	(29,6-34,5)	31,6	(29,2-34,1)	2816
	<b>65 +</b>	21,8	(19,2-24,3)	21,6	(19,1-24,3)	1840
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	19,0	(13,5-24,4)	20,8	(15,5-27,2)	431
	<b>Secondaire inférieur</b>	24,3	(20,7-27,9)	24,3	(20,7-28,3)	924
	<b>Secondaire supérieur</b>	33,6	(30,8-36,4)	31,9	(29,1-34,8)	2269
	<b>Enseignement supérieur</b>	27,6	(25,5-29,7)	25,5	(23,5-27,7)	3899
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	28,5	(24,6-32,4)	26,6	(22,9-30,6)	811
	<b>Brabant Flamand</b>	29,1	(23,8-34,3)	27,3	(22,5-32,7)	486
	<b>Flandre Occidentale</b>	31,3	(27,0-35,5)	30,3	(26,3-34,6)	817
	<b>Flandre Orientale</b>	30,8	(26,5-35,0)	29,2	(25,2-33,5)	697
	<b>Limbourg</b>	26,1	(20,3-31,9)	24,8	(19,4-31,1)	289
	<b>Bruxelles</b>	23,3	(20,9-25,8)	21,3	(18,9-23,8)	1764
	<b>Brabant Wallon</b>	25,8	(18,1-33,4)	24,5	(17,9-32,7)	248
	<b>Hainaut</b>	30,0	(25,7-34,3)	28,5	(24,3-33,1)	776
	<b>Liège</b>	28,9	(23,3-34,5)	27,9	(22,7-33,8)	468
	<b>Luxembourg</b>	24,3	(18,6-30,0)	22,8	(17,6-29,0)	323
	<b>Namur</b>	26,6	(20,6-32,5)	25,5	(20,0-32,0)	307
	<b>Communauté Germanophone</b>	24,6	(20,7-28,5)	23,1	(19,6-27,1)	678
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	28,6	(27,1-30,1)			7664

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 141. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué hors ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

GA02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	30,4	(24,7-36,0)	29,5	(24,4-35,3)	340
	<b>Femme</b>	19,1	(14,2-23,9)	18,4	(14,0-23,8)	338
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	12,8	(4,7-20,9)	12,3	(6,2-22,9)	80
	<b>25 - 44</b>	29,3	(21,0-37,5)	28,6	(21,2-37,4)	158
	<b>45 - 64</b>	27,2	(21,2-33,3)	26,7	(21,1-33,2)	269
	<b>65 +</b>	21,1	(14,6-27,6)	21,1	(15,3-28,3)	171
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,5	(0,8-14,3)	7,0	(2,9-15,9)	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	21,1	(11,8-30,3)	19,4	(12,2-29,3)	114
	<b>Secondaire supérieur</b>	27,2	(19,2-35,1)	26,9	(20,0-35,0)	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	27,8	(21,5-34,1)	26,6	(20,5-33,7)	272
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	24,6	(20,7-28,5)			678

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 142. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué en ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

GA03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	11,8	(10,3-13,3)	10,9	(9,6-12,4)	3659
	<b>Femme</b>	4,3	(3,3-5,2)	3,9	(3,1-4,9)	4005
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	6,2	(3,8-8,7)	5,4	(3,6-8,0)	707
	<b>25 - 44</b>	12,1	(9,9-14,2)	10,9	(9,0-13,2)	2301
	<b>45 - 64</b>	6,9	(5,6-8,2)	6,1	(4,9-7,5)	2816
	<b>65 +</b>	4,5	(3,3-5,6)	4,1	(3,1-5,3)	1840
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	3,1	(1,3-5,0)	3,3	(1,8-6,0)	431
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,2	(2,6-5,9)	4,0	(2,6-6,0)	924
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,8	(8,0-11,6)	8,1	(6,6-9,8)	2269
	<b>Enseignement supérieur</b>	8,2	(6,9-9,5)	6,6	(5,5-7,8)	3899
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,6	(5,5-9,7)	6,1	(4,6-8,2)	811
	<b>Brabant Flamand</b>	10,1	(7,1-13,2)	8,4	(6,2-11,2)	486
	<b>Flandre Occidentale</b>	8,7	(6,0-11,5)	7,6	(5,5-10,3)	817
	<b>Flandre Orientale</b>	7,5	(4,7-10,4)	6,1	(4,1-9,1)	697
	<b>Limbourg</b>	10,3	(6,0-14,5)	8,8	(5,6-13,4)	289
	<b>Bruxelles</b>	6,2	(4,9-7,5)	4,6	(3,7-5,8)	1764
	<b>Brabant Wallon</b>	7,1	(3,3-11,0)	5,9	(3,3-10,2)	248
	<b>Hainaut</b>	8,2	(5,6-10,9)	6,7	(4,7-9,5)	776
	<b>Liège</b>	7,7	(4,4-11,0)	6,5	(4,2-10,0)	468
	<b>Luxembourg</b>	6,0	(2,1-10,0)	4,9	(2,5-9,6)	323
	<b>Namur</b>	4,3	(1,8-6,9)	3,6	(1,9-6,5)	307
	<b>Communauté Germanophone</b>	4,2	(2,5-5,9)	3,4	(2,2-5,2)	678
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	7,9	(7,0-8,8)			7664

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 143. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué en ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

GA03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,8	(4,6-11,0)	7,3	(4,7-11,1)	340
	<b>Femme</b>	0,7	(0,0-1,8)	0,7	(0,1-3,2)	338
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,9	(0,0-13,0)	3,3	(0,9-11,2)	80
	<b>25 - 44</b>	5,0	(1,5-8,4)	2,7	(1,1-6,9)	158
	<b>45 - 64</b>	4,0	(1,6-6,4)	2,2	(0,7-6,7)	269
	<b>65 +</b>	2,1	(0,0-4,5)	1,2	(0,3-4,4)	171
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	1,6	(0,0-4,9)	1,0	(0,1-7,8)	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	114
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,0	(0,0-6,4)	1,7	(0,5-5,3)	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,4	(4,1-10,7)	4,0	(1,6-9,5)	272
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	4,2	(2,5-5,9)			678

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 144. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare jouer à des jeux d'argent et de hasard au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique**

GA_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	12,1	(10,6-13,6)	11,5	(10,1-13,1)	3659
	<b>Femme</b>	7,3	(6,3-8,4)	6,8	(5,8-7,9)	4005
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,5	(2,4-6,7)	4,3	(2,7-6,9)	707
	<b>25 - 44</b>	7,3	(5,7-8,9)	7,0	(5,6-8,8)	2301
	<b>45 - 64</b>	12,3	(10,6-14,0)	11,9	(10,4-13,7)	2816
	<b>65 +</b>	11,7	(9,6-13,7)	11,5	(9,7-13,7)	1840
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,2	(5,5-15,0)	8,8	(5,5-13,8)	431
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,6	(7,3-11,8)	8,0	(6,2-10,3)	924
	<b>Secondaire supérieur</b>	13,2	(11,3-15,2)	12,2	(10,4-14,3)	2269
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,5	(6,4-8,7)	7,0	(6,0-8,3)	3899
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	9,1	(6,6-11,6)	8,2	(6,2-10,8)	811
	<b>Brabant Flamand</b>	8,2	(5,4-11,0)	7,5	(5,2-10,6)	486
	<b>Flandre Occidentale</b>	11,1	(7,9-14,3)	9,8	(7,2-13,1)	817
	<b>Flandre Orientale</b>	9,9	(7,1-12,7)	9,0	(6,8-11,8)	697
	<b>Limbourg</b>	9,3	(5,5-13,0)	8,3	(5,5-12,4)	289
	<b>Bruxelles</b>	7,8	(6,3-9,3)	7,5	(6,1-9,1)	1764
	<b>Brabant Wallon</b>	8,6	(4,6-12,6)	7,9	(4,9-12,4)	248
	<b>Hainaut</b>	12,2	(9,4-14,9)	11,3	(8,8-14,4)	776
	<b>Liège</b>	9,3	(6,2-12,4)	8,5	(6,0-12,0)	468
	<b>Luxembourg</b>	7,3	(4,2-10,4)	6,6	(4,3-10,0)	323
	<b>Namur</b>	9,9	(5,9-14,0)	9,1	(5,9-13,8)	307
	<b>Communauté Germanophone</b>	7,6	(5,6-9,6)	6,8	(5,2-8,9)	678
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	9,7	(8,7-10,6)			7664

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 145. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare jouer à des jeux d'argent et de hasard au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

GA_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	11,7	(8,2-15,2)	8,8	(5,7-13,3)	340
	<b>Femme</b>	3,6	(1,4-5,8)	2,4	(1,2-4,7)	338
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,2	(0,0-8,5)	3,4	(1,2-9,5)	80
	<b>25 - 44</b>	1,5	(0,0-3,2)	1,2	(0,4-3,7)	158
	<b>45 - 64</b>	10,4	(6,6-14,3)	8,8	(5,5-13,9)	269
	<b>65 +</b>	12,8	(7,7-18,0)	11,6	(7,5-17,4)	171
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,7	(0,0-11,7)	2,7	(0,9-7,7)	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	11,0	(5,2-16,7)	5,0	(2,4-10,2)	114
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,2	(2,6-9,7)	3,8	(1,8-8,0)	195
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,5	(4,2-10,7)	4,7	(2,6-8,4)	272
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	7,6	(5,6-9,6)			678

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 146. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui dépense 40€ par mois ou plus pour des jeux d'argent et de hasard, Enquête de santé 2018 - Belgique

GA04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,0	(4,8-7,2)	5,6	(4,5-7,0)	3620
	<b>Femme</b>	1,8	(1,2-2,4)	1,7	(1,2-2,3)	3966
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,4	(0,0-2,7)	1,1	(0,4-2,9)	705
	<b>25 - 44</b>	3,7	(2,4-4,9)	3,1	(2,1-4,4)	2289
	<b>45 - 64</b>	4,7	(3,5-5,9)	4,0	(3,0-5,3)	2782
	<b>65 +</b>	4,1	(2,8-5,4)	3,6	(2,6-5,0)	1810
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	4,4	(0,6-8,2)	3,8	(1,6-8,4)	422
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,4	(2,7-6,1)	3,4	(2,2-5,1)	905
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,5	(4,1-7,0)	4,4	(3,2-5,9)	2232
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,6	(1,8-3,4)	2,1	(1,5-2,9)	3886
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	4,5	(2,6-6,4)	3,5	(2,2-5,4)	802
	<b>Brabant Flamand</b>	4,2	(1,9-6,5)	3,3	(1,8-5,9)	481
	<b>Flandre Occidentale</b>	4,0	(2,2-5,8)	3,1	(1,9-4,9)	807
	<b>Flandre Orientale</b>	3,4	(1,5-5,4)	2,7	(1,5-4,8)	682
	<b>Limbourg</b>	3,0	(0,9-5,1)	2,3	(1,1-4,7)	283
	<b>Bruxelles</b>	2,7	(1,9-3,5)	2,1	(1,5-2,9)	1754
	<b>Brabant Wallon</b>	1,7	(0,0-3,4)	1,3	(0,5-3,6)	246
	<b>Hainaut</b>	4,8	(2,6-6,9)	3,8	(2,4-6,0)	766
	<b>Liège</b>	4,1	(1,7-6,5)	3,3	(1,7-6,2)	463
	<b>Luxembourg</b>	1,5	(0,0-3,0)	1,2	(0,4-3,2)	320
	<b>Namur</b>	3,8	(1,5-6,2)	3,1	(1,6-5,8)	306
	<b>Communauté Germanophone</b>	4,6	(2,8-6,4)	3,6	(2,4-5,5)	676
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	3,8	(3,2-4,5)			7586

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 147. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui dépense 40€ ou plus par mois pour des jeux d'argent et de hasard, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

GA04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,1	(4,2-10,0)	6,2	(3,7-10,1)	339
	<b>Femme</b>	2,2	(0,3-4,1)	1,8	(0,8-4,2)	337
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,8	(0,0-4,6)	1,5	(0,3-6,2)	80
	<b>25 - 44</b>	2,5	(0,0-5,3)	2,0	(0,7-6,0)	157
	<b>45 - 64</b>	6,6	(3,5-9,7)	5,7	(3,2-9,7)	268
	<b>65 +</b>	5,4	(1,3-9,5)	4,8	(1,9-11,6)	171
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,0	(1,0-9,0)	3,0	(1,2-7,3)	114
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,3	(0,7-5,9)	2,6	(1,1-6,0)	192
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,7	(3,1-10,3)	5,2	(2,5-10,5)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	4,6	(2,8-6,4)			676

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 148. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'importance du risque de présenter une dépendance pathologique aux jeux, Enquête de santé 2018 - Belgique

GA05_1		Non-risque	Faible risque	Risque modéré	Haut risque	N
SEXE	Homme	98,5	0,8	0,3	0,4	3601
	Femme	99,7	0,3	0,0	0,1	3963
GROUPE D'AGE	15 - 24	99,0	0,0	0,8	0,3	705
	25 - 44	98,5	0,9	0,1	0,5	2280
	45 - 64	99,3	0,6	0,0	0,1	2773
	65 +	99,8	0,2	0,0	0,0	1806
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	99,8	0,2	0,0	0,0	419
	Secondaire inférieur	99,5	0,4	0,0	0,0	902
	Secondaire supérieur	98,3	0,6	0,4	0,7	2225
	Enseignement supérieur	99,4	0,5	0,0	0,1	3877
PROVINCE	Anvers	99,3	0,0	0,2	0,5	800
	Brabant Flamand	98,8	0,7	0,0	0,5	481
	Flandre Occidentale	99,2	0,5	0,1	0,1	807
	Flandre Orientale	99,0	0,9	0,0	0,1	679
	Limbourg	99,6	0,4	0,0	0,0	282
	Bruxelles	99,4	0,4	0,0	0,1	1743
	Brabant Wallon	99,8	0,2	0,0	0,0	246
	Hainaut	98,8	0,7	0,0	0,5	764
	Liège	98,6	0,7	0,8	0,0	462
	Luxembourg	99,5	0,5	0,0	0,0	320
	Namur	99,6	0,4	0,0	0,0	306
Communauté Germanophone	99,2	0,5	0,0	0,2	674	
ANNEE	2018	99,1	0,5	0,1	0,2	7564

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 149. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'importance du risque de présenter une dépendance pathologique aux jeux, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

GA05_1		Non-risque	Faible risque	Haut risque	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	98,7	1,1	0,2	338
	<b>Femme</b>	99,7	0,0	0,3	336
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	100,0	0,0	0,0	80
	<b>25 - 44</b>	99,1	0,9	0,0	157
	<b>45 - 64</b>	99,5	0,2	0,3	267
	<b>65 +</b>	98,5	1,0	0,5	170
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	100,0	0,0	0,0	56
	<b>Secondaire inférieur</b>	98,6	0,0	1,4	114
	<b>Secondaire supérieur</b>	100,0	0,0	0,0	192
	<b>Enseignement supérieur</b>	98,7	1,3	0,0	271
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	99,2	0,5	0,2	674

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

# CONNAISSANCES ET PRATIQUES PRÉVENTIVES

## 1. Connaissances et comportements face au VIH/SIDA

Ce module a pour but d'étudier les connaissances en matière de VIH/sida dans la population. La surveillance de ces dimensions est essentielle à la planification et au suivi des programmes de prévention du VIH. Elle permet notamment d'identifier des groupes démographiques auprès desquels ces programmes devraient être renforcés. Ceci est important non seulement pour la prévention de l'infection, mais aussi par ce que l'attitude vis-à-vis des personnes séropositives, et les discriminations auxquelles elles sont encore exposées, est intimement liée à la connaissance des moyens de transmission.

Au sein de la Communauté Germanophone, 89,2% des personnes de 15 ans et plus savent que l'usage d'un préservatif lors de chaque rapport sexuel est un moyen de prévention efficace contre la transmission sexuelle du VIH, et 75,3% savent qu'avoir un partenaire sexuel unique, fidèle et non porteur du VIH est un moyen de prévention efficace. Au niveau national, ces chiffres sont respectivement de 85,3% et 74,4%.

Parmi la population de 15 ans et plus en Communauté Germanophone, 87,3% savent qu'une personne paraissant en bonne santé peut être, en fait, infectée par le VIH, 90,7% savent que le VIH ne se transmet pas en prenant dans ses bras ou en serrant la main d'une personne infectée par le virus, mais un taux moins élevé (69,3%) sait que le VIH ne se transmet pas en buvant dans le verre d'une personne infectée par le VIH. Au niveau national, ces chiffres sont respectivement de 83,8%, 89,9% and 69,9%.

Dans l'ensemble, en Communauté Germanophone, seuls 50,7% de la population ont bien identifié les deux moyens de prévention et rejeté les trois perceptions erronées, et possède, donc, une connaissance étendue et correcte en matière de VIH/sida. Ce taux est assez comparable au niveau national avec 48,2% de la population en Belgique ayant une connaissance étendue et correcte en matière de VIH/sida.

Au sein de la Communauté Germanophone, il n'y a pas de différence selon le sexe en qui concerne la connaissance étendue et correcte du VIH/Sida, par contre cette proportion est plus élevée chez les personnes d'âge moyen (taux de 59,0% chez les 45-64 ) que chez les 15-24 ans (39,8%) et les 65 ans et plus (30,2%). Aussi, la connaissance sur le VIH/sida augmente significativement avec le niveau d'instruction : taux variant entre 18,4% et 48,7% parmi les personnes ayant tout au plus un diplôme du secondaire supérieur contre 63,4% des diplômées de l'enseignement supérieur.

En ce qui concerne les provinces, on ne trouve pas de différence significative dans la connaissance étendue et correcte du VIH/Sida.

**Tableau B 150. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'avoir un partenaire sexuel unique fidèle et non-infecté protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HI0101_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	76,7	(74,8-78,5)	76,7	(74,8-78,5)	3519
	<b>Femme</b>	72,9	(71,0-74,8)	72,8	(70,8-74,6)	3827
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	59,4	(54,4-64,4)	59,3	(54,3-64,2)	702
	<b>25 - 44</b>	75,9	(73,4-78,3)	75,9	(73,4-78,3)	2233
	<b>45 - 64</b>	81,2	(79,2-83,3)	81,3	(79,1-83,2)	2720
	<b>65 +</b>	70,6	(67,7-73,5)	70,8	(67,8-73,6)	1691
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	56,2	(49,7-62,7)	56,6	(49,6-63,3)	399
	<b>Secondaire inférieur</b>	65,5	(60,9-70,1)	64,9	(59,8-69,6)	826
	<b>Secondaire supérieur</b>	72,6	(70,0-75,1)	72,8	(70,1-75,3)	2159
	<b>Enseignement supérieur</b>	79,7	(77,9-81,6)	79,9	(78,1-81,7)	3824
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	74,7	(70,9-78,5)	74,4	(70,3-78,0)	764
	<b>Brabant Flamand</b>	75,1	(70,1-80,1)	75,0	(69,9-79,5)	465
	<b>Flandre Occidentale</b>	70,5	(66,5-74,6)	70,5	(66,2-74,5)	787
	<b>Flandre Orientale</b>	76,9	(73,2-80,5)	77,0	(73,1-80,5)	667
	<b>Limbourg</b>	73,8	(67,4-80,1)	73,7	(67,0-79,4)	258
	<b>Bruxelles</b>	73,2	(70,6-75,8)	73,3	(70,5-75,8)	1717
	<b>Brabant Wallon</b>	83,2	(77,7-88,8)	84,1	(78,0-88,8)	246
	<b>Hainaut</b>	73,1	(69,1-77,2)	73,3	(69,0-77,1)	755
	<b>Liège</b>	76,5	(71,6-81,3)	76,6	(71,6-81,0)	456
	<b>Luxembourg</b>	75,9	(69,7-82,1)	75,8	(68,9-81,6)	308
	<b>Namur</b>	78,0	(72,1-84,0)	78,5	(72,0-83,8)	292
	<b>Communauté Germanophone</b>	75,3	(71,0-79,7)	75,3	(70,6-79,5)	631
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	74,7	(73,3-76,1)			7346

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 151. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'avoir un partenaire sexuel unique fidèle et non-infecté protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HI0101_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	74,7	(68,6-80,8)	74,7	(68,1-80,3)	320
	<b>Femme</b>	75,9	(70,4-81,5)	76,4	(70,2-81,6)	311
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	68,7	(54,8-82,5)	68,7	(54,0-80,4)	80
	<b>25 - 44</b>	84,8	(78,2-91,4)	84,8	(77,1-90,3)	151
	<b>45 - 64</b>	77,3	(70,9-83,7)	77,3	(70,3-83,1)	262
	<b>65 +</b>	60,4	(51,2-69,7)	60,4	(50,9-69,1)	138
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	47,0	(29,2-64,7)	51,2	(32,2-69,8)	47
	<b>Secondaire inférieur</b>	73,1	(60,5-85,7)	73,7	(59,7-84,1)	93
	<b>Secondaire supérieur</b>	72,3	(63,5-81,1)	72,5	(63,6-79,9)	183
	<b>Enseignement supérieur</b>	83,4	(78,3-88,5)	83,2	(77,1-87,9)	268
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	75,3	(71,0-79,7)			631

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 152. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que l'usage d'un préservatif lors des rapports sexuels protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Belgique

HI0102_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	87,1	(85,4-88,8)	87,6	(85,7-89,2)	3504
	<b>Femme</b>	83,5	(81,8-85,2)	84,4	(82,6-86,0)	3817
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	85,4	(81,2-89,6)	85,4	(80,6-89,2)	703
	<b>25 - 44</b>	91,0	(89,4-92,6)	91,0	(89,3-92,5)	2233
	<b>45 - 64</b>	88,2	(86,1-90,2)	88,2	(86,0-90,1)	2718
	<b>65 +</b>	71,0	(68,1-74,0)	71,3	(68,3-74,2)	1667
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	58,0	(51,4-64,6)	65,5	(58,6-71,9)	394
	<b>Secondaire inférieur</b>	68,3	(63,8-72,9)	72,5	(67,7-76,8)	819
	<b>Secondaire supérieur</b>	82,5	(80,2-84,8)	82,5	(80,1-84,7)	2149
	<b>Enseignement supérieur</b>	93,1	(91,6-94,6)	92,9	(91,2-94,3)	3823
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	84,5	(81,2-87,9)	84,6	(81,0-87,7)	756
	<b>Brabant Flamand</b>	83,5	(77,5-89,6)	84,0	(76,7-89,3)	462
	<b>Flandre Occidentale</b>	79,4	(75,6-83,1)	81,7	(78,0-84,9)	782
	<b>Flandre Orientale</b>	85,2	(81,7-88,8)	85,9	(82,1-89,0)	664
	<b>Limbourg</b>	79,8	(73,4-86,2)	81,1	(74,0-86,6)	257
	<b>Bruxelles</b>	87,9	(86,0-89,8)	88,0	(85,8-89,8)	1714
	<b>Brabant Wallon</b>	91,6	(87,0-96,2)	92,4	(86,8-95,7)	245
	<b>Hainaut</b>	86,3	(83,3-89,3)	86,8	(83,5-89,6)	751
	<b>Liège</b>	90,9	(87,7-94,0)	91,9	(88,5-94,3)	454
	<b>Luxembourg</b>	88,0	(83,0-93,1)	88,7	(82,7-92,8)	308
	<b>Namur</b>	88,7	(84,3-93,0)	89,7	(85,0-93,0)	289
	<b>Communauté Germanophone</b>	89,2	(85,9-92,5)	89,5	(85,7-92,4)	639
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	85,3	(84,0-86,5)			7321

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 153. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que l'usage d'un préservatif lors des rapports sexuels protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HI0102_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	88,9	(84,4-93,3)	89,1	(83,4-93,0)	323
	<b>Femme</b>	89,5	(85,4-93,6)	90,0	(85,1-93,5)	316
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	96,4	(91,9-100,0)	96,4	(88,3-99,0)	83
	<b>25 - 44</b>	89,6	(83,7-95,5)	89,6	(82,1-94,2)	153
	<b>45 - 64</b>	91,3	(86,5-96,1)	91,3	(85,2-95,0)	263
	<b>65 +</b>	76,4	(67,9-84,8)	76,3	(66,9-83,7)	140
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	74,4	(58,8-90,0)	80,3	(61,0-91,4)	47
	<b>Secondaire inférieur</b>	73,3	(58,3-88,2)	74,0	(56,6-86,2)	96
	<b>Secondaire supérieur</b>	92,4	(88,1-96,8)	92,1	(85,9-95,7)	184
	<b>Enseignement supérieur</b>	94,4	(91,1-97,6)	94,2	(89,7-96,8)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	89,2	(85,9-92,5)			639

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 154. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'une personne paraissant en bonne santé peut en fait être infectée par le VIH, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HI0103_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	85,1	(83,5-86,7)	85,6	(83,9-87,2)	3496
	<b>Femme</b>	82,6	(80,9-84,3)	83,6	(81,8-85,2)	3808
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	84,1	(79,9-88,4)	84,1	(79,4-87,9)	706
	<b>25 - 44</b>	90,4	(88,8-92,1)	90,4	(88,7-92,0)	2228
	<b>45 - 64</b>	86,8	(84,9-88,8)	86,9	(84,8-88,7)	2711
	<b>65 +</b>	67,9	(64,8-71,0)	68,0	(64,8-71,1)	1659
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	52,8	(45,8-59,8)	60,9	(53,7-67,8)	391
	<b>Secondaire inférieur</b>	68,3	(63,6-73,0)	72,7	(67,8-77,1)	815
	<b>Secondaire supérieur</b>	79,6	(77,2-82,1)	79,6	(77,0-82,0)	2144
	<b>Enseignement supérieur</b>	92,7	(91,4-93,9)	92,4	(91,1-93,6)	3818
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	82,9	(79,3-86,4)	82,9	(79,1-86,2)	759
	<b>Brabant Flamand</b>	87,7	(83,5-91,8)	88,2	(83,5-91,7)	460
	<b>Flandre Occidentale</b>	78,6	(74,9-82,4)	81,0	(77,2-84,3)	778
	<b>Flandre Orientale</b>	82,0	(78,1-85,8)	82,6	(78,5-86,1)	660
	<b>Limbourg</b>	76,2	(69,4-83,0)	77,6	(70,5-83,5)	256
	<b>Bruxelles</b>	85,9	(83,9-87,9)	85,9	(83,6-87,9)	1712
	<b>Brabant Wallon</b>	91,1	(86,7-95,4)	92,0	(86,9-95,2)	246
	<b>Hainaut</b>	83,8	(80,5-87,1)	84,3	(80,6-87,3)	748
	<b>Liège</b>	89,3	(85,9-92,6)	90,4	(86,7-93,1)	452
	<b>Luxembourg</b>	84,2	(78,8-89,6)	85,0	(78,5-89,8)	308
	<b>Namur</b>	87,7	(83,1-92,3)	88,8	(83,6-92,5)	290
	<b>Communauté Germanophone</b>	87,3	(83,8-90,8)	87,6	(83,6-90,7)	635
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	83,8	(82,6-85,1)			7304

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 155. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'une personne paraissant en bonne santé peut en fait être infectée par le VIH, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HI0103_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	89,0	(84,6-93,5)	89,0	(83,4-92,9)	321
	<b>Femme</b>	85,6	(80,9-90,2)	85,8	(80,0-90,1)	314
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	92,8	(85,8-99,8)	92,8	(82,3-97,3)	83
	<b>25 - 44</b>	88,8	(82,9-94,6)	88,9	(81,8-93,4)	153
	<b>45 - 64</b>	90,7	(85,3-96,2)	90,8	(83,7-95,0)	262
	<b>65 +</b>	70,5	(61,5-79,6)	70,8	(61,1-78,9)	137
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	78,9	(64,1-93,7)	85,7	(66,4-94,8)	47
	<b>Secondaire inférieur</b>	69,4	(54,5-84,3)	70,0	(52,1-83,3)	95
	<b>Secondaire supérieur</b>	87,3	(81,7-92,9)	86,4	(79,5-91,2)	183
	<b>Enseignement supérieur</b>	94,9	(91,3-98,5)	94,4	(88,8-97,3)	270
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	87,3	(83,8-90,8)			635

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 156. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en prenant dans ses bras ou en serrant la main d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HI0104_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	89,2	(87,9-90,6)	89,9	(88,5-91,2)	3502
	<b>Femme</b>	88,8	(87,5-90,1)	89,8	(88,5-91,0)	3824
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	88,4	(85,0-91,9)	88,4	(84,5-91,5)	705
	<b>25 - 44</b>	93,8	(92,5-95,1)	93,8	(92,4-94,9)	2230
	<b>45 - 64</b>	92,3	(90,9-93,6)	92,3	(90,8-93,5)	2720
	<b>65 +</b>	76,1	(73,3-78,9)	76,1	(73,2-78,8)	1671
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	61,7	(55,1-68,2)	69,8	(63,1-75,7)	394
	<b>Secondaire inférieur</b>	76,0	(71,8-80,1)	79,9	(75,8-83,4)	821
	<b>Secondaire supérieur</b>	87,9	(86,0-89,7)	88,1	(86,1-89,8)	2149
	<b>Enseignement supérieur</b>	94,8	(93,9-95,8)	94,7	(93,6-95,6)	3825
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	87,1	(84,0-90,2)	87,5	(84,1-90,2)	761
	<b>Brabant Flamand</b>	91,7	(88,8-94,5)	92,3	(89,2-94,6)	461
	<b>Flandre Occidentale</b>	84,2	(81,0-87,4)	86,6	(83,4-89,2)	783
	<b>Flandre Orientale</b>	88,9	(86,3-91,6)	89,8	(87,0-92,0)	663
	<b>Limbourg</b>	86,6	(81,2-91,9)	88,0	(82,5-92,0)	258
	<b>Bruxelles</b>	91,3	(89,7-92,9)	91,6	(89,8-93,1)	1711
	<b>Brabant Wallon</b>	95,5	(91,9-99,2)	96,2	(91,2-98,4)	245
	<b>Hainaut</b>	86,5	(83,6-89,3)	87,0	(83,9-89,7)	749
	<b>Liège</b>	95,8	(93,9-97,8)	96,5	(94,3-97,8)	457
	<b>Luxembourg</b>	93,5	(90,2-96,8)	94,2	(90,2-96,6)	308
	<b>Namur</b>	87,1	(81,9-92,3)	88,4	(82,8-92,3)	289
	<b>Communauté Germanophone</b>	90,7	(87,8-93,5)	91,1	(87,9-93,5)	641
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	89,0	(88,0-90,0)			7326

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 157. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en prenant dans ses bras ou en serrant la main d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HI0104_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	88,9	(84,5-93,3)	89,7	(83,4-93,8)	324
	<b>Femme</b>	92,3	(88,9-95,8)	93,4	(89,5-96,0)	317
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	89,7	(81,5-98,0)	90,1	(79,0-95,6)	83
	<b>25 - 44</b>	95,2	(90,8-99,5)	95,3	(89,0-98,1)	153
	<b>45 - 64</b>	94,9	(91,0-98,8)	95,0	(89,5-97,7)	266
	<b>65 +</b>	73,1	(64,1-82,1)	73,1	(63,0-81,2)	139
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	69,9	(53,6-86,2)	81,4	(61,0-92,4)	48
	<b>Secondaire inférieur</b>	89,9	(80,8-99,0)	91,7	(79,5-97,0)	96
	<b>Secondaire supérieur</b>	92,6	(88,6-96,6)	92,8	(88,0-95,8)	184
	<b>Enseignement supérieur</b>	92,8	(88,9-96,8)	92,9	(87,3-96,1)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	90,7	(87,8-93,5)			641

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 158. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en buvant dans le verre d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HI0105_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	70,2	(68,1-72,2)	69,8	(67,7-71,9)	3497
	<b>Femme</b>	69,7	(67,7-71,7)	69,8	(67,6-71,9)	3807
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	61,1	(56,0-66,1)	61,1	(55,9-65,9)	704
	<b>25 - 44</b>	78,1	(75,5-80,7)	78,1	(75,3-80,6)	2221
	<b>45 - 64</b>	74,3	(72,0-76,6)	74,3	(71,9-76,6)	2708
	<b>65 +</b>	54,7	(51,5-58,0)	54,7	(51,5-58,0)	1671
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	43,9	(37,0-50,7)	49,1	(42,0-56,3)	391
	<b>Secondaire inférieur</b>	51,2	(46,2-56,2)	53,5	(48,2-58,9)	821
	<b>Secondaire supérieur</b>	65,0	(62,1-67,9)	64,5	(61,5-67,5)	2136
	<b>Enseignement supérieur</b>	79,1	(77,2-81,0)	78,2	(76,2-80,1)	3819
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	71,3	(67,1-75,4)	70,5	(66,2-74,5)	758
	<b>Brabant Flamand</b>	68,6	(63,2-74,0)	68,1	(62,3-73,4)	463
	<b>Flandre Occidentale</b>	64,1	(59,8-68,4)	65,2	(60,7-69,4)	778
	<b>Flandre Orientale</b>	74,3	(70,1-78,4)	74,3	(69,8-78,3)	662
	<b>Limbourg</b>	66,2	(59,3-73,2)	66,3	(59,0-72,9)	258
	<b>Bruxelles</b>	72,5	(69,8-75,1)	71,5	(68,6-74,2)	1712
	<b>Brabant Wallon</b>	75,8	(69,4-82,2)	76,7	(69,6-82,6)	244
	<b>Hainaut</b>	65,8	(61,2-70,5)	65,3	(60,2-70,0)	746
	<b>Liège</b>	74,6	(69,4-79,8)	75,1	(69,4-80,0)	455
	<b>Luxembourg</b>	73,0	(66,7-79,3)	73,0	(66,3-78,8)	303
	<b>Namur</b>	65,4	(58,8-72,0)	65,6	(58,9-71,8)	287
	<b>Communauté Germanophone</b>	69,3	(64,7-73,9)	68,9	(64,0-73,5)	638
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	69,9	(68,4-71,5)			7304

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 159. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en buvant dans le verre d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HI0105_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	66,5	(60,3-72,7)	65,2	(58,4-71,5)	324
	<b>Femme</b>	72,0	(66,2-77,8)	71,6	(65,3-77,1)	314
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	64,3	(51,2-77,3)	64,5	(50,7-76,2)	83
	<b>25 - 44</b>	75,6	(67,0-84,1)	75,7	(66,3-83,1)	152
	<b>45 - 64</b>	74,8	(68,2-81,5)	75,0	(67,8-81,1)	263
	<b>65 +</b>	49,4	(39,3-59,5)	49,2	(39,2-59,2)	140
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	42,3	(24,0-60,7)	47,4	(29,2-66,4)	48
	<b>Secondaire inférieur</b>	58,5	(43,4-73,7)	58,1	(42,6-72,1)	96
	<b>Secondaire supérieur</b>	72,0	(64,4-79,6)	71,3	(62,6-78,6)	181
	<b>Enseignement supérieur</b>	75,3	(68,7-81,9)	74,4	(66,8-80,8)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	69,3	(64,7-73,9)			638

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 160. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a une connaissance étendue et correcte\* sur le VIH/sida, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HI_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	50,2	(47,9-52,4)	48,9	(46,6-51,2)	3493
	<b>Femme</b>	46,3	(44,1-48,4)	45,2	(43,0-47,5)	3790
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	34,8	(30,1-39,5)	34,7	(30,1-39,6)	702
	<b>25 - 44</b>	54,7	(51,8-57,6)	54,7	(51,7-57,6)	2218
	<b>45 - 64</b>	55,2	(52,4-57,9)	55,2	(52,4-57,9)	2700
	<b>65 +</b>	33,6	(30,6-36,5)	33,7	(30,8-36,7)	1663
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	19,3	(13,5-25,0)	21,3	(15,7-28,3)	391
	<b>Secondaire inférieur</b>	26,4	(22,3-30,4)	26,8	(22,7-31,2)	816
	<b>Secondaire supérieur</b>	40,7	(37,8-43,5)	39,5	(36,7-42,5)	2128
	<b>Enseignement supérieur</b>	60,0	(57,7-62,2)	58,6	(56,3-60,9)	3812
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	49,1	(44,9-53,3)	47,2	(43,0-51,5)	758
	<b>Brabant Flamand</b>	46,6	(40,9-52,3)	45,2	(39,4-51,1)	462
	<b>Flandre Occidentale</b>	40,3	(35,8-44,8)	40,0	(35,6-44,7)	779
	<b>Flandre Orientale</b>	46,8	(42,1-51,6)	45,6	(40,8-50,4)	660
	<b>Limbourg</b>	43,2	(36,4-50,1)	42,3	(35,5-49,4)	256
	<b>Bruxelles</b>	52,4	(49,5-55,3)	50,7	(47,7-53,8)	1709
	<b>Brabant Wallon</b>	60,7	(53,9-67,5)	61,2	(54,1-67,8)	244
	<b>Hainaut</b>	47,2	(42,2-52,1)	45,9	(40,9-50,9)	746
	<b>Liège</b>	54,7	(48,8-60,6)	54,3	(48,3-60,1)	452
	<b>Luxembourg</b>	50,6	(43,1-58,1)	49,4	(42,2-56,7)	303
	<b>Namur</b>	50,9	(44,6-57,2)	50,5	(44,3-56,6)	285
	<b>Communauté Germanophone</b>	50,7	(45,7-55,6)	49,4	(44,3-54,4)	629
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	48,2	(46,5-49,8)			7283

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\* Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

\* identifier le préservatif et la fidélité comme méthodes protectives contre le VIH + savoir qu'une personne paraissant en bonne santé peut être atteinte du sida , le VIH ne se transmet pas en prenant dans ses bras ou en serrant la main d'une personne atteinte du sida ni en buvant dans le verre d'une personne atteinte du sida

**Tableau B 161. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a une connaissance étendue et correcte\* sur le VIH/sida, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HI_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	49,5	(43,0-56,1)	47,2	(40,6-53,9)	320
	<b>Femme</b>	51,8	(45,4-58,2)	50,2	(43,6-56,8)	309
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	39,8	(26,5-53,1)	39,8	(27,9-53,2)	81
	<b>25 - 44</b>	56,5	(47,1-66,0)	56,5	(47,0-65,6)	150
	<b>45 - 64</b>	59,0	(51,5-66,6)	59,1	(51,4-66,3)	260
	<b>65 +</b>	30,2	(21,5-38,9)	30,1	(22,2-39,4)	138
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	18,4	(6,0-30,7)	21,0	(10,2-38,5)	47
	<b>Secondaire inférieur</b>	32,7	(19,0-46,4)	29,7	(18,7-43,8)	93
	<b>Secondaire supérieur</b>	48,7	(39,9-57,4)	47,5	(39,0-56,1)	180
	<b>Enseignement supérieur</b>	63,4	(56,3-70,5)	61,8	(54,0-69,0)	269
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	50,7	(45,7-55,6)			629

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

\* identifier le préservatif et la fidélité comme méthodes protectives contre le VIH + savoir qu'une personne paraissant en bonne santé peut être atteinte du sida , le VIH ne se transmet pas en prenant dans ses bras ou en serrant la main d'une personne atteinte du sida ni en buvant dans le verre d'une personne atteinte du sida

## 2. Littératie en santé

La littératie en santé (LES), en anglais health literacy, est un concept complexe et multidimensionnel qui s'intéresse aux capacités des individus et des groupes à repérer, comprendre, évaluer, et utiliser les informations utiles pour la prise de décision en matière de soins de santé, de prévention des maladies et de promotion de la santé. La LES est reconnue comme étant un déterminant important de la santé. En plus de jouer un rôle important dans l'adhérence thérapeutique, l'autogestion des maladies, la prévention des maladies et la promotion de la santé, la LES est considérée comme un médiateur permettant de lutter contre les inégalités en santé. En 2018, l'enquête de santé intègre pour la première fois le HLS-EU-Q6, un questionnaire court qui permet d'estimer, d'une manière globale, la LES de la population vivant en Belgique.

Au sein de la Communauté Germanophone, 65,1% des personnes âgées de 15 et plus ont un niveau de LES suffisant, 32,1% ont un niveau limité et 2,8% ont un niveau insuffisant. Dans l'ensemble, en Communauté Germanophone, 34,9% des personnes de 15 ans et plus ont un faible niveau de littératie ce qui est assez comparable aux taux observés au niveau national (33,4%).

Comme c'est le cas au niveau national, les femmes, au sein de la Communauté Germanophone, sont plus nombreuses que les hommes à rapporter un faible niveau de littératie (37,3% contre 32,4%). Ceci car elles sont plus nombreuses à avoir non seulement un taux de LES limité (33,5% contre 30,7%) mais aussi un taux de LES insuffisant (3,8% contre 1,7%).

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont plus nombreuses à avoir un niveau de LES faible (42,1%) par rapport aux groupes moins âgés (taux variant entre 26,7% et 27,8% chez les 15-44 ans). Les personnes âgées sont plus nombreuses à avoir un taux de LES limité (34,5% des 65 ans et plus contre 26% chez les 15-44 ans) mais aussi un taux de LES insuffisant (7,6% des personnes de 65 ans et plus contre des taux de moins de 2% chez les 15-44 ans).

Les personnes moins éduquées sont plus nombreuses à rapporter un niveau de LES faible (47,2% des personnes ayant tout au plus un diplôme d'études primaires, 42,2% des diplômées du secondaire inférieur, 34,1% des diplômées du secondaire supérieur, et 29,2% des diplômées de l'enseignement supérieur). Ici aussi, les différences concernent le niveau de LES limité (32,0% des personnes les moins diplômées contre 28,3% des plus diplômées) et le niveau de LES insuffisant (15,2% des personnes les moins diplômées contre 0,9% des plus diplômées).

C'est néanmoins utile de noter que les différences selon le sexe et le niveau d'instruction ne sont pas statistiquement significatives, probablement à cause de la taille limitée de l'échantillon.

En ce qui concerne les provinces, la proportion de personnes rapportant un faible niveau de LES en Communauté Germanophone est quelque peu plus élevée que les taux dans les provinces flamandes, et assez comparable aux taux à Bruxelles et dans les provinces wallonnes sauf pour Namur (41,2%). Ces différences ne sont, par contre, pas statistiquement significatives.

**Tableau B 162. Distribution de la population de 15 ans et plus selon le niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Belgique**

<b>HL_2</b>		<b>Insuffisant</b>	<b>Limité</b>	<b>Suffisant</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,6	26,1	68,3	3482
	<b>Femme</b>	5,6	29,4	65,0	3824
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,8	33,8	61,4	689
	<b>25 - 44</b>	3,5	31,1	65,4	2235
	<b>45 - 64</b>	4,1	24,4	71,5	2719
	<b>65 +</b>	12,0	25,0	62,9	1663
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	26,7	30,1	43,2	375
	<b>Secondaire inférieur</b>	14,1	30,5	55,4	817
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,2	29,5	65,2	2165
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,2	26,0	71,7	3815
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	6,1	23,6	70,3	770
	<b>Brabant Flamand</b>	3,5	25,1	71,5	481
	<b>Flandre Occidentale</b>	5,2	26,7	68,0	760
	<b>Flandre Orientale</b>	5,9	27,9	66,3	663
	<b>Limbourg</b>	6,8	20,9	72,3	264
	<b>Bruxelles</b>	4,7	32,1	63,2	1694
	<b>Brabant Wallon</b>	1,4	29,9	68,7	248
	<b>Hainaut</b>	7,9	30,0	62,1	746
	<b>Liège</b>	5,6	31,6	62,8	455
	<b>Luxembourg</b>	5,1	32,2	62,7	300
	<b>Namur</b>	4,6	36,6	58,8	289
	<b>Communauté Germanophone</b>	2,8	32,1	65,1	636
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	5,6	27,8	66,6	7306

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 163. Distribution de la population de 15 ans et plus selon le niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Communauté germanophone**

<b>HL_2</b>		<b>Insuffisant</b>	<b>Limité</b>	<b>Suffisant</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,7	30,7	67,6	318
	<b>Femme</b>	3,8	33,5	62,7	318
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,7	26,1	72,2	79
	<b>25 - 44</b>	0,4	26,3	73,3	154
	<b>45 - 64</b>	2,8	37,3	60,0	262
	<b>65 +</b>	7,6	34,5	57,9	141
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	15,2	32,0	52,8	48
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,8	34,3	57,8	91
	<b>Secondaire supérieur</b>	0,5	33,5	65,9	186
	<b>Enseignement supérieur</b>	0,9	28,3	70,8	270
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	2,8	32,1	65,1	636

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 164. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant un faible niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HL_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	31,7	(29,6-33,8)	31,9	(29,8-34,0)	3482
	<b>Femme</b>	35,0	(33,0-37,1)	35,2	(33,1-37,3)	3824
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	38,6	(33,8-43,3)	38,6	(34,0-43,5)	689
	<b>25 - 44</b>	34,6	(31,7-37,5)	34,6	(31,7-37,6)	2235
	<b>45 - 64</b>	28,5	(26,2-30,8)	28,5	(26,2-30,9)	2719
	<b>65 +</b>	37,1	(33,9-40,2)	36,9	(33,8-40,1)	1663
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	56,8	(50,0-63,7)	57,4	(50,2-64,2)	375
	<b>Secondaire inférieur</b>	44,6	(39,6-49,5)	45,3	(40,3-50,4)	817
	<b>Secondaire supérieur</b>	34,8	(31,9-37,6)	34,8	(32,0-37,7)	2165
	<b>Enseignement supérieur</b>	28,3	(26,2-30,3)	28,1	(26,1-30,2)	3815
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	29,7	(25,6-33,7)	30,0	(26,1-34,2)	770
	<b>Brabant Flamand</b>	28,5	(23,2-33,9)	28,7	(23,6-34,4)	481
	<b>Flandre Occidentale</b>	32,0	(27,7-36,3)	32,0	(27,8-36,5)	760
	<b>Flandre Orientale</b>	33,7	(29,4-38,0)	33,8	(29,7-38,3)	663
	<b>Limbourg</b>	27,7	(20,6-34,8)	27,6	(21,3-35,1)	264
	<b>Bruxelles</b>	36,8	(34,1-39,6)	36,8	(34,1-39,6)	1694
	<b>Brabant Wallon</b>	31,3	(24,6-38,1)	31,4	(25,2-38,3)	248
	<b>Hainaut</b>	37,9	(33,2-42,6)	38,1	(33,6-42,8)	746
	<b>Liège</b>	37,2	(31,4-42,9)	37,4	(31,9-43,2)	455
	<b>Luxembourg</b>	37,3	(30,4-44,2)	37,6	(30,8-44,8)	300
	<b>Namur</b>	41,2	(33,9-48,4)	41,2	(34,1-48,6)	289
	<b>Communauté Germanophone</b>	34,9	(30,4-39,3)	35,4	(31,0-40,1)	636
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	33,4	(31,8-35,0)			7306

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 165. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant un faible niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

<b>HL_3</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	32,4	(26,4-38,4)	32,2	(26,5-38,4)	318
	<b>Femme</b>	37,3	(31,5-43,0)	36,7	(31,1-42,6)	318
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	27,8	(17,1-38,5)	28,0	(18,6-39,8)	79
	<b>25 - 44</b>	26,7	(18,9-34,6)	26,7	(19,6-35,2)	154
	<b>45 - 64</b>	40,0	(32,7-47,4)	40,1	(32,9-47,6)	262
	<b>65 +</b>	42,1	(32,7-51,5)	41,8	(33,0-51,2)	141
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	47,2	(29,7-64,7)	45,0	(28,5-62,7)	48
	<b>Secondaire inférieur</b>	42,2	(29,1-55,2)	39,2	(26,7-53,4)	91
	<b>Secondaire supérieur</b>	34,1	(25,8-42,3)	34,3	(26,4-43,2)	186
	<b>Enseignement supérieur</b>	29,2	(22,6-35,7)	29,5	(23,5-36,2)	270
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	34,9	(30,4-39,3)			636

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 3. Dépistage du cancer colorectal

### 3.1. TEST DE DÉTECTION DU SANG FÉCAL OCCULTE

Au sein de la Communauté Germanophone en 2018, 14,1% des personnes de 15 ans et plus déclarent avoir eu un test de dépistage du sang fécal occulte au cours des deux dernières années.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes (12,4%) et les femmes (15,8%). Le taux de couverture est plus élevé à partir de 45 ans. La différence entre les 45-64 ans (17,4%) et les 65 ans et plus (26,8%) est significative après ajustement pour le sexe.

Le taux de couverture est plus élevé chez les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur (16,4%) ou du secondaire supérieur (16,2%) par rapport aux personnes plus diplômées (11,2%) et aux personnes moins diplômées (9,2%). Toutefois, après ajustement pour le sexe et l'âge, seule la différence entre les personnes ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et celles ayant tout au plus un diplôme de l'enseignement primaire demeure significative.

Le pourcentage de personnes de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent avoir eu un test de dépistage du sang fécal occulte au cours des deux dernières années :

- est significativement plus élevé par rapport à celui observé à Bruxelles (8,7%), dans le Brabant Wallon (8,9%) et dans le Hainaut (10,0%), et il ne diffère pas significativement de celui observé dans les provinces de Liège, du Luxembourg et de Namur. Par contre il est significativement moins élevé par rapport aux provinces flamandes (taux entre 19,1% et 30,1%). Après ajustement pour le sexe et l'âge, la différence avec la province du Hainaut n'est plus significative.
- a diminué de manière significative entre 2008 (19%) et 2013 (10%) pour augmenter de nouveau en 2018 (14%). Toutefois, la différence entre 2013 et 2018 n'est pas significative.

### 3.2. COLONOSCOPIE

Au sein de la Communauté Germanophone en 2018, 30,6% des personnes de 15 ans et plus déclarent avoir eu une colonoscopie au cours des dix dernières années.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes (29,6%) et les femmes (31,6%). Le taux de couverture augmente de façon linéaire et significative avec l'âge : il passe de 2,4% chez les 15-24 ans à 18,4% chez les 25-44 ans et 36,4% chez les 45-64 ans. Chez les personnes de 65 ans et plus, ce pourcentage atteint 53,4%. Les différences sont significatives après ajustement pour le sexe.

Le taux de couverture est significativement plus élevé chez les personnes ayant tout au plus un diplôme de l'enseignement primaire (45,2%) et celles ayant un diplôme du secondaire inférieur (38,6%) par rapport aux personnes ayant un diplôme du secondaire supérieur (27,4%) ou de l'enseignement supérieur (26,8%). Toutefois, après ajustement pour le sexe et l'âge, ces différences ne sont plus significatives.

Le pourcentage de personnes de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent avoir eu une colonoscopie au cours des dix dernières années est significativement plus élevé (30,6%) que celui observé dans les autres provinces belges (pourcentage variant entre 14,3% et 24,0%). Les différences demeurent significatives après ajustement pour le sexe et l'âge.

Le pourcentage de personnes de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent avoir eu une colonoscopie au cours des dix dernières années est resté stable entre 2013 (28,2%) et 2018 (30,6%).

**Tableau B 166. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir eu un test de détection du sang fécal occulte au cours des deux dernières années, Enquête de santé 2018 – Belgique**

SC_7		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	17,7	(16,2-19,3)	10,8	(9,3-12,5)	4179
	<b>Femme</b>	16,4	(14,9-17,8)	9,1	(7,9-10,5)	4631
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,8	(0,6-3,1)	1,8	(0,9-3,5)	795
	<b>25 - 44</b>	2,3	(1,6-3,0)	2,3	(1,7-3,1)	2642
	<b>45 - 64</b>	26,6	(24,4-28,9)	26,6	(24,3-28,9)	3170
	<b>65 +</b>	30,1	(27,4-32,8)	30,3	(27,6-33,1)	2203
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	17,1	(12,5-21,7)	6,6	(4,5-9,5)	637
	<b>Secondaire inférieur</b>	21,2	(17,7-24,6)	9,6	(7,6-12,0)	1119
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,4	(15,4-19,4)	10,3	(8,7-12,2)	2641
	<b>Enseignement supérieur</b>	15,7	(14,0-17,4)	10,2	(8,8-11,8)	4251
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	23,8	(20,3-27,3)	14,7	(12,1-17,8)	888
	<b>Brabant Flamand</b>	20,1	(15,7-24,5)	11,9	(9,1-15,3)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	22,1	(18,5-25,6)	12,2	(9,9-15,0)	853
	<b>Flandre Orientale</b>	19,1	(15,5-22,6)	11,4	(9,0-14,2)	748
	<b>Limbourg</b>	30,0	(23,4-36,6)	19,8	(14,5-26,5)	314
	<b>Bruxelles</b>	8,7	(7,5-10,0)	5,6	(4,6-6,8)	2288
	<b>Brabant Wallon</b>	8,9	(5,4-12,5)	4,6	(3,0-7,1)	282
	<b>Hainaut</b>	10,0	(7,5-12,6)	5,5	(4,1-7,3)	876
	<b>Liège</b>	9,7	(6,3-13,2)	5,0	(3,3-7,5)	523
	<b>Luxembourg</b>	13,3	(8,4-18,1)	7,2	(4,8-10,9)	378
	<b>Namur</b>	12,0	(8,2-15,8)	6,2	(4,3-9,0)	363
	<b>Communauté Germanophone</b>	14,1	(11,1-17,1)	7,6	(5,8-9,9)	767
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	5,1	(4,4-5,8)	3,2	(2,8-3,8)	7037
	<b>2013</b>	8,4	(7,4-9,4)	5,2	(4,5-6,0)	6076
	<b>2018</b>	17,0	(15,9-18,2)	11,2	(10,1-12,3)	8810

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 167. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir eu un test de détection du sang fécal occulte au cours des deux dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

SC_7		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	12,4	(9,2-15,5)	9,5	(6,9-13,0)	382
	<b>Femme</b>	15,8	(11,5-20,0)	12,0	(8,7-16,3)	385
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,3	(0,0-9,2)	4,3	(1,4-12,6)	86
	<b>25 - 44</b>	4,3	(1,6-6,9)	4,2	(2,2-7,9)	177
	<b>45 - 64</b>	17,4	(12,4-22,4)	17,3	(12,9-22,8)	289
	<b>65 +</b>	26,8	(18,7-34,9)	26,5	(19,3-35,3)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	9,2	(0,4-17,9)	3,6	(1,0-12,3)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	16,4	(8,0-24,8)	8,7	(4,7-15,7)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	16,2	(9,8-22,5)	14,4	(9,6-21,1)	212
	<b>Enseignement supérieur</b>	11,2	(7,2-15,1)	10,4	(7,1-15,1)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	19,0	(11,0-26,9)	15,0	(9,6-22,7)	158
	<b>2013</b>	9,6	(5,3-13,9)	7,6	(4,6-12,2)	206
	<b>2018</b>	14,1	(11,1-17,1)	11,2	(8,7-14,3)	767

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 168. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir passé une colonoscopie au cours des dix dernières années, Enquête de santé 2018 – Belgique**

SC_10		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	17,1	(15,5-18,6)	13,6	(12,2-15,2)	4186
	<b>Femme</b>	17,3	(15,9-18,7)	13,0	(11,6-14,5)	4636
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	3,1	(1,6-4,6)	3,1	(1,9-5,0)	796
	<b>25 - 44</b>	6,6	(5,4-7,9)	6,6	(5,5-8,0)	2645
	<b>45 - 64</b>	21,8	(19,8-23,8)	21,8	(19,9-23,9)	3175
	<b>65 +</b>	31,6	(28,9-34,3)	31,6	(29,0-34,4)	2206
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	18,9	(14,7-23,1)	9,8	(7,4-12,8)	638
	<b>Secondaire inférieur</b>	18,7	(15,6-21,8)	11,0	(9,1-13,4)	1119
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,0	(15,1-18,9)	13,3	(11,5-15,3)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	16,7	(15,1-18,3)	14,5	(13,0-16,1)	4254
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	18,4	(15,3-21,5)	14,1	(11,7-16,9)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	17,5	(13,7-21,4)	13,4	(10,5-16,9)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	24,0	(20,2-27,7)	17,8	(14,7-21,4)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	14,5	(11,6-17,4)	11,0	(8,8-13,7)	748
	<b>Limbourg</b>	19,8	(14,8-24,8)	14,9	(11,2-19,6)	314
	<b>Bruxelles</b>	16,7	(14,9-18,5)	15,2	(13,5-17,0)	2291
	<b>Brabant Wallon</b>	18,2	(12,7-23,8)	14,3	(10,0-20,1)	283
	<b>Hainaut</b>	13,8	(10,9-16,8)	10,9	(8,6-13,7)	877
	<b>Liège</b>	14,3	(10,6-17,9)	10,5	(7,9-13,8)	523
	<b>Luxembourg</b>	14,8	(10,6-18,9)	11,3	(8,4-15,0)	379
	<b>Namur</b>	16,6	(11,9-21,2)	12,2	(8,9-16,6)	363
	<b>Communauté Germanophone</b>	30,6	(26,7-34,6)	26,1	(22,4-30,1)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	14,4	(13,2-15,7)	11,6	(10,5-12,8)	6030
	<b>2018</b>	17,2	(16,1-18,3)	13,5	(12,4-14,6)	8822

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 169. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir passé une colonoscopie au cours des dix dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

SC_10		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	29,6	(24,3-34,9)	24,1	(18,7-30,4)	383
	<b>Femme</b>	31,6	(26,3-36,9)	25,0	(19,7-31,2)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	2,4	(0,0-5,7)	2,4	(0,6-9,0)	86
	<b>25 - 44</b>	18,4	(12,2-24,6)	18,4	(13,0-25,3)	178
	<b>45 - 64</b>	36,4	(29,6-43,1)	36,4	(29,9-43,4)	290
	<b>65 +</b>	53,4	(45,6-61,2)	53,3	(45,5-60,9)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	45,2	(31,4-59,0)	28,5	(17,0-43,6)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	38,6	(27,5-49,7)	25,0	(16,7-35,6)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	27,4	(20,5-34,3)	24,6	(18,2-32,4)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	26,8	(20,8-32,8)	24,7	(18,7-31,8)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	28,2	(19,7-36,8)	23,3	(16,3-32,3)	210
	<b>2018</b>	30,6	(26,7-34,6)	25,8	(21,8-30,3)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 4. Vaccination contre la grippe

En Communauté Germanophone en 2018, 15,2% des personnes de 15 ans et plus déclarent avoir été vaccinées contre la grippe au cours des douze derniers mois.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes (16,0%) et les femmes (14,5%). Le taux de vaccination est significativement plus élevé (35,3%) chez les personnes les personnes âgées de 65 ans et plus en comparaison avec les tranches d'âges plus jeunes (taux variant entre 5,1% et 12,1%). La différence reste significative après ajustement pour le sexe.

Le taux de vaccination contre la grippe ne varie pas significativement en fonction du niveau d'éducation après ajustement pour le sexe et l'âge.

Le pourcentage de personnes de 15 ans et plus en Communauté Germanophone qui déclarent avoir été vaccinées contre la grippe au cours des douze derniers mois :

- est plus faible que dans l'ensemble des provinces belges (taux variant entre 18,2% et 33,9%) ; cette différence est significative après ajustement pour le sexe et l'âge, sauf pour ce qui est des provinces du Hainaut et de Namur;
- a augmenté au cours de la période 1997 (12,2%) - 2008 (25,2%) (mais pas de manière significative) ; le taux a baissé ensuite de manière significative entre 2008 et 2013 (11,5%) et est resté stable entre 2013 et 2018 (15,2%).

**Tableau B 170. Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

VA_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	25,6	(23,8-27,4)	23,6	(21,8-25,6)	4651
	<b>Femme</b>	27,5	(25,8-29,3)	23,5	(21,6-25,5)	5056
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	8,2	(5,7-10,8)	8,2	(6,0-11,2)	1050
	<b>25 - 44</b>	13,8	(11,9-15,8)	13,8	(12,0-15,9)	2896
	<b>45 - 64</b>	24,3	(21,9-26,6)	24,3	(22,0-26,7)	3384
	<b>65 +</b>	59,1	(56,1-62,1)	59,1	(56,0-62,0)	2377
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	42,4	(37,0-47,8)	24,9	(20,3-30,2)	719
	<b>Secondaire inférieur</b>	34,1	(29,9-38,2)	22,9	(19,5-26,7)	1268
	<b>Secondaire supérieur</b>	24,2	(21,7-26,7)	21,8	(19,5-24,4)	2876
	<b>Enseignement supérieur</b>	24,2	(22,1-26,3)	24,7	(22,4-27,3)	4666
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	33,3	(29,3-37,3)	30,9	(26,9-35,3)	979
	<b>Brabant Flamand</b>	29,3	(23,6-34,9)	26,3	(21,0-32,4)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	33,9	(29,7-38,1)	28,5	(24,5-32,9)	930
	<b>Flandre Orientale</b>	31,2	(26,8-35,6)	28,4	(23,7-33,7)	782
	<b>Limbourg</b>	30,6	(24,0-37,1)	25,8	(20,4-32,0)	361
	<b>Bruxelles</b>	18,2	(16,4-20,0)	17,6	(15,8-19,5)	2502
	<b>Brabant Wallon</b>	18,7	(12,5-24,8)	15,4	(11,1-21,0)	313
	<b>Hainaut</b>	19,5	(15,5-23,4)	16,9	(13,4-21,2)	958
	<b>Liège</b>	22,3	(17,3-27,2)	19,1	(14,8-24,3)	599
	<b>Luxembourg</b>	19,8	(14,3-25,3)	16,8	(12,7-21,8)	480
	<b>Namur</b>	20,1	(15,0-25,2)	15,9	(12,2-20,6)	428
	<b>Communauté Germanophone</b>	15,2	(12,0-18,4)	11,6	(9,1-14,7)	807
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	15,3	(13,9-16,6)	14,9	(13,5-16,5)	8474
	<b>2001</b>	20,9	(19,6-22,2)	17,9	(16,7-19,2)	10012
	<b>2004</b>	24,5	(23,2-25,7)	22,0	(20,7-23,3)	10909
	<b>2008</b>	26,9	(25,5-28,4)	24,2	(22,7-25,7)	9480
	<b>2013</b>	24,5	(23,0-25,9)	20,9	(19,5-22,4)	9064
	<b>2018</b>	26,6	(25,2-28,0)	22,7	(21,2-24,3)	9707

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 171. Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

VA_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,0	(12,1-19,9)	13,8	(10,1-18,6)	400
	<b>Femme</b>	14,5	(10,6-18,4)	11,4	(8,2-15,7)	407
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,1	(0,0-11,1)	5,1	(1,6-15,2)	95
	<b>25 - 44</b>	7,9	(3,4-12,4)	7,9	(4,4-13,7)	185
	<b>45 - 64</b>	12,1	(7,3-16,8)	12,0	(8,0-17,6)	296
	<b>65 +</b>	35,3	(27,5-43,2)	35,6	(28,2-43,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	34,2	(20,0-48,5)	19,5	(10,2-34,2)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	22,2	(12,4-32,1)	15,4	(9,2-24,5)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	14,2	(7,7-20,8)	13,9	(8,2-22,4)	217
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,3	(6,5-14,1)	10,7	(7,2-15,5)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	12,2	(7,2-17,2)	12,6	(8,1-19,1)	241
	<b>2001</b>	19,2	(12,3-26,1)	15,8	(10,6-22,8)	236
	<b>2004</b>	18,9	(12,4-25,3)	14,5	(9,2-22,0)	228
	<b>2008</b>	25,2	(15,8-34,5)	17,4	(11,3-25,7)	207
	<b>2013</b>	11,5	(5,8-17,1)	7,3	(4,2-12,3)	264
	<b>2018</b>	15,2	(12,0-18,4)	10,3	(7,7-13,7)	807

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 5. Dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire et du diabète

Cette section examine dans quelle mesure la population de 15 ans et plus rapporte que sa tension artérielle, son taux de cholestérol dans le sang et sa glycémie ont été contrôlés par un professionnel de la santé au cours des cinq dernières années dans le cadre d'un dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire et du diabète.

Au sein de la Communauté Germanophone, 94,5% de la population indique que sa tension artérielle a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années. Ce pourcentage est semblable à celui observé au niveau national.

Il est frappant de constater qu'en Communauté Germanophone, le pourcentage de personnes dont la tension artérielle a été contrôlée est déjà très élevé parmi les jeunes (89,5% des jeunes de 15-24 ans) alors qu'au niveau national, il s'agit de 76,7% des jeunes de cette tranche d'âge.

Le pourcentage de personnes de 15 ans et plus dont le cholestérol sanguin a été contrôlé par un professionnel de la santé au cours des cinq dernières années est 79,3% (au niveau national, il s'agit de 74,8%). Par rapport aux résultats de 2013, ce pourcentage a considérablement augmenté (de 68,1% en 2013 à 79,3% en 2018).

Presque trois quarts de la population de 15 ans et plus en Communauté Germanophone (75,8%) indique que son taux de glycémie a été contrôlé par un professionnel de la santé au cours des trois années précédant l'enquête. Ce pourcentage est supérieur à celui que l'on peut trouver au niveau national (70,2%).

**Tableau B 172. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la tension artérielle a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Belgique**

PR_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	89,3	(87,9-90,7)	92,0	(90,7-93,0)	4667
	<b>Femme</b>	93,3	(92,1-94,4)	94,8	(93,8-95,7)	5073
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	76,7	(72,9-80,5)	77,1	(73,2-80,7)	1053
	<b>25 - 44</b>	89,0	(87,1-90,8)	89,2	(87,2-90,9)	2915
	<b>45 - 64</b>	95,3	(94,3-96,4)	95,4	(94,3-96,4)	3391
	<b>65 +</b>	97,8	(97,0-98,6)	97,8	(96,8-98,4)	2381
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	90,1	(86,3-93,9)	88,5	(83,4-92,2)	723
	<b>Secondaire inférieur</b>	90,9	(88,1-93,7)	91,1	(88,1-93,4)	1276
	<b>Secondaire supérieur</b>	91,1	(89,6-92,7)	93,9	(92,5-95,1)	2891
	<b>Enseignement supérieur</b>	92,0	(90,6-93,3)	94,7	(93,5-95,7)	4672
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	89,4	(86,6-92,2)	91,7	(89,0-93,8)	978
	<b>Brabant Flamand</b>	93,5	(90,1-97,0)	95,3	(91,7-97,3)	568
	<b>Flandre Occidentale</b>	95,6	(94,0-97,1)	96,5	(95,0-97,6)	932
	<b>Flandre Orientale</b>	92,3	(89,7-94,9)	94,2	(91,7-95,9)	790
	<b>Limbourg</b>	90,1	(85,6-94,6)	92,0	(87,3-95,0)	363
	<b>Bruxelles</b>	88,7	(87,0-90,4)	92,2	(90,7-93,5)	2510
	<b>Brabant Wallon</b>	93,7	(89,8-97,6)	95,6	(92,0-97,7)	313
	<b>Hainaut</b>	91,3	(89,0-93,6)	93,8	(91,7-95,4)	962
	<b>Liège</b>	88,4	(84,3-92,4)	91,3	(87,5-94,0)	599
	<b>Luxembourg</b>	92,5	(89,1-95,9)	94,8	(91,7-96,8)	488
	<b>Namur</b>	93,5	(90,4-96,6)	95,3	(92,4-97,1)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	94,5	(92,2-96,8)	95,9	(93,7-97,4)	808
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	90,7	(89,8-91,7)	93,6	(92,7-94,4)	9088
	<b>2018</b>	91,3	(90,4-92,3)	93,9	(93,1-94,7)	9740

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 173. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la tension artérielle a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PR_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	92,7	(89,2-96,2)	93,7	(89,8-96,2)	400
	<b>Femme</b>	96,2	(94,0-98,4)	96,7	(93,9-98,2)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	89,5	(80,5-98,5)	89,9	(77,6-95,8)	96
	<b>25 - 44</b>	92,4	(87,7-97,1)	92,7	(86,6-96,2)	185
	<b>45 - 64</b>	95,7	(92,4-99,1)	96,0	(91,4-98,1)	296
	<b>65 +</b>	98,2	(96,1-100,0)	98,2	(94,2-99,5)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	96,9	(92,2-100,0)	96,0	(81,9-99,2)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	92,7	(86,1-99,3)	92,0	(82,8-96,5)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	94,9	(90,7-99,0)	96,2	(91,3-98,4)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	94,1	(90,1-98,1)	95,9	(91,8-98,0)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	91,2	(86,5-95,9)	92,1	(86,3-95,6)	264
	<b>2018</b>	94,5	(92,2-96,8)	95,2	(92,7-96,9)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 174. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la cholestérolémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Belgique**

PR_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	72,9	(71,0-74,8)	78,0	(76,0-79,8)	4645
	<b>Femme</b>	76,6	(74,8-78,4)	80,4	(78,5-82,1)	5042
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	36,8	(32,5-41,1)	36,8	(32,7-41,2)	1042
	<b>25 - 44</b>	66,3	(63,8-68,9)	66,4	(63,8-68,9)	2890
	<b>45 - 64</b>	85,4	(83,5-87,2)	85,4	(83,5-87,2)	3381
	<b>65 +</b>	93,9	(92,4-95,3)	93,8	(92,2-95,1)	2374
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	80,6	(76,3-84,9)	74,8	(68,0-80,6)	719
	<b>Secondaire inférieur</b>	78,1	(74,5-81,7)	76,1	(71,9-79,8)	1274
	<b>Secondaire supérieur</b>	73,8	(71,2-76,3)	79,4	(76,7-81,8)	2879
	<b>Enseignement supérieur</b>	74,0	(72,0-76,1)	80,8	(78,7-82,7)	4639
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	70,0	(66,3-73,7)	73,3	(69,2-77,0)	977
	<b>Brabant Flamand</b>	75,4	(70,0-80,7)	79,8	(74,6-84,1)	567
	<b>Flandre Occidentale</b>	80,1	(76,7-83,5)	82,9	(79,1-86,1)	932
	<b>Flandre Orientale</b>	72,0	(67,6-76,4)	75,7	(70,7-80,1)	777
	<b>Limbourg</b>	74,1	(68,1-80,2)	76,9	(69,5-83,0)	360
	<b>Bruxelles</b>	73,9	(71,5-76,3)	81,2	(78,9-83,3)	2500
	<b>Brabant Wallon</b>	78,1	(72,1-84,1)	83,5	(78,0-87,8)	311
	<b>Hainaut</b>	78,7	(75,2-82,1)	84,2	(80,8-87,1)	959
	<b>Liège</b>	71,0	(65,6-76,4)	75,6	(70,2-80,3)	591
	<b>Luxembourg</b>	81,1	(75,4-86,9)	86,5	(81,7-90,1)	477
	<b>Namur</b>	80,8	(75,3-86,4)	85,3	(80,1-89,3)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	79,3	(75,2-83,5)	83,5	(79,3-87,0)	807
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	72,6	(71,1-74,0)	77,8	(76,3-79,3)	9055
	<b>2018</b>	74,8	(73,4-76,2)	79,7	(78,2-81,1)	9687

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 175. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la cholestérolémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PR_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	74,9	(69,1-80,8)	79,1	(73,3-84,0)	400
	<b>Femme</b>	83,4	(79,0-87,8)	87,0	(82,5-90,5)	407
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	45,5	(31,9-59,0)	45,4	(33,1-58,2)	96
	<b>25 - 44</b>	70,9	(62,5-79,2)	71,2	(62,1-78,9)	185
	<b>45 - 64</b>	88,9	(84,4-93,5)	89,3	(84,1-92,9)	295
	<b>65 +</b>	95,0	(91,8-98,1)	95,0	(90,7-97,4)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	82,8	(68,6-97,0)	73,4	(46,3-89,8)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	76,7	(64,8-88,7)	71,0	(55,8-82,6)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	77,0	(68,8-85,2)	85,7	(78,3-90,9)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	79,7	(73,4-86,0)	88,8	(83,4-92,6)	317
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	68,1	(60,7-75,5)	69,9	(61,3-77,4)	261
	<b>2018</b>	79,3	(75,2-83,5)	82,3	(78,1-85,8)	807

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 176. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la glycémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des trois dernières années, Enquête de santé 2018 - Belgique**

PR_5		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	67,2	(65,3-69,2)	70,7	(68,7-72,7)	4641
	<b>Femme</b>	72,9	(71,1-74,7)	75,4	(73,5-77,2)	5041
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	37,7	(33,5-41,9)	37,8	(33,6-42,1)	1041
	<b>25 - 44</b>	60,1	(57,5-62,7)	60,2	(57,6-62,8)	2893
	<b>45 - 64</b>	79,7	(77,7-81,7)	79,8	(77,7-81,7)	3372
	<b>65 +</b>	89,7	(87,9-91,5)	89,6	(87,6-91,3)	2376
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	76,1	(71,4-80,9)	68,9	(62,0-75,1)	719
	<b>Secondaire inférieur</b>	74,2	(70,4-78,0)	70,8	(66,6-74,8)	1270
	<b>Secondaire supérieur</b>	69,8	(67,1-72,4)	73,9	(71,2-76,5)	2877
	<b>Enseignement supérieur</b>	68,7	(66,7-70,8)	74,1	(71,9-76,2)	4639
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	60,4	(56,3-64,4)	61,5	(57,2-65,7)	975
	<b>Brabant Flamand</b>	73,0	(67,8-78,2)	76,2	(71,0-80,7)	567
	<b>Flandre Occidentale</b>	74,0	(70,2-77,9)	75,2	(70,9-79,1)	931
	<b>Flandre Orientale</b>	68,4	(63,9-72,9)	70,8	(65,9-75,2)	773
	<b>Limbourg</b>	73,3	(67,5-79,1)	75,2	(68,2-81,1)	361
	<b>Bruxelles</b>	69,5	(67,1-71,9)	75,5	(73,2-77,7)	2499
	<b>Brabant Wallon</b>	75,4	(68,9-81,9)	79,6	(73,4-84,7)	311
	<b>Hainaut</b>	74,6	(71,0-78,1)	78,9	(75,2-82,1)	959
	<b>Liège</b>	68,7	(63,3-74,0)	72,0	(66,5-76,8)	592
	<b>Luxembourg</b>	78,2	(72,4-84,0)	82,5	(77,3-86,6)	479
	<b>Namur</b>	75,4	(69,5-81,2)	78,6	(72,8-83,4)	429
	<b>Communauté Germanophone</b>	75,8	(71,6-80,1)	78,8	(74,5-82,5)	806
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	68,0	(66,5-69,5)	71,6	(70,0-73,1)	9041
	<b>2018</b>	70,2	(68,7-71,6)	73,4	(71,8-74,8)	9682

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 177. Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la glycémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des trois dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PR_5		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	71,8	(65,6-77,9)	75,9	(69,8-81,0)	400
	<b>Femme</b>	79,6	(74,9-84,4)	83,2	(78,2-87,2)	406
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	48,2	(34,7-61,7)	48,2	(35,7-60,9)	96
	<b>25 - 44</b>	62,3	(54,0-70,6)	62,5	(53,7-70,5)	185
	<b>45 - 64</b>	85,0	(80,0-90,1)	85,3	(79,6-89,6)	294
	<b>65 +</b>	94,5	(91,4-97,6)	94,5	(90,4-96,8)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	81,5	(67,4-95,7)	71,3	(48,0-87,0)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	77,2	(66,7-87,7)	72,5	(59,4-82,6)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	70,4	(61,3-79,4)	78,9	(70,0-85,7)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	75,7	(69,2-82,1)	85,0	(79,2-89,4)	316
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	65,6	(57,9-73,4)	66,4	(57,1-74,6)	262
	<b>2018</b>	75,8	(71,6-80,1)	77,9	(73,7-81,6)	806

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

# SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE

Pour l'Organisation mondiale de la Santé, la santé mentale n'est pas simplement l'absence de pathologie, c'est un état de bien-être dans lequel un individu peut réaliser son propre potentiel et faire face aux situations « normales » de la vie ainsi qu'au stress qu'elles génèrent en termes de frustrations, de décisions difficiles, de problèmes à résoudre. Une personne en bonne santé mentale est aussi quelqu'un qui se sent suffisamment en confiance pour s'adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer. La santé mentale et le bien-être subjectif sont indispensables pour que l'être humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser, ressentir, échanger avec les autres, apprendre, gagner sa vie, s'épanouir dans son travail, contribuer à la société et profiter de l'existence.

La santé mentale peut être altérée par une série de pathologies définies par un ensemble donné de symptômes cognitifs, émotionnels et comportementaux, associés dans la plupart des cas à un mal-être et à des perturbations fonctionnelles. Les troubles de la santé mentale et la détresse psychologique ont des implications importantes à de multiples niveaux. Au-delà de la souffrance qu'ils engendrent chez la personne elle-même et son entourage, ces pathologies entraînent des complications dans les sphères de la santé physique et sociale. Ainsi, il n'est pas rare d'observer chez les personnes affectées un isolement croissant et un absentéisme important au travail, de même que l'adoption de comportements néfastes pour la santé comme une consommation excessive de tabac, de boissons alcoolisées ou de substances. De plus, certains troubles déclenchent une altération des fonctions physiologiques qui peut accentuer la prédisposition à une série de maladies physiques, notamment cardio-vasculaires. Enfin, les difficultés psychologiques sont parfois telles qu'elles mènent à des conduites qui menacent l'existence, comme l'abus de substances, la violence ou le suicide.

Ce chapitre consacré à la santé mentale est divisé en 3 sections : la première porte sur la dimension du bien-être subjectif comme indicateur d'une bonne santé mentale. Le bien-être subjectif est conceptualisé comme le ressenti par rapport à trois aspects subjectifs : la satisfaction de vie (un jugement cognitif sur la manière dont on a accompli sa vie et l'appréciation de celle-ci), la présence d'impressions positives (vitalité, énergie,...) et le bien-être psychologique ou l'absence d'émotions négatives (de type déprime, anxiété, culpabilité...) sur une période donnée. La deuxième section est consacrée aux troubles de la santé mentale, c'est-à-dire un ensemble donné de symptômes cliniquement reconnaissables, tels que les troubles du comportement alimentaire, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, ainsi que les pensées et comportements suicidaires. La troisième partie aborde la consommation de sédatifs (tranquillisants ou somnifères) et d'antidépresseurs.

## 6. Le bien-être subjectif

Trois mesures générales de la santé mentale positive ou du bien-être subjectif sont considérées dans l'enquête de santé en 2018. Elles concernent la satisfaction à l'égard de sa vie, l'énergie vitale et le bien-être/mal-être psychologique.

### 6.1. SATISFACTION DE VIE

La satisfaction de vie est une mesure directe et globale, à un seul item, couramment utilisée pour évaluer le bien-être subjectif de la population dans le cadre de la santé mentale positive. L'indicateur ci-dessous (VT01\_2) présente le pourcentage de la population considérée comme ayant une faible satisfaction de vie (de 0 à 5), une satisfaction intermédiaire (6 à 8) et une satisfaction élevée (9 ou 10).

En Belgique en 2018, 12,3% de la population âgée de 15 ans et plus est peu satisfaite de sa vie, 66,0% présente un niveau de satisfaction intermédiaire et 21,7% s'est montrée très satisfaite. La satisfaction de vie élevée est

plus fréquente parmi les hommes (23,6%), les personnes âgées de 65 ans et plus (26,6%) et les personnes avec un niveau d'éducation du supérieur (23,0%).

La satisfaction de vie est meilleure dans la Communauté Germanophone : 9,0% de ses membres se disent peu satisfaits de leur existence, 59,5% ont un niveau de satisfaction intermédiaire et 31,5% sont très satisfaits, un record absolu par rapport au reste du pays. La province de Liège, par opposition, comprend plus de résidents peu satisfaites (16,6%) que de personnes très satisfaites (14,9%, la proportion la moins élevée du pays).

Contrairement à ce qui est observé au niveau national, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes à se sentir peu satisfaites (9,1% et 8,8% respectivement, n.s) ; elles sont même plus souvent très satisfaites de leur vie (33,4%) que les hommes (29,5%). Ici comme ailleurs, les aînés (de 65 ans et plus) sont les plus nombreux à s'estimer très satisfaits, soit 39,3% de ceux-ci. Autre différence dans la Communauté par rapport à la Belgique dans son ensemble : il n'y a pas de gradient socio-économique parmi les individus les plus satisfaits ; en revanche, il y a un taux plus élevé d'insatisfaits parmi les moins instruits (15,0%-18,4% chez ceux qui ont tout au plus un diplôme du secondaire inférieur) par rapport aux diplômés de l'enseignement supérieur (3,4% d'insatisfaits).

## 6.2. ENERGIE VITALE

Cet autre indicateur de santé mentale positive, mesuré à partir de l'échelle de vitalité (4 items) du SF-36, varie sur une échelle allant de 0 à 100, où les valeurs plus élevées correspondent à une plus grande énergie ressentie. Un indicateur dichotomique obtenu sur base de cette échelle (VT02\_2) établit un seuil au-delà duquel les individus sont classés comme ayant un niveau d'énergie vitale optimal.

En 2018, la proportion de personnes ayant un niveau d'énergie vitale optimal est de 14,3% au niveau national. Il s'agit d'une proportion qui baisse depuis l'enquête de 2008 (18,1%). Les hommes sont en général plus nombreux à jouir d'une énergie optimale (17,5%) que les femmes (11,2%), de même que les aînés (19,9%) par rapport aux jeunes (11,1% des 15-24 ans) ; il n'y a pas de gradient social clair pour l'énergie vitale optimale.

En Communauté Germanophone, 12,4% des résidents atteignent le seuil d'énergie optimale. Si ce chiffre est en-deçà du taux national, c'est parce que ce dernier est tiré vers le haut par les résultats obtenus en Flandre (17,0%). Au sein de la Communauté, la différence entre les hommes et les femmes en termes d'énergie optimale (respectivement 13,9% et 11,0%) n'est pas statistiquement significative après ajustement pour l'âge. On observe une évolution avec l'âge à partir de 45 ans : le nombre relatif ayant une énergie optimale croît pour atteindre 24,5% chez les aînés de 65 ans et plus. Le gradient social au niveau de l'énergie vitale n'apparaît pas clairement. On ne peut pas, non plus, conclure à une progression dans le temps (la difficulté vient du fait des grandes marges d'incertitude dues aux petit nombre de participants les années antérieures).

## 6.3. BIEN-ÊTRE / MAL-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE

Le bien-être/mal-être psychologique varie sur une échelle allant de 0 à 12 où un score plus élevé indique un degré de difficulté psychologique (ou de mal-être) plus important. En effet, chaque unité (1-12) représente un symptôme dont l'intensité est perçue par le répondant comme étant plus prononcée qu'à l'habitude. La définition de cas utilisée (2 ou plus) donne lieu à un indicateur (WB\_2) qui révèle le pourcentage de personnes présentant une brèche dans leur bien-être psychologique.

En Belgique en 2018, une personne sur trois (33,0%) âgée de 15 ans et plus éprouve des difficultés témoignant d'un mal-être psychologique, un taux en augmentation depuis 2008 (26,0%). Les hommes et les personnes âgées de 65 ans et plus sont moins affectés (respectivement 27,1% et 26,3% d'entre eux), de même que les classes les plus éduquées, après ajustement pour l'âge et le sexe.

Dans la Communauté Germanophone 28,9% éprouvent un certain mal-être, un taux moins élevé que celui obtenu dans la province de Liège (38,6%) ou en Wallonie dans son ensemble (37,1%). Les femmes de la

Communauté sont plus nombreuses (34,2%) que les hommes (23,3%) à manifester un mal-être psychologique. Si l'on considère la prévalence de ce mal-être par catégories d'âge, ces difficultés touchent plus souvent les jeunes de 15-24 ans (47,6%) et tend à diminuer avec l'âge (23,4% des 65+ ans). La proportion de personnes ayant un certain mal-être diminue à mesure que le niveau d'éducation augmente : plus de la moitié des non-diplômés (52,0%) éprouvent un mal-être, alors que cette proportion se réduit à un quart des plus instruits (24,7%). Enfin, si l'évolution dans le temps de cet indicateur n'est pas linéaire, on peut toutefois conclure à un nombre moins élevé de personnes en détresse psychologique en 2008 (17,2%), une différence significative avec le taux actuel (28,9%), après ajustement pour l'âge et le sexe.

## 7. Les troubles de la santé mentale

Pour ce qui concerne les troubles mentaux, l'enquête de santé aborde les pathologies les plus souvent rencontrées dans la population générale non-institutionnalisée âgée de 15 ans et plus. Ainsi, l'enquête de 2018 a inclus les troubles anxieux et dépressifs, les troubles du comportement alimentaire et les pensées et comportements suicidaires. Il faut néanmoins garder à l'esprit que l'enquête ne permet pas de poser un diagnostic de ces pathologies chez les participants, ce qui reste l'apanage des cliniciens. Les instruments de mesure utilisés (GAD-7, PHQ-9, SCOFF) sont des échelles de screening auto-administrées qui permettent de détecter l'existence potentielle d'un trouble donné à partir de la présence et/ou de la sévérité des symptômes recensés.

### 7.1. TROUBLE ANXIEUX

L'anxiété est une réaction normale dans certaines circonstances particulières et dépend du vécu des individus. On parle d'anxiété pathologique lorsque celle-ci est démesurée par rapport aux situations (réelles ou projetées) en cause, que ces craintes perdurent pendant des mois et qu'elles ne peuvent pas être contrôlées. L'anxiété crée alors une souffrance qui empêche les personnes de fonctionner correctement dans leur quotidien, y compris au niveau de la vie sociale. L'indicateur présenté dans ce rapport (AD\_1) définit la prévalence ponctuelle (dans les deux semaines précédant l'enquête) du trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ appliqué au score obtenu à partir du questionnaire GAD-7).

En 2018, 11,2% de la population de Belgique âgée de 15 ans et plus manifeste un trouble anxieux généralisé (10,1% en 2013, n.s). L'anxiété est plus courante parmi les femmes (14,2%) que les hommes (7,9%). Le pourcentage de personnes avec des troubles anxieux est à son apogée à 35-44 ans (14,6%) et baisse ensuite : à partir de 65 ans (7,7%) la prévalence est de moitié moins élevée. Les personnes les plus instruites sont moins anxieuses (8,9%).

Au sein de la Communauté Germanophone, 6,3% éprouvent des problèmes d'anxiété, un chiffre statistiquement stable par rapport l'année d'enquête précédente (7,1% en 2013) après ajustement pour l'âge et le sexe (n.s). La prévalence des troubles anxieux dans la Communauté est moins élevée que dans la majorité des provinces wallonnes (y compris Liège, 15,7%), à l'exception de celle du Luxembourg (10,0%).

De plus, les problèmes d'anxiété se manifestent plus fréquemment parmi les femmes (8,9%) que parmi les hommes (3,7%) et parmi les 25-44 ans (10,0%) que parmi les plus jeunes (1,4% des 15-24 ans). L'anxiété ne semble toutefois pas déterminé par le niveau d'éducation en Communauté Germanophone.

### 7.2. TROUBLES DÉPRESSIFS

Il existe différents types de dépressions, dont les symptômes sont semblables mais varient quant à leur nombre, leur moment de survenue, leur gravité, leur persistance et leur évolution. La dépression est un épisode de trouble du fonctionnement de la personne, caractérisée par une baisse d'humeur (tristesse) et/ou une perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités qu'elle appréciait, accompagnée d'autres symptômes comme la perte d'énergie, de l'estime de soi, de la concentration, du sommeil, etc. L'indicateur présenté dans ce rapport

concerne la prévalence ponctuelle (dans les deux semaines précédant l'enquête) des troubles dépressifs de tous types (AD\_6) mesurés à partir du questionnaire PHQ-9.

Environ une personne sur dix en Belgique âgée de 15 ans et plus souffre d'un trouble dépressif (9,4%) en 2018.

Les femmes sont un plus nombreuses que les hommes à souffrir de troubles dépressifs (respectivement 10,7% et 8,0%), cependant cet écart en fonction du genre n'a jamais été si petit qu'en 2018. Sans distinction de genre, la prévalence des troubles dépressifs est plus élevée entre 35 et 64 ans (10-11%). Enfin, on distingue clairement un gradient socio-économique dans la distribution des troubles dépressifs, leur fréquence diminuant à mesure que le niveau éducationnel augmente : de 6,7% parmi les plus instruits à 16,7% parmi les moins instruits.

La Communauté Germanophone peut se targuer d'avoir le taux le plus bas de dépressions (5,1%) si on la compare aux chiffres des provinces, mais les différences ne sont significatives que par rapport aux provinces wallonnes, à l'exception du Luxembourg. Dans la Communauté, les femmes ne sont pas plus nombreuses que les hommes à souffrir de dépression (5,1% et 5,2%) et l'âge ne semble pas avoir un rôle discriminant. Il est également difficile de conclure à une association entre le niveau d'éducation et la présence de troubles dépressifs. Bien que l'instrument de mesure ait changé depuis cette enquête de 2018, le pourcentage de personnes ayant une dépression semble avoir retrouvé les valeurs des années antérieures à 2013 (3,4%-5,5%) ; le taux obtenu au cours de cette année-là étant particulièrement élevé (13,8% en 2013).

### 7.3. TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

L'indicateur relatif aux troubles du comportement alimentaire est construit à partir de l'échelle « SCOFF » à 5 items auxquels on répond par oui ou par non. La somme des réponses positives dichotomisée à la note-seuil de [2+] définit les personnes qui sont susceptibles de rencontrer des problèmes de conduite alimentaire. Les troubles considérés ici se réfèrent aux deux dimensions en apparence contraires mais souvent complémentaires : la restriction alimentaire avec l'anorexie mentale et l'excès alimentaire avec la boulimie. Toutefois, il faut rester prudent dans l'interprétation des résultats, qui n'ont pas valeur de diagnostic.

En Belgique en 2018, 7,2% de la population âgée de 15 ans et plus présente des troubles du comportement alimentaire, ce qui représente une légère diminution par rapport à 2013 (8,4%, n.s). Les femmes sont plus nombreuses à montrer des troubles du comportement alimentaire que les hommes (respectivement 8,6% et 5,7%). Autre caractéristique de ces troubles : ils concernent surtout les jeunes (13,7% des personnes de 15-24 ans contre 2,8% des personnes de 65 ans et plus). Les diplômés du supérieur sont moins susceptibles de souffrir d'un trouble du comportement alimentaire (5,7%) que les personnes moins instruites (entre 8,2% et 10,1%).

Au sein de la Communauté Germanophone, 4,3% des citoyens de 15 ans et plus pourraient souffrir de troubles alimentaires, un taux parmi les plus bas au regard des provinces, surtout celle de Liège (10,3%) et Namur (7,2%). Les femmes sont à peine plus nombreuses à manifester un trouble du comportement alimentaire que les hommes (respectivement 5,4% et 3,0%, n.s). Ce type de trouble est ici aussi plus courant chez les individus plus jeunes (13,4% des 15-24 ans), tandis que le niveau d'éducation ne joue pas.

### 7.4. IDÉES SUICIDAIRES

Deux indicateurs se rapportent aux idées suicidaires, selon que celles-ci soient apparues au cours de la vie (SU01\_1) ou au cours des 12 derniers mois (SU01\_2).

En Belgique en 2018, 13,9% de la population âgée de 15 ans et plus a sérieusement pensé au suicide au moins une fois dans sa vie, dont un tiers (soit 4,3% de la population) au cours des 12 derniers mois. Ces proportions sont stables par rapport à celles observées en 2013 (13,8% et 5,0% respectivement, n.s). Plus de femmes que d'hommes ont pensé au suicide au cours de leur vie (15,5% pour 12,3%) mais pas pour ce qui concerne les 12 derniers mois (respectivement 4,4% et 4,2%, n.s). Les personnes à partir de 65 ans rapportent moins souvent

avoir eu des pensées suicidaires au cours de leur vie ou dans les 12 derniers mois. Il existe un gradient social dans les pensées suicidaires (passées et actuelles) : les plus instruits sont moins prompts à en avoir eues que les personnes des classes moins éduquées.

Au sein de la Communauté Germanophone, 11,3% ont déjà sérieusement pensé au suicide et 2,9% y ont pensé au cours des 12 derniers mois – des taux inférieurs à ceux des provinces wallonnes, notamment de Liège (16,6% et 6,8%). Les pensées suicidaires n'ont pas progressé dans le temps de manière statistiquement significative après ajustement pour l'âge et le sexe. Les pensées suicidaires ne concernent pas plus les femmes que les hommes (n.s) de la Communauté, mais les jeunes ont eu plus tendance à y penser que leurs aînés au cours des 12 derniers mois : soit 5,5% des 15-24 ans à moins de 2% après 45 ans. On ne retrouve pas de gradient social au niveau de l'idéation suicidaire au sein de la Communauté Germanophone.

## 7.5. TENTATIVES DE SUICIDE

Nous ne reproduisons ici que l'indicateur pour les tentatives de suicide au cours d'une vie (SU02\_1), les chiffres étant trop bas pour les tentatives au cours des 12 derniers mois.

En Belgique, 4,3% de la population âgée de 15 ans et plus (5,4% de femmes et 3,1% d'hommes) a tenté de se suicider au moins une fois dans sa vie et 0,2% (soit 2 personnes sur 1000) l'a tenté dans les 12 mois précédant l'enquête. La part de la population qui a déjà tenté de se suicider est relativement stable au cours du temps. Les individus de 35 à 54 ans, hommes et femmes confondus, sont les plus nombreux à rapporter avoir déjà tenté de se suicider (6,1%-6,5%). L'éducation est un facteur favorable : 3,3% des diplômés du supérieur ont déjà posé ce geste dans leur vie, pour 4,3% à 5,5% des personnes moins instruites, des différences qui sont significatives après standardisation pour l'âge et le sexe.

C'est parmi les habitants de la Communauté Germanophone que la fréquence de tentatives de suicide au cours de la vie est la plus faible (2,3%), si l'on compare avec les provinces. On ne voit pas de différence significative par genre dans la proportion de tentatives au cours de la vie (2,7% parmi les hommes, 1,9% parmi les femmes). L'âge et le niveau d'éducation ne semblent pas être des facteurs déterminants pour cet indicateur qui, par ailleurs, est stable dans le temps.

## 8. Consommation de médicaments psychotropes

L'usage de médicaments dans l'enquête de santé 2018 est examiné dans un contexte général et traité dans un rapport indépendant sur la consommation des soins. Cette section-ci ne couvre que deux types particuliers de médicaments psychotropes pris sous ordonnance médicale au cours des 2 dernières semaines, à savoir les sédatifs (somnifères et tranquillisants) et les antidépresseurs, chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Dans la suite, le terme « psychotropes » fait uniquement référence à ces deux catégories de médicaments et le terme « sédatifs » se rapporte aux somnifères et tranquillisants. Les indicateurs suivants sont discutés ci-dessous : l'usage sous prescription de sédatifs (MH\_5), d'antidépresseurs (MH\_6) et d'au moins un de ces deux produits (MH\_7).

Au niveau national, 15,5% de la population de 15 ans et plus a consommé au moins un des deux types de médicaments psychotropes sous prescription dans les deux semaines qui ont précédé l'interview. Les sédatifs sont plus largement utilisés (12,4%) que les antidépresseurs (7,6%). Les femmes en consomment plus souvent que les hommes, les personnes âgées plus souvent que les jeunes, et les personnes moins éduquées plus souvent que celles plus instruites.

En Communauté Germanophone, 9,6% des habitants consomment des sédatifs, 6,3% des antidépresseurs, et 13,4% au moins un de ces deux médicaments psychotropes (pour 18,2% en province liégeoise). Les femmes sont plus nombreuses à consommer des médicaments psychotropes que les hommes (respectivement 16,9% et 9,6%) et l'âge joue également un rôle important : 1,4% des jeunes de 15-24 ans en consomment, et la

proportion de consommateurs augmente de 7 points par tranche d'âge pour atteindre une personne sur quatre de 65 ans et plus (25,7%). Ici, ce sont surtout les sédatifs qui sont en cause dans la hausse des fréquences, puisque 23,1% des 65 ans et plus déclarent en prendre, une différence significative avec les autres groupes d'âge - ce qui n'est pas le cas pour les antidépresseurs (8,4% chez les 65 ans et plus).

L'âge et le genre sont d'ailleurs largement responsables des différences observées par niveau d'éducation pour la consommation de sédatifs (de 4,7% à 26,4%) et dans une moindre mesure pour les antidépresseurs (de 4,3% à 13,8%). Lorsque l'on se réfère aux taux standardisés par âge et par sexe pour comparer les classes d'éducation, le gradient social est donc moins prononcé que pour les taux bruts, mais l'on perçoit tout de même la tendance : la consommation de psychotropes est plus courante dans les groupes les moins instruits et diminue lorsque le niveau d'éducation augmente.

Avec 13,4% d'utilisateurs, la Communauté Germanophone se situe plutôt du côté des provinces où la consommation de psychotropes est la moins élevée. Si la consommation de sédatifs (9,6%) tend à baisser par rapport aux deux enquêtes précédentes (environ 15% en 2008 et 2013), la consommation d'antidépresseurs (6,3%) est en augmentation au sein de la Communauté (2,0% en 2013 et 2,7% en 2008).

Tableau B 178. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, Enquête de santé 2018 - Belgique

VT01_2		Faible satisfaction	Satisfaction moyenne	Satisfaction élevée	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,7	65,7	23,6	3727
	<b>Femme</b>	13,8	66,4	19,9	4101
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,8	69,3	20,9	717
	<b>25 - 44</b>	12,8	66,0	21,3	2313
	<b>45 - 64</b>	13,2	67,6	19,2	2874
	<b>65 +</b>	11,4	62,1	26,6	1924
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	27,5	55,3	17,3	472
	<b>Secondaire inférieur</b>	19,7	60,4	19,9	958
	<b>Secondaire supérieur</b>	12,9	66,1	21,0	2335
	<b>Enseignement supérieur</b>	8,3	68,7	23,0	3911
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	10,3	65,1	24,6	831
	<b>Brabant Flamand</b>	8,5	67,1	24,4	505
	<b>Flandre Occidentale</b>	8,5	67,9	23,6	819
	<b>Flandre Orientale</b>	7,6	67,5	24,9	694
	<b>Limbourg</b>	9,9	63,0	27,0	285
	<b>Bruxelles</b>	18,4	64,5	17,1	1804
	<b>Brabant Wallon</b>	17,7	64,9	17,4	255
	<b>Hainaut</b>	17,1	65,2	17,7	796
	<b>Liège</b>	16,6	68,5	14,9	472
	<b>Luxembourg</b>	16,3	60,1	23,6	341
	<b>Namur</b>	14,7	66,8	18,5	314
	<b>Communauté Germanophone</b>	9,0	59,5	31,5	712
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	12,3	66,0	21,7	7828

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

**Tableau B 179. Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

VT01_2		Faible satisfaction	Satisfaction moyenne	Satisfaction élevée	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,8	61,7	29,5	351
	<b>Femme</b>	9,1	57,4	33,4	361
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,1	66,7	29,2	83
	<b>25 - 44</b>	9,6	58,5	31,8	159
	<b>45 - 64</b>	10,1	61,9	28,0	277
	<b>65 +</b>	9,3	51,4	39,3	193
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	15,0	52,6	32,4	60
	<b>Secondaire inférieur</b>	18,4	53,5	28,0	122
	<b>Secondaire supérieur</b>	10,2	55,9	33,8	205
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,4	62,9	33,7	278
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	9,0	59,5	31,5	712

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 180. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une énergie vitale optimale, Enquête de santé 2018 – Belgique

VT02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	17,5	(15,8-19,2)	17,3	(15,7-19,2)	3627
	<b>Femme</b>	11,2	(9,8-12,5)	10,8	(9,5-12,3)	3984
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	11,1	(7,5-14,7)	10,7	(7,7-14,7)	721
	<b>25 - 44</b>	10,7	(8,8-12,6)	10,4	(8,7-12,4)	2301
	<b>45 - 64</b>	15,1	(13,3-17,0)	14,8	(13,0-16,8)	2808
	<b>65 +</b>	19,9	(17,4-22,4)	19,8	(17,4-22,5)	1781
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	16,2	(11,6-20,8)	13,3	(9,7-18,0)	418
	<b>Secondaire inférieur</b>	14,5	(11,4-17,6)	12,3	(9,8-15,4)	893
	<b>Secondaire supérieur</b>	14,2	(12,2-16,2)	13,6	(11,7-15,7)	2275
	<b>Enseignement supérieur</b>	14,1	(12,5-15,7)	14,1	(12,5-16,0)	3881
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	18,1	(14,7-21,5)	17,5	(14,4-21,0)	829
	<b>Brabant Flamand</b>	15,7	(11,9-19,4)	15,1	(11,8-19,1)	506
	<b>Flandre Occidentale</b>	18,4	(15,0-21,7)	17,1	(14,0-20,7)	821
	<b>Flandre Orientale</b>	16,9	(13,5-20,2)	16,3	(13,3-19,9)	698
	<b>Limbourg</b>	14,2	(9,5-18,9)	13,4	(9,5-18,5)	288
	<b>Bruxelles</b>	9,9	(8,3-11,5)	10,0	(8,5-11,8)	1726
	<b>Brabant Wallon</b>	8,7	(4,5-13,0)	8,3	(5,1-13,2)	246
	<b>Hainaut</b>	10,0	(7,4-12,6)	9,7	(7,4-12,6)	768
	<b>Liège</b>	11,4	(7,5-15,4)	10,9	(7,6-15,4)	453
	<b>Luxembourg</b>	8,8	(4,8-12,8)	8,5	(5,3-13,3)	305
	<b>Namur</b>	9,1	(5,5-12,7)	8,6	(5,8-12,8)	297
	<b>Communauté Germanophone</b>	12,4	(9,5-15,4)	12,0	(9,4-15,1)	674
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	18,3	(17,1-19,5)	18,3	(17,1-19,6)	9331
	<b>2008</b>	18,1	(16,8-19,4)	18,1	(16,8-19,5)	7180
	<b>2013</b>	15,6	(14,3-16,8)	15,4	(14,1-16,7)	5812
	<b>2018</b>	14,3	(13,1-15,4)	13,9	(12,8-15,1)	7611

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 181. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une énergie vitale optimale, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

VT02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	13,9	(9,7-18,1)	13,7	(9,8-18,8)	337
	<b>Femme</b>	11,0	(7,2-14,8)	10,3	(7,2-14,6)	337
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,8	(0,9-14,7)	7,7	(3,2-17,7)	83
	<b>25 - 44</b>	8,4	(3,5-13,3)	8,3	(4,6-14,5)	160
	<b>45 - 64</b>	11,5	(7,1-15,8)	11,4	(7,7-16,5)	270
	<b>65 +</b>	24,5	(16,3-32,7)	24,6	(17,3-33,7)	161
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	13,9	(4,5-23,2)	7,1	(2,9-16,3)	50
	<b>Secondaire inférieur</b>	13,0	(6,8-19,3)	9,9	(5,7-16,8)	109
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,8	(4,8-14,8)	9,9	(5,9-16,1)	197
	<b>Enseignement supérieur</b>	14,9	(9,7-20,1)	16,2	(11,2-22,8)	275
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	4,7	(0,4-9,0)	4,6	(1,8-11,3)	183
	<b>2008</b>	10,6	(5,6-15,5)	10,0	(6,2-15,7)	156
	<b>2013</b>	9,9	(3,4-16,4)	9,7	(5,0-18,0)	192
	<b>2018</b>	12,4	(9,5-15,4)	11,8	(9,1-15,1)	674

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 182. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques (score GHQ au seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Belgique**

WB_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	27,1	(25,1-29,2)	26,7	(24,7-28,8)	3738
	<b>Femme</b>	38,4	(36,3-40,4)	38,3	(36,3-40,4)	4133
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	33,9	(29,2-38,7)	33,9	(29,3-38,9)	717
	<b>25 - 44</b>	37,6	(34,8-40,5)	37,4	(34,6-40,3)	2325
	<b>45 - 64</b>	32,7	(30,3-35,1)	32,4	(30,0-34,9)	2884
	<b>65 +</b>	26,3	(23,7-29,0)	25,5	(23,0-28,2)	1945
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	43,7	(37,5-49,9)	47,7	(41,2-54,3)	474
	<b>Secondaire inférieur</b>	33,5	(29,4-37,7)	35,6	(31,3-40,2)	966
	<b>Secondaire supérieur</b>	32,0	(29,2-34,8)	31,3	(28,6-34,2)	2358
	<b>Enseignement supérieur</b>	32,2	(30,1-34,3)	30,5	(28,4-32,6)	3926
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	31,2	(27,2-35,1)	30,6	(26,8-34,7)	843
	<b>Brabant Flamand</b>	26,9	(21,9-31,8)	26,2	(21,7-31,4)	514
	<b>Flandre Occidentale</b>	27,4	(23,8-31,0)	27,4	(23,8-31,3)	825
	<b>Flandre Orientale</b>	32,2	(27,7-36,6)	31,5	(27,4-36,0)	703
	<b>Limbourg</b>	29,9	(23,5-36,4)	29,6	(23,6-36,4)	291
	<b>Bruxelles</b>	39,1	(36,3-41,8)	37,7	(35,0-40,5)	1806
	<b>Brabant Wallon</b>	35,5	(28,4-42,5)	35,4	(28,8-42,6)	257
	<b>Hainaut</b>	38,1	(33,5-42,6)	37,3	(32,9-41,9)	795
	<b>Liège</b>	38,6	(32,4-44,8)	38,0	(32,1-44,4)	469
	<b>Luxembourg</b>	28,9	(23,0-34,8)	28,4	(22,9-34,5)	339
	<b>Namur</b>	36,4	(29,9-42,9)	35,8	(29,6-42,5)	313
	<b>Communauté Germanophone</b>	28,9	(24,6-33,1)	28,4	(24,3-32,9)	716
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	31,1	(29,5-32,6)	30,3	(28,7-31,9)	8217
	<b>2001</b>	24,8	(23,6-26,1)	24,2	(23,0-25,5)	9211
	<b>2004</b>	24,5	(23,2-25,8)	23,9	(22,7-25,2)	9258
	<b>2008</b>	26,0	(24,5-27,5)	25,4	(24,0-27,0)	7525
	<b>2013</b>	31,8	(30,2-33,4)	31,4	(29,8-33,1)	6324
	<b>2018</b>	33,0	(31,4-34,5)	32,7	(31,2-34,2)	7871

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 183. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques (score GHQ au seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

WB_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	23,3	(17,7-28,9)	22,7	(17,8-28,3)	357
	<b>Femme</b>	34,2	(28,3-40,0)	34,4	(28,6-40,7)	359
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	47,6	(33,0-62,1)	48,0	(33,9-62,4)	82
	<b>25 - 44</b>	29,9	(21,3-38,6)	29,7	(21,9-38,9)	163
	<b>45 - 64</b>	24,5	(18,8-30,3)	24,1	(18,9-30,3)	275
	<b>65 +</b>	23,4	(16,3-30,6)	22,6	(16,4-30,2)	196
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	52,0	(35,4-68,5)	61,4	(44,4-76,0)	62
	<b>Secondaire inférieur</b>	30,5	(19,4-41,7)	34,2	(23,2-47,1)	123
	<b>Secondaire supérieur</b>	26,9	(18,9-34,9)	23,6	(17,2-31,5)	206
	<b>Enseignement supérieur</b>	24,7	(18,7-30,7)	21,6	(16,4-27,9)	278
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	15,4	(9,6-21,1)	14,0	(9,3-20,4)	240
	<b>2001</b>	30,2	(21,7-38,7)	29,2	(21,9-37,8)	208
	<b>2004</b>	26,6	(18,0-35,1)	24,9	(17,7-33,9)	183
	<b>2008</b>	17,2	(10,1-24,3)	16,2	(10,3-24,5)	180
	<b>2013</b>	23,5	(17,0-30,0)	22,6	(16,9-29,5)	217
	<b>2018</b>	28,9	(24,6-33,1)	28,1	(24,0-32,5)	716

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 184. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ au GAD-7), Enquête de santé 2018 – Belgique**

AD_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,9	(6,7-9,1)	7,6	(6,5-8,9)	3718
	<b>Femme</b>	14,2	(12,7-15,7)	14,0	(12,5-15,5)	4068
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,0	(7,1-12,9)	9,8	(7,2-13,1)	719
	<b>25 - 44</b>	13,2	(11,2-15,2)	12,7	(10,9-14,8)	2297
	<b>45 - 64</b>	12,0	(10,3-13,6)	11,5	(10,0-13,2)	2863
	<b>65 +</b>	7,7	(6,1-9,3)	7,2	(5,8-8,9)	1907
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	15,4	(10,9-20,0)	17,5	(12,9-23,5)	459
	<b>Secondaire inférieur</b>	12,7	(9,8-15,5)	13,2	(10,3-16,7)	947
	<b>Secondaire supérieur</b>	13,2	(11,2-15,2)	12,3	(10,5-14,4)	2342
	<b>Enseignement supérieur</b>	8,9	(7,7-10,2)	7,8	(6,7-8,9)	3894
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	9,7	(6,9-12,4)	9,0	(6,6-12,1)	842
	<b>Brabant Flamand</b>	8,0	(5,6-10,5)	7,4	(5,4-10,1)	509
	<b>Flandre Occidentale</b>	8,9	(6,7-11,2)	8,6	(6,6-11,1)	817
	<b>Flandre Orientale</b>	6,9	(4,9-9,0)	6,4	(4,8-8,6)	703
	<b>Limbourg</b>	10,4	(5,7-15,0)	9,7	(6,2-14,9)	296
	<b>Bruxelles</b>	12,4	(10,7-14,1)	11,2	(9,7-13,0)	1779
	<b>Brabant Wallon</b>	14,9	(9,2-20,6)	14,4	(9,7-20,8)	254
	<b>Hainaut</b>	16,8	(13,5-20,1)	15,7	(12,8-19,2)	787
	<b>Liège</b>	15,7	(11,5-20,0)	14,7	(11,1-19,3)	476
	<b>Luxembourg</b>	10,0	(6,3-13,6)	9,2	(6,3-13,3)	326
	<b>Namur</b>	14,8	(10,0-19,7)	13,9	(10,0-19,0)	304
	<b>Communauté Germanophone</b>	6,3	(4,2-8,4)	5,9	(4,2-8,1)	693
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	6,3	(5,6-7,0)	6,0	(5,4-6,7)	9148
	<b>2004</b>	6,1	(5,4-6,8)	5,8	(5,2-6,5)	9237
	<b>2008</b>	6,5	(5,7-7,3)	6,1	(5,4-7,0)	7461
	<b>2013</b>	10,1	(9,0-11,1)	9,5	(8,5-10,6)	6038
	<b>2018</b>	11,2	(10,2-12,2)	10,6	(9,7-11,6)	7786

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le GAD-7

**Tableau B 185. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ au GAD-7), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AD_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,7	(1,9-5,4)	3,2	(1,9-5,4)	351
	<b>Femme</b>	8,9	(5,3-12,5)	8,1	(5,4-11,8)	342
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,4	(0,0-3,0)	1,3	(0,4-3,9)	83
	<b>25 - 44</b>	10,0	(4,0-16,0)	9,5	(5,4-16,1)	155
	<b>45 - 64</b>	6,0	(3,3-8,8)	5,5	(3,4-8,9)	275
	<b>65 +</b>	5,3	(1,9-8,7)	4,6	(2,3-9,0)	180
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	3,2	(0,0-7,7)	2,8	(0,7-10,9)	60
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,9	(1,5-14,3)	6,4	(2,8-13,9)	111
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,1	(4,0-12,1)	6,7	(3,8-11,5)	204
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,5	(2,1-8,8)	4,4	(2,4-8,0)	273
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	2,8	(0,6-4,9)	2,3	(1,1-5,0)	206
	<b>2004</b>	4,0	(0,7-7,2)	3,2	(1,4-7,2)	184
	<b>2008</b>	1,7	(0,1-3,4)	1,4	(0,5-3,7)	179
	<b>2013</b>	7,1	(2,7-11,5)	6,0	(3,1-11,3)	202
	<b>2018</b>	6,3	(4,2-8,4)	5,5	(3,9-7,7)	693

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le GAD-7

**Tableau B 186. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) (PHQ-9), Enquête de santé 2018 – Belgique**

AD_6		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,0	(6,7-9,3)	7,8	(6,6-9,2)	3722
	<b>Femme</b>	10,7	(9,4-11,9)	10,5	(9,2-11,8)	4075
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,4	(4,4-10,4)	7,4	(4,8-11,1)	719
	<b>25 - 44</b>	10,0	(8,3-11,8)	9,9	(8,3-11,8)	2299
	<b>45 - 64</b>	10,6	(9,1-12,1)	10,5	(9,1-12,2)	2864
	<b>65 +</b>	7,5	(6,0-8,9)	7,3	(6,0-8,9)	1915
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	16,7	(12,3-21,2)	18,9	(14,3-24,6)	459
	<b>Secondaire inférieur</b>	13,2	(10,3-16,2)	13,9	(11,0-17,4)	952
	<b>Secondaire supérieur</b>	10,3	(8,5-12,2)	9,8	(8,1-11,9)	2343
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,7	(5,6-7,9)	6,1	(5,2-7,3)	3898
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	6,3	(4,3-8,3)	6,1	(4,4-8,3)	840
	<b>Brabant Flamand</b>	6,7	(4,3-9,1)	6,4	(4,5-9,2)	506
	<b>Flandre Occidentale</b>	5,8	(4,0-7,6)	5,7	(4,1-7,7)	820
	<b>Flandre Orientale</b>	5,9	(3,9-7,9)	5,7	(4,0-8,0)	704
	<b>Limbourg</b>	8,8	(4,4-13,2)	8,6	(5,2-13,8)	296
	<b>Bruxelles</b>	12,8	(11,0-14,5)	12,3	(10,6-14,1)	1786
	<b>Brabant Wallon</b>	14,2	(8,6-19,8)	14,0	(9,4-20,5)	254
	<b>Hainaut</b>	14,3	(11,1-17,6)	13,9	(11,0-17,4)	788
	<b>Liège</b>	14,5	(9,7-19,3)	14,0	(9,8-19,6)	475
	<b>Luxembourg</b>	9,1	(5,5-12,8)	8,8	(5,9-13,0)	325
	<b>Namur</b>	13,9	(9,6-18,2)	13,6	(9,9-18,3)	305
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,1	(3,2-7,0)	5,0	(3,4-7,2)	698
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	8,6	(7,8-9,5)	8,4	(7,6-9,3)	9159
	<b>2004</b>	8,0	(7,2-8,7)	7,7	(7,0-8,5)	9241
	<b>2008</b>	9,5	(8,6-10,4)	9,2	(8,3-10,1)	7483
	<b>2013</b>	14,8	(13,5-16,0)	14,2	(13,0-15,4)	6082
	<b>2018</b>	9,4	(8,4-10,3)	8,9	(8,0-9,9)	7797

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le PHQ-9

**Tableau B 187. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) (PHQ-9), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AD_6		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,2	(2,4-7,9)	5,1	(3,1-8,4)	352
	<b>Femme</b>	5,1	(2,5-7,8)	5,1	(3,0-8,6)	346
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,1	(0,2-14,0)	7,1	(2,7-17,5)	83
	<b>25 - 44</b>	5,7	(1,2-10,3)	5,7	(2,5-12,3)	155
	<b>45 - 64</b>	4,3	(2,1-6,5)	4,3	(2,6-7,1)	277
	<b>65 +</b>	4,7	(1,5-7,9)	4,7	(2,4-9,1)	183
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,9	(0,0-7,0)	3,1	(0,8-11,7)	60
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,7	(0,8-14,5)	8,2	(3,0-20,5)	113
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,2	(2,9-11,5)	7,1	(4,0-12,1)	204
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,4	(1,3-5,4)	3,3	(1,6-6,5)	275
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	3,4	(0,1-6,7)	3,1	(1,2-7,7)	209
	<b>2004</b>	5,5	(1,8-9,2)	5,2	(2,7-9,8)	183
	<b>2008</b>	3,8	(1,0-6,5)	3,4	(1,6-7,3)	179
	<b>2013</b>	13,8	(7,8-19,8)	13,1	(8,3-20,1)	205
	<b>2018</b>	5,1	(3,2-7,0)	4,9	(3,3-7,4)	698

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

NB: de 2001 à 2013: mesuré via le SCL-90 ; en 2018: mesuré via le PHQ-9

Tableau B 188. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire (seuil de 2+ au SCOFF), Enquête de santé 2018 - Belgique

EB_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	5,7	(4,6-6,8)	5,0	(4,1-6,1)	3770
	<b>Femme</b>	8,6	(7,5-9,8)	8,0	(6,9-9,2)	4172
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	13,7	(10,2-17,2)	13,6	(10,4-17,5)	724
	<b>25 - 44</b>	8,9	(7,4-10,5)	8,7	(7,3-10,4)	2331
	<b>45 - 64</b>	6,5	(5,2-7,7)	6,3	(5,1-7,7)	2911
	<b>65 +</b>	2,8	(1,9-3,6)	2,6	(1,9-3,5)	1976
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,1	(6,2-14,0)	13,0	(8,9-18,5)	478
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,8	(6,3-11,4)	9,8	(7,3-13,1)	975
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,2	(6,5-9,8)	6,9	(5,6-8,4)	2377
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,7	(4,7-6,6)	4,4	(3,7-5,3)	3958
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	6,1	(3,9-8,4)	5,5	(3,7-8,0)	852
	<b>Brabant Flamand</b>	7,0	(4,4-9,7)	6,2	(4,2-9,1)	516
	<b>Flandre Occidentale</b>	4,0	(2,6-5,4)	3,8	(2,6-5,3)	837
	<b>Flandre Orientale</b>	5,0	(3,2-6,9)	4,4	(3,0-6,4)	712
	<b>Limbourg</b>	7,6	(2,9-12,3)	7,2	(3,8-13,0)	292
	<b>Bruxelles</b>	10,1	(8,4-11,8)	8,5	(7,1-10,2)	1820
	<b>Brabant Wallon</b>	9,8	(5,0-14,7)	8,6	(5,3-13,6)	258
	<b>Hainaut</b>	9,1	(6,6-11,7)	7,9	(5,9-10,5)	802
	<b>Liège</b>	10,3	(7,0-13,5)	9,3	(6,8-12,7)	478
	<b>Luxembourg</b>	6,8	(4,2-9,5)	5,9	(3,9-8,9)	338
	<b>Namur</b>	7,2	(3,7-10,7)	6,4	(3,9-10,4)	312
	<b>Communauté Germanophone</b>	4,3	(2,5-6,0)	3,7	(2,4-5,6)	725
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	8,4	(7,4-9,3)	7,6	(6,8-8,6)	6306
	<b>2018</b>	7,2	(6,4-8,0)	6,6	(5,8-7,4)	7942

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 189. Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire (seuil de 2+ au SCOFF), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

<b>EB_1</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,0	(1,0-5,0)	0,2	(0,1-0,4)	360
	<b>Femme</b>	5,4	(2,7-8,2)	0,4	(0,3-0,6)	365
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	13,4	(4,4-22,4)	13,1	(6,8-23,6)	84
	<b>25 - 44</b>	4,5	(1,2-7,8)	4,3	(2,0-8,8)	163
	<b>45 - 64</b>	3,2	(1,1-5,4)	3,0	(1,4-6,3)	280
	<b>65 +</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	198
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	65
	<b>Secondaire inférieur</b>	2,3	(0,0-5,3)	0,3	(0,1-0,8)	123
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,3	(1,6-8,9)	0,4	(0,2-0,7)	208
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,2	(2,1-8,4)	0,4	(0,2-0,7)	280
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	5,8	(2,3-9,3)	3,2	(1,5-6,7)	216
	<b>2018</b>	4,3	(2,5-6,0)	2,2	(1,3-4,0)	725

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 190. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 – Belgique**

SU01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	12,3	(10,7-13,8)	11,6	(10,2-13,2)	3685
	<b>Femme</b>	15,5	(14,0-17,1)	15,1	(13,6-16,6)	4053
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	15,5	(11,6-19,4)	15,5	(12,0-19,7)	716
	<b>25 - 44</b>	15,5	(13,4-17,7)	15,4	(13,4-17,7)	2299
	<b>45 - 64</b>	16,1	(14,2-17,9)	16,0	(14,2-17,9)	2835
	<b>65 +</b>	7,5	(6,0-9,0)	7,4	(6,0-9,0)	1888
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	14,1	(8,9-19,3)	17,1	(11,7-24,2)	448
	<b>Secondaire inférieur</b>	14,2	(11,2-17,2)	15,4	(12,4-19,0)	934
	<b>Secondaire supérieur</b>	14,7	(12,5-16,9)	13,9	(11,9-16,1)	2316
	<b>Enseignement supérieur</b>	13,3	(11,8-14,9)	12,0	(10,6-13,5)	3897
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	12,0	(9,4-14,7)	11,4	(9,1-14,2)	821
	<b>Brabant Flamand</b>	11,9	(8,3-15,5)	11,2	(8,2-15,1)	499
	<b>Flandre Occidentale</b>	9,9	(7,6-12,3)	9,7	(7,6-12,4)	795
	<b>Flandre Orientale</b>	16,9	(13,5-20,4)	16,1	(13,1-19,7)	695
	<b>Limbourg</b>	12,7	(8,4-17,0)	12,4	(8,8-17,2)	290
	<b>Bruxelles</b>	14,3	(12,5-16,2)	13,3	(11,6-15,2)	1796
	<b>Brabant Wallon</b>	14,5	(8,9-20,1)	13,9	(9,3-20,1)	254
	<b>Hainaut</b>	16,1	(12,6-19,7)	15,2	(12,1-18,9)	787
	<b>Liège</b>	16,6	(11,2-21,9)	15,9	(11,4-21,9)	468
	<b>Luxembourg</b>	13,0	(8,4-17,7)	12,2	(8,5-17,2)	332
	<b>Namur</b>	15,7	(10,7-20,6)	15,0	(10,8-20,6)	308
	<b>Communauté Germanophone</b>	11,3	(8,2-14,5)	10,6	(8,0-14,1)	693
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	12,2	(11,2-13,2)	11,4	(10,4-12,4)	9307
	<b>2008</b>	11,7	(10,7-12,6)	10,9	(10,0-11,9)	7522
	<b>2013</b>	13,8	(12,6-15,1)	13,1	(12,0-14,4)	6252
	<b>2018</b>	13,9	(12,8-15,1)	13,3	(12,2-14,5)	7738

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 191. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

SU01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	11,7	(7,3-16,1)	11,4	(7,9-16,3)	348
	<b>Femme</b>	11,0	(6,9-15,1)	10,9	(7,5-15,6)	345
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	11,9	(3,6-20,1)	11,9	(5,8-22,6)	83
	<b>25 - 44</b>	14,7	(7,5-22,0)	14,7	(8,9-23,5)	158
	<b>45 - 64</b>	10,7	(5,9-15,4)	10,7	(6,8-16,4)	269
	<b>65 +</b>	7,8	(3,9-11,7)	7,8	(4,7-12,6)	183
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	11,2	(0,4-22,0)	14,0	(4,6-35,3)	58
	<b>Secondaire inférieur</b>	11,8	(4,0-19,6)	13,0	(6,6-23,9)	113
	<b>Secondaire supérieur</b>	12,0	(6,1-18,0)	11,2	(6,7-18,2)	201
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,9	(5,3-14,6)	9,0	(5,5-14,4)	277
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	16,0	(9,4-22,6)	14,7	(9,8-21,6)	187
	<b>2008</b>	5,1	(1,0-9,2)	4,9	(2,2-10,4)	184
	<b>2013</b>	15,8	(9,9-21,7)	14,9	(9,9-21,8)	208
	<b>2018</b>	11,3	(8,2-14,5)	10,7	(8,0-14,2)	693

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 192. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

SU01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,2	(3,2-5,2)	3,9	(3,1-5,0)	3716
	<b>Femme</b>	4,4	(3,6-5,1)	4,2	(3,5-5,0)	4120
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,2	(2,4-8,0)	5,2	(3,0-8,8)	713
	<b>25 - 44</b>	4,4	(3,3-5,5)	4,4	(3,4-5,7)	2309
	<b>45 - 64</b>	5,2	(4,2-6,2)	5,2	(4,3-6,3)	2860
	<b>65 +</b>	2,1	(1,4-2,8)	2,1	(1,5-2,9)	1954
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,0	(2,9-9,0)	7,5	(4,4-12,4)	472
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,2	(3,4-7,0)	5,7	(4,0-8,0)	961
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,9	(3,6-6,3)	4,5	(3,4-6,0)	2346
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,5	(2,8-4,2)	3,0	(2,4-3,8)	3911
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	3,2	(1,9-4,5)	3,0	(2,0-4,5)	833
	<b>Brabant Flamand</b>	2,6	(1,3-4,0)	2,5	(1,5-4,1)	507
	<b>Flandre Occidentale</b>	3,7	(2,3-5,2)	3,7	(2,5-5,4)	818
	<b>Flandre Orientale</b>	3,9	(2,4-5,4)	3,6	(2,5-5,3)	706
	<b>Limbourg</b>	2,4	(0,8-4,0)	2,4	(1,2-4,6)	292
	<b>Bruxelles</b>	4,9	(3,8-6,1)	4,6	(3,6-5,9)	1790
	<b>Brabant Wallon</b>	5,5	(2,4-8,7)	5,2	(2,9-9,3)	255
	<b>Hainaut</b>	5,8	(3,7-7,8)	5,4	(3,7-7,6)	800
	<b>Liège</b>	6,8	(3,0-10,7)	6,5	(3,7-11,4)	475
	<b>Luxembourg</b>	4,7	(1,9-7,4)	4,3	(2,4-7,7)	337
	<b>Namur</b>	5,4	(2,6-8,3)	5,2	(3,1-8,7)	307
	<b>Communauté Germanophone</b>	2,9	(1,2-4,6)	2,7	(1,5-4,9)	716
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	3,6	(3,1-4,1)	3,4	(2,9-3,9)	7515
	<b>2013</b>	5,0	(4,2-5,7)	4,8	(4,1-5,5)	6235
	<b>2018</b>	4,3	(3,6-4,9)	4,1	(3,5-4,7)	7836

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 193. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

SU01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	2,6	(0,4-4,9)	2,4	(1,0-5,4)	359
	<b>Femme</b>	3,2	(0,6-5,7)	3,0	(1,3-6,5)	357
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,5	(0,0-12,1)	5,5	(1,6-17,3)	82
	<b>25 - 44</b>	4,1	(0,0-8,7)	4,1	(1,4-11,6)	160
	<b>45 - 64</b>	1,8	(0,0-3,7)	1,8	(0,7-4,9)	275
	<b>65 +</b>	1,7	(0,0-3,7)	1,6	(0,5-5,4)	199
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	1,2	(0,0-3,7)	1,3	(0,2-8,8)	66
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,7	(0,0-1,7)	0,7	(0,2-3,3)	121
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,7	(0,5-8,9)	4,3	(1,8-9,9)	204
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,3	(0,3-6,3)	3,0	(1,2-7,5)	277
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	1,5	(0,0-3,3)	1,4	(0,5-4,0)	185
	<b>2013</b>	2,9	(0,6-5,2)	2,5	(1,1-5,5)	207
	<b>2018</b>	2,9	(1,2-4,6)	2,6	(1,4-4,7)	716

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 194. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Belgique

SU02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,1	(2,4-3,8)	2,8	(2,2-3,6)	3684
	<b>Femme</b>	5,4	(4,5-6,4)	5,1	(4,3-6,1)	4055
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	3,6	(2,0-5,1)	3,5	(2,3-5,3)	715
	<b>25 - 44</b>	5,0	(3,6-6,5)	4,9	(3,6-6,5)	2302
	<b>45 - 64</b>	5,2	(4,2-6,3)	5,0	(4,1-6,2)	2839
	<b>65 +</b>	2,2	(1,4-2,9)	2,0	(1,4-2,8)	1883
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,4	(2,5-8,2)	6,2	(3,6-10,4)	447
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,3	(2,8-5,9)	4,4	(3,1-6,4)	932
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,5	(4,2-6,9)	4,9	(3,8-6,2)	2323
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,3	(2,5-4,1)	2,7	(2,1-3,5)	3893
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	3,1	(1,9-4,4)	2,7	(1,8-4,2)	817
	<b>Brabant Flamand</b>	2,9	(1,3-4,6)	2,6	(1,5-4,5)	502
	<b>Flandre Occidentale</b>	3,1	(1,7-4,4)	2,8	(1,8-4,4)	801
	<b>Flandre Orientale</b>	3,7	(2,2-5,1)	3,3	(2,2-4,9)	693
	<b>Limbourg</b>	4,8	(1,8-7,8)	4,4	(2,4-8,1)	289
	<b>Bruxelles</b>	4,2	(3,2-5,2)	3,6	(2,8-4,7)	1789
	<b>Brabant Wallon</b>	5,2	(2,2-8,3)	4,8	(2,6-8,6)	255
	<b>Hainaut</b>	7,8	(4,9-10,7)	7,0	(4,8-10,0)	787
	<b>Liège</b>	4,6	(2,3-6,8)	4,1	(2,5-6,6)	470
	<b>Luxembourg</b>	4,8	(2,2-7,4)	4,2	(2,4-7,2)	333
	<b>Namur</b>	4,4	(1,9-7,0)	4,0	(2,2-7,0)	308
	<b>Communauté Germanophone</b>	2,3	(0,9-3,6)	2,0	(1,1-3,7)	695
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	3,7	(3,2-4,3)	3,4	(2,9-4,0)	9264
	<b>2008</b>	4,9	(4,2-5,5)	4,4	(3,9-5,1)	7408
	<b>2013</b>	4,2	(3,5-4,9)	3,8	(3,3-4,5)	6141
	<b>2018</b>	4,3	(3,7-4,9)	3,9	(3,4-4,6)	7739

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 195. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

SU02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	2,7	(0,3-5,0)	2,5	(1,1-5,5)	349
	<b>Femme</b>	1,9	(0,5-3,3)	1,8	(0,8-3,9)	346
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,8	(0,0-4,4)	1,7	(0,4-7,4)	84
	<b>25 - 44</b>	3,4	(0,0-7,2)	3,3	(1,2-9,3)	157
	<b>45 - 64</b>	2,2	(0,2-4,2)	2,2	(0,9-5,4)	269
	<b>65 +</b>	1,3	(0,0-2,8)	1,3	(0,4-4,0)	185
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	1,8	(0,0-5,3)	2,2	(0,3-15,8)	59
	<b>Secondaire inférieur</b>	3,4	(0,0-8,1)	3,7	(0,9-14,2)	114
	<b>Secondaire supérieur</b>	0,9	(0,0-1,9)	0,8	(0,2-3,3)	201
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,6	(0,2-4,9)	2,1	(0,8-5,4)	277
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	2,1	(0,0-4,6)	1,8	(0,5-6,4)	179
	<b>2008</b>	2,4	(0,4-4,5)	2,3	(0,9-5,5)	179
	<b>2013</b>	2,7	(0,6-4,9)	2,5	(1,2-5,3)	203
	<b>2018</b>	2,3	(0,9-3,6)	2,1	(1,1-4,1)	695

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 196. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des tranquillisants ou des somnifères au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Belgique**

MH_5		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	9,5	(8,4-10,7)	8,2	(7,2-9,4)	4668
	Femme	15,0	(13,7-16,3)	12,4	(11,2-13,8)	5074
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,1	(2,2-5,9)	4,0	(2,6-6,2)	1058
	25 - 44	5,6	(4,5-6,7)	5,5	(4,5-6,7)	2913
	45 - 64	13,2	(11,7-14,7)	13,0	(11,6-14,6)	3390
	65 +	25,6	(23,0-28,2)	24,9	(22,4-27,5)	2381
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	24,5	(19,9-29,0)	15,1	(11,9-18,9)	722
	Secondaire inférieur	18,9	(15,9-21,8)	12,9	(10,5-15,6)	1274
	Secondaire supérieur	12,6	(10,9-14,3)	11,1	(9,6-12,7)	2889
	Enseignement supérieur	8,7	(7,6-9,8)	8,1	(7,1-9,3)	4677
PROVINCE	Anvers	10,7	(8,3-13,1)	8,6	(6,8-10,9)	984
	Brabant Flamand	12,0	(8,9-15,1)	9,7	(7,3-12,9)	568
	Flandre Occidentale	14,7	(12,0-17,5)	11,2	(9,1-13,7)	932
	Flandre Orientale	10,6	(8,1-13,2)	8,6	(6,6-11,1)	789
	Limbourg	17,0	(12,5-21,4)	13,6	(10,0-18,2)	363
	Bruxelles	9,7	(8,4-11,1)	9,1	(7,9-10,5)	2510
	Brabant Wallon	15,3	(9,4-21,2)	13,1	(8,8-19,0)	313
	Hainaut	12,2	(9,9-14,4)	10,4	(8,5-12,7)	962
	Liège	14,0	(10,6-17,5)	11,7	(9,1-15,0)	600
	Luxembourg	12,0	(7,9-16,1)	10,2	(7,2-14,2)	484
	Namur	13,8	(9,7-18,0)	11,2	(8,0-15,4)	429
	Communauté Germanophone	9,6	(7,2-12,1)	7,6	(5,8-9,8)	808
ANNEE	1997	8,5	(7,6-9,4)	7,8	(7,0-8,7)	8550
	2001	11,5	(10,5-12,4)	9,3	(8,5-10,1)	10126
	2004	13,2	(12,3-14,1)	10,8	(9,9-11,7)	11177
	2008	14,3	(13,3-15,2)	11,5	(10,6-12,4)	9622
	2013	13,2	(12,1-14,2)	10,3	(9,4-11,3)	9104
	2018	12,3	(11,4-13,3)	9,4	(8,6-10,2)	9742

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 197. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des tranquillisants ou des somnifères au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MH_5		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,3	(3,4-9,1)	4,5	(2,4-8,1)	400
	<b>Femme</b>	12,8	(9,0-16,5)	9,1	(6,3-13,1)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,9	(0,0-2,6)	0,8	(0,1-5,7)	96
	<b>25 - 44</b>	5,6	(1,8-9,4)	5,3	(2,6-10,4)	185
	<b>45 - 64</b>	7,7	(4,0-11,5)	7,4	(4,3-12,3)	296
	<b>65 +</b>	23,1	(16,4-29,8)	21,8	(16,2-28,6)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	26,4	(13,8-39,1)	2,9	(1,5-5,4)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	15,3	(7,4-23,2)	2,0	(1,0-4,0)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,4	(4,2-12,6)	1,5	(0,9-2,6)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,7	(2,3-7,1)	0,9	(0,5-1,6)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	3,5	(1,5-5,4)	2,7	(1,5-4,9)	246
	<b>2001</b>	4,7	(1,3-8,1)	2,5	(1,2-5,4)	238
	<b>2004</b>	10,5	(5,9-15,1)	6,3	(3,7-10,5)	235
	<b>2008</b>	15,2	(8,0-22,4)	7,8	(4,7-12,9)	210
	<b>2013</b>	15,4	(9,4-21,5)	9,6	(6,0-14,9)	264
	<b>2018</b>	9,6	(7,2-12,1)	5,4	(3,8-7,8)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 198. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 – Belgique**

MH_6		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	5,3	(4,5-6,1)	4,4	(3,7-5,3)	4669
	Femme	9,8	(8,8-10,8)	8,2	(7,2-9,3)	5074
GROUPE D'AGE	15 - 24	1,3	(0,6-2,0)	1,3	(0,7-2,2)	1058
	25 - 44	4,8	(3,7-5,9)	4,6	(3,6-5,8)	2914
	45 - 64	11,3	(9,9-12,7)	11,0	(9,7-12,4)	3390
	65 +	9,9	(8,4-11,5)	9,3	(7,9-10,8)	2381
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	10,6	(7,7-13,4)	7,7	(5,7-10,3)	722
	Secondaire inférieur	11,0	(8,6-13,3)	8,1	(6,2-10,5)	1275
	Secondaire supérieur	8,5	(7,2-9,8)	7,1	(6,0-8,5)	2889
	Enseignement supérieur	5,6	(4,8-6,4)	4,6	(3,9-5,4)	4677
PROVINCE	Anvers	7,0	(5,3-8,8)	5,6	(4,2-7,2)	984
	Brabant Flamand	5,5	(3,6-7,5)	4,3	(3,0-6,2)	568
	Flandre Occidentale	7,2	(5,5-9,0)	5,5	(4,2-7,1)	932
	Flandre Orientale	5,7	(3,9-7,4)	4,4	(3,2-6,2)	790
	Limbourg	7,8	(4,9-10,7)	6,0	(4,1-8,9)	363
	Bruxelles	8,1	(6,9-9,2)	7,1	(6,0-8,3)	2510
	Brabant Wallon	9,7	(5,6-13,8)	8,0	(5,2-12,2)	313
	Hainaut	9,6	(7,4-11,8)	7,9	(6,1-10,1)	962
	Liège	9,7	(7,0-12,4)	7,8	(5,7-10,6)	600
	Luxembourg	6,7	(4,0-9,4)	5,4	(3,6-8,2)	484
	Namur	7,6	(4,6-10,6)	6,0	(3,9-9,0)	429
	Communauté Germanophone	6,3	(4,0-8,5)	4,8	(3,3-7,0)	808
ANNEE	1997	3,9	(3,2-4,5)	3,5	(2,9-4,1)	8510
	2001	4,9	(4,3-5,5)	4,2	(3,7-4,7)	10115
	2004	6,0	(5,4-6,7)	5,1	(4,5-5,8)	11164
	2008	5,7	(5,0-6,3)	4,7	(4,1-5,3)	9600
	2013	7,6	(6,8-8,4)	6,3	(5,6-7,0)	9104
	2018	7,6	(6,9-8,3)	6,2	(5,7-6,9)	9743

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 199. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MH_6		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,9	(2,4-7,3)	3,8	(2,1-6,7)	400
	<b>Femme</b>	7,6	(4,3-10,8)	5,9	(3,6-9,6)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,6	(0,0-1,7)	0,5	(0,1-3,8)	96
	<b>25 - 44</b>	4,9	(0,7-9,1)	4,8	(2,0-11,0)	185
	<b>45 - 64</b>	8,2	(3,9-12,5)	8,0	(4,7-13,4)	296
	<b>65 +</b>	8,4	(4,0-12,8)	8,1	(4,7-13,4)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	13,8	(3,2-24,5)	9,5	(3,9-21,7)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,6	(0,2-11,1)	3,7	(1,3-9,9)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,3	(1,2-7,3)	3,3	(1,7-6,6)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,4	(2,6-10,2)	5,3	(2,7-10,0)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	2,8	(0,2-5,4)	2,0	(0,7-5,1)	244
	<b>2001</b>	1,6	(0,1-3,1)	1,1	(0,4-2,7)	238
	<b>2004</b>	5,5	(2,4-8,5)	3,4	(1,9-6,1)	235
	<b>2008</b>	2,7	(0,0-6,0)	1,5	(0,5-4,7)	210
	<b>2013</b>	2,0	(0,5-3,5)	1,2	(0,5-2,7)	264
	<b>2018</b>	6,3	(4,0-8,5)	3,9	(2,4-6,3)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 200. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 – Belgique**

MH_7		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	12,0	(10,7-13,2)	10,6	(9,4-12,0)	4668
	Femme	18,8	(17,4-20,2)	16,3	(14,9-17,8)	5074
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,9	(3,0-6,7)	4,8	(3,2-7,0)	1058
	25 - 44	8,0	(6,6-9,5)	7,9	(6,6-9,4)	2913
	45 - 64	18,1	(16,3-19,8)	17,8	(16,2-19,6)	3390
	65 +	28,5	(25,9-31,2)	27,7	(25,2-30,4)	2381
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	26,9	(22,3-31,5)	18,0	(14,6-22,1)	722
	Secondaire inférieur	22,4	(19,2-25,7)	16,3	(13,5-19,6)	1274
	Secondaire supérieur	16,0	(14,2-17,8)	14,4	(12,7-16,4)	2889
	Enseignement supérieur	11,6	(10,4-12,9)	11,0	(9,8-12,3)	4677
PROVINCE	Anvers	14,2	(11,6-16,8)	11,9	(9,8-14,5)	984
	Brabant Flamand	14,2	(10,9-17,4)	11,9	(9,2-15,2)	568
	Flandre Occidentale	16,5	(13,7-19,4)	13,1	(10,8-15,7)	932
	Flandre Orientale	14,0	(11,1-16,9)	11,8	(9,4-14,6)	789
	Limbourg	20,4	(15,6-25,2)	17,1	(13,0-22,1)	363
	Bruxelles	13,3	(11,8-14,8)	12,8	(11,3-14,3)	2510
	Brabant Wallon	19,6	(13,3-26,0)	17,5	(12,6-23,8)	313
	Hainaut	15,5	(12,8-18,1)	13,7	(11,3-16,5)	962
	Liège	18,2	(14,3-22,1)	15,8	(12,5-19,8)	600
	Luxembourg	13,7	(9,4-17,9)	11,9	(8,8-16,0)	484
	Namur	15,2	(10,9-19,6)	12,6	(9,2-17,1)	429
	Communauté Germanophone	13,4	(10,4-16,3)	11,0	(8,7-13,8)	808
ANNEE	1997	10,2	(9,2-11,2)	9,6	(8,6-10,6)	8510
	2001	13,3	(12,3-14,3)	11,2	(10,3-12,1)	10115
	2004	15,2	(14,2-16,3)	12,9	(11,9-14,0)	11164
	2008	15,9	(14,8-16,9)	13,3	(12,3-14,2)	9601
	2013	16,2	(15,1-17,4)	13,4	(12,3-14,4)	9104
	2018	15,5	(14,5-16,5)	12,4	(11,5-13,4)	9742

Source: Enquête de Santé, Belgique 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 201. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

MH_7		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	9,6	(6,2-13,0)	7,5	(4,9-11,4)	400
	<b>Femme</b>	16,9	(12,5-21,3)	13,2	(9,6-17,9)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	1,4	(0,0-3,5)	1,4	(0,3-5,6)	96
	<b>25 - 44</b>	8,7	(3,6-13,8)	8,4	(4,6-14,7)	185
	<b>45 - 64</b>	13,9	(8,7-19,0)	13,5	(9,0-19,7)	296
	<b>65 +</b>	25,7	(18,8-32,6)	24,6	(18,7-31,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	31,4	(18,2-44,7)	17,2	(9,5-29,1)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	18,3	(9,4-27,3)	10,8	(5,7-19,6)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	10,2	(5,7-14,7)	7,8	(4,7-12,8)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,5	(5,4-13,6)	7,8	(4,6-12,8)	318
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	5,4	(2,4-8,5)	4,5	(2,5-8,0)	244
	<b>2001</b>	6,0	(2,3-9,6)	3,7	(2,0-6,8)	238
	<b>2004</b>	12,2	(7,4-16,9)	7,9	(5,0-12,4)	235
	<b>2008</b>	15,3	(8,1-22,5)	8,6	(5,3-13,8)	210
	<b>2013</b>	15,6	(9,5-21,7)	10,3	(6,7-15,6)	264
	<b>2018</b>	13,4	(10,4-16,3)	8,6	(6,3-11,7)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

# UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ

## 9. Contacts avec un médecin généraliste

En 2018, au sein de la Communauté Germanophone, 83,0% de la population a rapporté avoir eu un contact avec un médecin généraliste au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Ce taux est comparable à la moyenne belge (82,0%).

Le pourcentage de personnes ayant eu un contact avec un médecin généraliste est plus élevé parmi les femmes (86,3%) que parmi les hommes (79,6%) et plus élevé chez les 65 ans plus (94,6%) que parmi les groupes d'âges plus jeunes (entre 75,1% et 83,6%).

Après standardisation pour l'âge et le sexe, il n'y a aucune différence significative quant à la distribution des personnes ayant contacté le généraliste en fonction du niveau d'éducation, mais le pourcentage de personnes ayant eu un contact avec un médecin généraliste est plus élevé en 2018 (83,0%) qu'en 2013 (75,3%).

**Tableau B 202. Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

GP02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	79,7	(78,2-81,2)	81,8	(80,3-83,1)	5584
	<b>Femme</b>	86,1	(84,8-87,3)	87,2	(85,9-88,4)	6021
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	76,1	(73,8-78,5)	76,5	(74,1-78,8)	2914
	<b>25 - 44</b>	78,8	(76,8-80,9)	79,1	(77,0-81,1)	2915
	<b>45 - 64</b>	86,3	(84,8-87,8)	86,5	(85,0-88,0)	3393
	<b>65 +</b>	94,3	(93,1-95,5)	94,3	(93,0-95,4)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	85,1	(81,2-89,0)	81,7	(76,6-86,0)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	85,3	(82,5-88,1)	84,2	(81,1-86,9)	1433
	<b>Secondaire supérieur</b>	84,2	(82,2-86,1)	86,1	(84,3-87,8)	3400
	<b>Enseignement supérieur</b>	81,3	(79,8-82,8)	84,3	(82,7-85,7)	5752
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	87,1	(84,6-89,6)	88,5	(85,9-90,7)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	82,8	(79,0-86,7)	84,5	(80,6-87,8)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	86,5	(83,8-89,3)	87,3	(84,3-89,7)	1074
	<b>Flandre Orientale</b>	85,6	(82,6-88,5)	87,0	(84,1-89,5)	946
	<b>Limbourg</b>	86,6	(82,5-90,7)	87,8	(83,4-91,1)	425
	<b>Bruxelles</b>	75,2	(73,3-77,1)	78,7	(76,7-80,5)	3098
	<b>Brabant Wallon</b>	78,7	(72,7-84,7)	80,7	(74,7-85,5)	361
	<b>Hainaut</b>	81,1	(78,1-84,0)	83,2	(80,2-85,8)	1118
	<b>Liège</b>	79,9	(75,5-84,3)	81,8	(77,2-85,6)	703
	<b>Luxembourg</b>	82,6	(78,1-87,2)	84,8	(80,1-88,5)	593
	<b>Namur</b>	80,1	(75,5-84,6)	81,8	(77,2-85,7)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	83,0	(80,1-85,9)	84,4	(81,4-87,0)	928
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	78,6	(77,4-79,9)	82,0	(80,8-83,2)	9717
	<b>2001</b>	80,4	(79,2-81,5)	82,6	(81,5-83,7)	11065
	<b>2004</b>	78,6	(77,4-79,8)	80,9	(79,7-82,0)	11989
	<b>2008</b>	77,7	(76,5-79,0)	80,1	(78,9-81,2)	11138
	<b>2013</b>	77,0	(75,8-78,3)	79,3	(78,1-80,4)	10821
	<b>2018</b>	82,9	(81,9-84,0)	84,8	(83,8-85,7)	11605

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 203. Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

GP02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	79,6	(75,3-84,0)	81,2	(76,7-85,0)	456
	<b>Femme</b>	86,3	(82,9-89,7)	87,1	(83,4-90,2)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	81,2	(74,8-87,5)	81,5	(74,5-86,9)	216
	<b>25 - 44</b>	75,1	(68,0-82,2)	75,3	(67,7-81,6)	185
	<b>45 - 64</b>	83,6	(78,6-88,5)	83,8	(78,2-88,2)	296
	<b>65 +</b>	94,6	(91,3-97,9)	94,6	(90,2-97,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	90,8	(83,5-98,1)	87,3	(72,7-94,6)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	85,8	(78,5-93,1)	84,0	(74,1-90,6)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	82,7	(77,3-88,1)	84,8	(79,3-89,0)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	80,2	(75,4-85,0)	83,3	(78,5-87,3)	390
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	75,4	(68,5-82,2)	79,0	(72,0-84,6)	282
	<b>2001</b>	78,1	(71,4-84,9)	80,6	(73,8-86,0)	258
	<b>2004</b>	82,3	(76,9-87,8)	84,0	(78,3-88,4)	251
	<b>2008</b>	71,6	(62,8-80,5)	71,5	(62,3-79,2)	234
	<b>2013</b>	75,3	(69,2-81,5)	76,4	(70,2-81,6)	306
	<b>2018</b>	83,0	(80,1-85,9)	84,1	(81,1-86,7)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 10. Consultations chez un médecin spécialiste

En 2018, au sein de la Communauté Germanophone, 67,3% de la population a rapporté avoir consulté un médecin spécialiste au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Ce taux est plus élevé que la moyenne belge (54,7%), et après standardisation pour l'âge et le sexe, il est aussi significativement plus élevé que celui de toutes les provinces du pays (y compris la province de Liège sans la Communauté Germanophone).

Le pourcentage de personnes ayant consulté un médecin spécialiste est significativement plus élevé parmi les femmes (73,2%) que parmi les hommes (61,0%), et plus élevé chez personnes ayant 65 ans et plus (76,3%) que parmi les groupes d'âges plus jeunes (taux variant entre 64,3% et 66,6%). Après standardisation pour l'âge et le sexe, ce taux est significativement plus élevé chez les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (68,2%) que parmi celles n'ayant pas de diplôme ou ayant tout au plus un diplôme de l'enseignement primaire (62,2%).

Enfin, on n'observe dans la Communauté Germanophone aucune augmentation significative du pourcentage de personnes ayant consulté un médecin spécialiste depuis 2001.

**Tableau B 204. Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

SP01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	47,6	(45,7-49,5)	48,1	(46,3-50,0)	5585
	<b>Femme</b>	61,5	(59,7-63,3)	61,6	(59,7-63,4)	6019
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	46,1	(43,5-48,8)	46,4	(43,7-49,1)	2914
	<b>25 - 44</b>	50,4	(47,8-52,9)	50,6	(48,0-53,1)	2915
	<b>45 - 64</b>	58,9	(56,5-61,3)	59,1	(56,7-61,5)	3392
	<b>65 +</b>	67,9	(65,3-70,4)	67,5	(64,8-70,0)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	53,4	(48,1-58,6)	47,3	(41,8-52,8)	810
	<b>Secondaire inférieur</b>	51,8	(47,9-55,7)	48,0	(44,0-52,0)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	52,4	(49,7-55,0)	53,1	(50,5-55,8)	3401
	<b>Enseignement supérieur</b>	57,1	(55,1-59,0)	59,0	(57,1-61,0)	5751
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	51,9	(48,1-55,8)	52,1	(48,2-56,1)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	53,4	(48,2-58,7)	53,7	(48,2-59,0)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	52,2	(48,3-56,1)	51,2	(47,2-55,1)	1074
	<b>Flandre Orientale</b>	53,7	(49,5-57,9)	53,9	(49,5-58,1)	947
	<b>Limbourg</b>	53,9	(47,4-60,3)	53,8	(47,3-60,2)	425
	<b>Bruxelles</b>	58,0	(55,9-60,2)	60,0	(57,8-62,2)	3097
	<b>Brabant Wallon</b>	60,6	(53,6-67,5)	61,4	(54,0-68,3)	361
	<b>Hainaut</b>	55,0	(51,2-58,9)	55,8	(51,9-59,6)	1119
	<b>Liège</b>	60,9	(56,2-65,5)	61,5	(56,6-66,2)	703
	<b>Luxembourg</b>	57,4	(51,7-63,2)	58,6	(52,8-64,1)	591
	<b>Namur</b>	45,2	(40,0-50,4)	45,1	(39,9-50,4)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	67,3	(63,7-70,9)	67,7	(63,9-71,4)	928
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	48,0	(46,5-49,6)	49,2	(47,6-50,8)	9369
	<b>2001</b>	50,4	(49,0-51,8)	50,9	(49,4-52,3)	10742
	<b>2004</b>	50,4	(49,0-51,9)	51,0	(49,5-52,4)	11582
	<b>2008</b>	48,4	(47,0-49,8)	48,6	(47,2-50,1)	11046
	<b>2013</b>	46,7	(45,2-48,1)	46,8	(45,3-48,3)	10820
	<b>2018</b>	54,7	(53,3-56,1)	55,0	(53,6-56,4)	11604

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 205. Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

SP01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	61,0	(56,0-66,0)	61,3	(56,3-66,2)	456
	<b>Femme</b>	73,2	(68,5-78,0)	73,2	(68,2-77,7)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	64,3	(56,7-71,8)	64,7	(56,7-71,9)	216
	<b>25 - 44</b>	64,5	(56,8-72,3)	64,8	(56,6-72,2)	185
	<b>45 - 64</b>	66,6	(60,5-72,7)	66,9	(60,5-72,8)	296
	<b>65 +</b>	76,3	(70,5-82,0)	76,1	(69,8-81,5)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	62,2	(49,2-75,1)	53,2	(36,6-69,1)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	69,0	(58,9-79,1)	66,5	(55,1-76,3)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	67,0	(60,6-73,4)	68,5	(61,8-74,4)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	68,2	(62,3-74,0)	70,7	(64,8-76,0)	390
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	49,2	(41,3-57,2)	49,8	(41,9-57,8)	266
	<b>2001</b>	59,3	(52,2-66,5)	59,7	(52,4-66,6)	261
	<b>2004</b>	57,6	(49,8-65,4)	57,8	(49,8-65,4)	248
	<b>2008</b>	66,6	(58,3-74,8)	66,0	(57,2-73,9)	235
	<b>2013</b>	64,0	(58,2-69,8)	64,0	(58,1-69,6)	306
	<b>2018</b>	67,3	(63,7-70,9)	67,5	(63,8-71,1)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 11. Consultations chez un dentiste

En 2018, au sein de la Communauté Germanophone, 73,9% de la population âgée de deux ans et plus a rapporté avoir consulté un dentiste au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Ce taux est plus élevé que la moyenne belge (67,7%), et après standardisation pour l'âge et le sexe, il est aussi significativement plus élevé que celui de la plupart des provinces du pays (y compris la province de Liège sans la Communauté Germanophone).

Il n'y a pas de différence selon le sexe dans la proportion de personnes ayant rapporté avoir consulté un dentiste au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête. Par contre, cette proportion est moins élevée chez les personnes de 65 ans et plus que parmi les groupes plus jeunes. Ce taux est aussi significativement plus élevé parmi les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (82,7%) que parmi celles n'ayant pas de diplôme ou ayant tout au plus un diplôme de l'enseignement primaire (37,6%), et la différence est significative après standardisation pour l'âge et le sexe. Enfin, on observe en Communauté Germanophone une augmentation évidente et significative du pourcentage de personnes ayant consulté un dentiste entre 2001 (50,5%) et 2018 (75,2%).

Le pourcentage de personnes âgées de deux ans et plus n'ayant jamais eu une consultation avec un dentiste est nettement moins élevé en Communauté Germanophone (0,3%) par rapport à toutes les autres provinces belges et à Bruxelles (taux variant entre 2,2% et 7,7%). Entre 2013 et 2018 ce taux a fort diminué de 2,3% à 0,3%.

**Tableau B 206. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

DC01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	65,7	(63,9-67,5)	65,5	(63,6-67,4)	5503
	<b>Femme</b>	69,6	(67,9-71,3)	70,3	(68,5-72,0)	5923
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>2 - 24</b>	74,2	(71,6-76,7)	74,3	(71,7-76,8)	2735
	<b>25 - 44</b>	67,4	(64,8-70,0)	67,5	(64,9-70,0)	2915
	<b>45 - 64</b>	70,7	(68,5-73,0)	70,8	(68,5-73,1)	3393
	<b>65 +</b>	53,9	(51,0-56,7)	53,6	(50,7-56,4)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	40,1	(34,7-45,6)	43,3	(37,6-49,2)	798
	<b>Secondaire inférieur</b>	50,9	(46,8-55,0)	52,7	(48,4-57,0)	1420
	<b>Secondaire supérieur</b>	62,9	(60,2-65,5)	62,9	(60,2-65,5)	3354
	<b>Enseignement supérieur</b>	78,1	(76,4-79,9)	77,9	(76,1-79,6)	5648
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	75,0	(71,7-78,4)	75,7	(72,2-78,9)	1123
	<b>Brabant Flamand</b>	75,7	(71,3-80,1)	76,2	(71,5-80,3)	693
	<b>Flandre Occidentale</b>	68,3	(64,3-72,3)	69,7	(65,6-73,6)	1061
	<b>Flandre Orientale</b>	67,4	(63,0-71,9)	68,0	(63,3-72,3)	932
	<b>Limbourg</b>	71,9	(65,8-78,0)	72,9	(66,6-78,4)	420
	<b>Bruxelles</b>	63,4	(61,1-65,6)	62,7	(60,3-65,0)	3033
	<b>Brabant Wallon</b>	61,2	(53,4-69,0)	61,2	(53,1-68,8)	355
	<b>Hainaut</b>	59,1	(54,8-63,4)	58,8	(54,4-63,1)	1109
	<b>Liège</b>	65,9	(60,8-71,0)	66,0	(60,7-71,0)	695
	<b>Luxembourg</b>	60,8	(54,9-66,6)	60,6	(54,6-66,2)	579
	<b>Namur</b>	63,9	(58,0-69,7)	64,3	(58,4-69,8)	506
	<b>Communauté Germanophone</b>	73,9	(70,2-77,6)	74,3	(70,5-77,8)	920
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	50,1	(48,3-51,8)	48,1	(46,3-49,9)	9316
	<b>2001</b>	49,1	(47,6-50,7)	48,2	(46,6-49,7)	10539
	<b>2004</b>	50,6	(48,9-52,2)	49,5	(47,8-51,2)	11189
	<b>2008</b>	59,6	(58,0-61,2)	59,5	(57,9-61,1)	10869
	<b>2013</b>	61,6	(60,0-63,2)	61,6	(59,9-63,2)	10567
	<b>2018</b>	67,7	(66,3-69,1)	68,1	(66,6-69,5)	11426

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 207. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

DC01_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	73,4	(68,6-78,3)	73,8	(68,3-78,6)	450
	<b>Femme</b>	74,3	(69,7-78,9)	75,4	(70,5-79,8)	470
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>2 - 24</b>	81,2	(74,9-87,4)	81,2	(74,1-86,6)	208
	<b>25 - 44</b>	75,0	(68,0-82,0)	75,0	(67,5-81,3)	185
	<b>45 - 64</b>	78,4	(72,9-83,9)	78,4	(72,4-83,4)	296
	<b>65 +</b>	54,8	(47,1-62,5)	54,7	(47,0-62,2)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	37,6	(21,7-53,4)	45,2	(28,3-63,3)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	64,2	(53,9-74,6)	66,7	(55,6-76,2)	145
	<b>Secondaire supérieur</b>	74,8	(67,9-81,8)	74,2	(66,5-80,7)	252
	<b>Enseignement supérieur</b>	82,7	(77,8-87,5)	81,8	(76,2-86,2)	386
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	60,5	(52,2-68,8)	56,9	(48,3-65,1)	266
	<b>2001</b>	52,0	(44,0-59,9)	50,5	(42,7-58,3)	264
	<b>2004</b>	53,1	(44,0-62,2)	51,9	(43,4-60,3)	246
	<b>2008</b>	67,8	(59,9-75,6)	69,5	(61,3-76,7)	240
	<b>2013</b>	71,6	(63,8-79,4)	73,1	(64,6-80,3)	295
	<b>2018</b>	73,9	(70,2-77,6)	75,2	(71,2-78,8)	920

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 208. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un dentiste, Enquête de santé 2018 – Belgique**

DC01_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,6	(3,8-5,3)	3,4	(2,8-4,1)	5503
	<b>Femme</b>	3,5	(2,7-4,2)	2,6	(2,1-3,2)	5923
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>2 - 24</b>	9,4	(7,7-11,1)	9,3	(7,7-11,1)	2735
	<b>25 - 44</b>	1,6	(1,1-2,1)	1,6	(1,1-2,1)	2915
	<b>45 - 64</b>	1,6	(1,0-2,2)	1,6	(1,1-2,3)	3393
	<b>65 +</b>	2,9	(1,8-3,9)	2,9	(2,0-4,1)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	9,1	(6,4-11,9)	8,2	(5,8-11,5)	798
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,1	(2,6-5,5)	3,5	(2,4-5,2)	1420
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,8	(3,8-5,8)	3,5	(2,7-4,4)	3354
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,8	(2,1-3,6)	1,9	(1,5-2,5)	5648
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	2,8	(1,4-4,3)	2,1	(1,2-3,5)	1123
	<b>Brabant Flamand</b>	3,2	(1,3-5,1)	2,3	(1,3-4,1)	693
	<b>Flandre Occidentale</b>	3,7	(2,4-5,1)	2,9	(1,9-4,3)	1061
	<b>Flandre Orientale</b>	3,4	(1,7-5,1)	2,5	(1,5-4,2)	932
	<b>Limbourg</b>	3,6	(0,9-6,3)	2,7	(1,2-5,8)	420
	<b>Bruxelles</b>	7,7	(6,5-8,8)	5,7	(4,7-7,0)	3033
	<b>Brabant Wallon</b>	2,9	(0,9-5,0)	2,1	(1,0-4,2)	355
	<b>Hainaut</b>	4,2	(2,7-5,8)	3,1	(2,1-4,5)	1109
	<b>Liège</b>	5,1	(2,9-7,4)	3,7	(2,4-5,9)	695
	<b>Luxembourg</b>	3,6	(1,5-5,6)	2,5	(1,4-4,4)	579
	<b>Namur</b>	2,2	(0,6-3,9)	1,6	(0,7-3,3)	506
	<b>Communauté Germanophone</b>	0,3	(0,0-0,7)	0,2	(0,1-0,7)	920
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	4,5	(3,9-5,1)	2,6	(2,3-3,0)	9316
	<b>2001</b>	5,9	(5,3-6,6)	3,5	(3,0-3,9)	10539
	<b>2004</b>	5,4	(4,7-6,1)	3,0	(2,6-3,5)	11189
	<b>2008</b>	4,6	(3,9-5,2)	2,7	(2,3-3,1)	10869
	<b>2013</b>	3,9	(3,3-4,5)	2,2	(1,9-2,6)	10567
	<b>2018</b>	4,0	(3,5-4,6)	2,3	(1,9-2,7)	11426

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 209. Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un dentiste, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

DC01_3		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	0,2	(0,0-0,5)	0,0	(0,0-0,0)	450
	<b>Femme</b>	0,5	(0,0-1,1)	0,0	(0,0-0,0)	470
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>2 - 24</b>	1,2	(0,0-2,5)	1,0	(0,3-3,4)	208
	<b>25 - 44</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	185
	<b>45 - 64</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	296
	<b>65 +</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	145
	<b>Secondaire supérieur</b>	0,4	(0,0-1,3)	0,0	(0,0-0,0)	252
	<b>Enseignement supérieur</b>	0,4	(0,0-1,1)	0,0	(0,0-0,0)	386
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	2,6	(0,0-5,1)	0,1	(0,0-0,3)	266
	<b>2001</b>	4,2	(0,6-7,9)	0,1	(0,0-0,4)	264
	<b>2004</b>	4,7	(1,3-8,1)	0,2	(0,1-0,4)	246
	<b>2008</b>	2,9	(0,0-6,3)	0,1	(0,0-0,3)	240
	<b>2013</b>	2,3	(0,0-5,1)	0,1	(0,0-0,4)	295
	<b>2018</b>	0,3	(0,0-0,7)	0,0	(0,0-0,0)	920

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 12. Contacts avec des services paramédicaux

Les services paramédicaux apportent une contribution importante à notre système de soins de santé. Le législateur désigne les professions paramédicales comme « l'exécution habituelle d'actes techniques liés à l'établissement d'un diagnostic ou à la réalisation d'un traitement ». Ce rapport de l'enquête de santé 2018 se penche sur le recours, au sein de la population, à trois types de prestations paramédicales : la kinésithérapie, la diététique et la psychologie, psychothérapie ou psychiatrie. Bien que la psychiatrie ne soit pas une profession paramédicale, elle a été intégrée aux côtés de la psychologie et de la psychothérapie dans le questionnaire, afin de se conformer à l'enquête de santé européenne (EHIS) dirigée par Eurostat. Cet ajout rend impossible une comparaison des chiffres actuels avec ceux des années d'enquête précédentes.

### 12.1. CONSULTATION CHEZ UN/E KINÉTHÉRAPEUTE

En 2018, en Communauté Germanophone, 24,5% de la population a consulté un/e kinésithérapeute au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Par contre, il y a une différence par rapport à l'âge : le pourcentage de la population qui a consulté un/e kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois est significativement moins élevé chez les 0-24 ans (11,8%) que chez les groupes plus âgés (taux variant entre 27,8% à 31,4%).

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui ont consulté un/e kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois :

- n'est pas différent de celui observé dans les autres provinces belges ;
- est significativement plus élevé en 2018 qu'en 1997 (8,2%), mais il n'y a pas de différence par rapport aux autres années d'enquête.

### 12.2. CONSULTATION CHEZ UN/E DIÉTICIEN(NE)

En Communauté Germanophone en 2018, 2,6% de la population a consulté un/e diététicien(ne) au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, ni en fonction de l'âge ou du niveau d'éducation (mais la proportion chez les personnes ayant un diplôme d'études primaires ou n'ayant pas de diplôme est 0,0%).

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui ont consulté un/e diététicien(ne) au cours des 12 derniers mois :

- est significativement plus bas que dans le reste de la province de Liège (8,2%) ;
- est resté stable depuis 1997 (2,3%).

### 12.3. CONSULTATION CHEZ UN/E PSYCHOLOGUE, PSYCHOTHÉRAPEUTE OU PSYCHIATRE

En Communauté Germanophone en 2018, 5,1% de la population a consulté un/e psychologue, psychothérapeute ou psychiatre au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Le pourcentage de personnes qui ont consulté un/e psychologue, psychothérapeute ou psychiatre au cours des 12 derniers mois est

significativement plus élevé chez les 25-44 ans (8,9%) que chez les personnes de 65 ans et plus. Il n'y a pas de différence significative à ce sujet en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes qui ont consulté un/e psychologue, psychothérapeute ou psychiatre au cours des 12 derniers mois est significativement moins élevé en Communauté Germanophone que dans les provinces de Flandre Orientale (9,3%), du Limbourg (8,2%), de Bruxelles (11,2%), du Hainaut (9,7%) et du reste de Liège (12,1%).

**Tableau B 210. Pourcentage de la population qui a consulté un/e kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

PM01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	17,6	(16,2-19,0)	16,9	(15,4-18,4)	5587
	<b>Femme</b>	24,8	(23,3-26,4)	23,6	(22,0-25,2)	6022
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	10,5	(8,8-12,2)	10,4	(8,8-12,2)	2917
	<b>25 - 44</b>	22,6	(20,5-24,8)	22,5	(20,4-24,8)	2916
	<b>45 - 64</b>	26,8	(24,6-28,9)	26,6	(24,5-28,8)	3393
	<b>65 +</b>	28,3	(25,8-30,8)	27,6	(25,2-30,1)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	19,4	(15,6-23,2)	15,5	(12,5-19,0)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	19,0	(16,2-21,8)	15,7	(13,4-18,3)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	20,6	(18,6-22,7)	19,6	(17,5-21,8)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	22,4	(20,8-24,0)	22,0	(20,4-23,7)	5754
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	22,1	(19,2-24,9)	20,8	(18,1-23,7)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	22,4	(18,2-26,5)	21,2	(17,4-25,5)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	22,3	(19,2-25,5)	20,4	(17,5-23,6)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	21,7	(18,4-25,0)	20,3	(17,2-23,8)	946
	<b>Limbourg</b>	21,6	(16,4-26,9)	20,3	(15,4-26,2)	425
	<b>Bruxelles</b>	19,1	(17,5-20,7)	18,6	(17,1-20,3)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	25,9	(19,9-31,9)	25,2	(19,8-31,5)	361
	<b>Hainaut</b>	18,8	(15,8-21,8)	17,8	(15,0-21,0)	1119
	<b>Liège</b>	22,6	(18,5-26,7)	21,4	(17,6-25,8)	704
	<b>Luxembourg</b>	21,4	(17,1-25,7)	20,8	(16,8-25,5)	593
	<b>Namur</b>	17,6	(13,6-21,6)	16,5	(13,1-20,6)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	24,5	(21,1-27,9)	23,0	(19,8-26,5)	928
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	14,5	(13,4-15,6)	14,1	(13,1-15,3)	10124
	<b>2001</b>	13,2	(12,3-14,0)	12,6	(11,7-13,4)	12037
	<b>2004</b>	13,0	(12,1-13,9)	12,4	(11,6-13,3)	12862
	<b>2008</b>	15,2	(14,2-16,1)	14,4	(13,5-15,4)	11188
	<b>2013</b>	15,7	(14,7-16,7)	14,9	(13,9-16,0)	10824
	<b>2018</b>	21,3	(20,2-22,4)	20,4	(19,3-21,5)	11609

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 211. Pourcentage de la population qui a consulté un/e kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PM01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	20,4	(16,1-24,7)	19,2	(15,4-23,6)	456
	<b>Femme</b>	28,4	(23,4-33,5)	26,9	(21,9-32,7)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	11,8	(6,8-16,9)	11,7	(7,7-17,5)	216
	<b>25 - 44</b>	27,8	(20,6-35,0)	27,6	(21,1-35,3)	185
	<b>45 - 64</b>	31,4	(25,1-37,7)	31,3	(25,3-38,0)	296
	<b>65 +</b>	28,0	(21,5-34,6)	27,4	(21,4-34,3)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	25,7	(12,8-38,7)	20,8	(10,9-35,9)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	28,7	(19,3-38,2)	24,0	(16,3-33,8)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	26,7	(19,6-33,8)	25,6	(19,1-33,3)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	21,6	(17,0-26,2)	21,6	(17,2-26,9)	390
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	8,2	(4,5-11,8)	7,6	(4,9-11,8)	287
	<b>2001</b>	15,7	(9,6-21,8)	15,6	(10,4-22,7)	292
	<b>2004</b>	17,8	(12,6-22,9)	17,4	(13,0-22,9)	271
	<b>2008</b>	23,8	(17,1-30,6)	23,2	(17,0-30,9)	241
	<b>2013</b>	17,9	(12,2-23,6)	17,6	(12,7-23,8)	305
	<b>2018</b>	24,5	(21,1-27,9)	24,0	(20,8-27,6)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 212. Pourcentage de la population qui a consulté un/e diététicien(ne) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

PM02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,7	(2,9-4,5)	3,5	(2,7-4,4)	5587
	<b>Femme</b>	5,6	(4,8-6,4)	5,2	(4,5-6,0)	6023
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	2,2	(1,4-3,1)	2,2	(1,5-3,3)	2917
	<b>25 - 44</b>	5,5	(4,3-6,7)	5,4	(4,4-6,8)	2916
	<b>45 - 64</b>	6,5	(5,2-7,7)	6,4	(5,2-7,7)	3394
	<b>65 +</b>	4,5	(3,4-5,7)	4,3	(3,4-5,6)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,0	(0,8-3,1)	1,7	(1,0-3,2)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,4	(3,1-5,7)	3,9	(2,8-5,3)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,1	(4,0-6,2)	4,7	(3,7-5,9)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,7	(3,9-5,6)	4,4	(3,6-5,3)	5755
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	3,7	(2,6-4,8)	3,4	(2,4-4,6)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	2,9	(1,3-4,5)	2,6	(1,5-4,6)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	4,5	(3,2-5,8)	4,0	(3,0-5,5)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	4,4	(2,8-5,9)	4,0	(2,8-5,6)	946
	<b>Limbourg</b>	6,3	(3,2-9,4)	5,8	(3,5-9,6)	425
	<b>Bruxelles</b>	4,3	(3,5-5,1)	4,0	(3,3-4,8)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	4,7	(1,5-7,9)	4,4	(2,1-8,6)	361
	<b>Hainaut</b>	4,8	(3,2-6,5)	4,4	(3,1-6,2)	1119
	<b>Liège</b>	8,2	(5,4-11,0)	7,6	(5,2-10,8)	704
	<b>Luxembourg</b>	3,7	(1,8-5,6)	3,5	(2,1-5,8)	594
	<b>Namur</b>	3,2	(1,5-4,9)	2,9	(1,7-5,0)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	2,6	(1,4-3,7)	2,3	(1,4-3,6)	928
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	1,7	(1,3-2,1)	1,5	(1,2-1,9)	10118
	<b>2001</b>	1,7	(1,4-2,1)	1,6	(1,3-1,9)	12015
	<b>2004</b>	2,4	(2,0-2,7)	2,1	(1,8-2,5)	12852
	<b>2008</b>	3,0	(2,5-3,4)	2,7	(2,3-3,1)	11202
	<b>2013</b>	3,3	(2,8-3,8)	3,0	(2,6-3,4)	10825
	<b>2018</b>	4,6	(4,1-5,2)	4,2	(3,7-4,8)	11610

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 213. Pourcentage de la population qui a consulté un/e diététicien(ne) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

PM02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,6	(0,5-2,7)	1,5	(0,8-2,8)	456
	<b>Femme</b>	3,5	(1,7-5,3)	3,1	(1,7-5,6)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	1,4	(0,0-3,2)	1,3	(0,4-4,4)	216
	<b>25 - 44</b>	2,0	(0,1-3,8)	1,9	(0,7-4,5)	185
	<b>45 - 64</b>	3,8	(1,4-6,2)	3,6	(1,9-6,8)	296
	<b>65 +</b>	2,9	(0,7-5,2)	2,6	(1,1-5,9)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	1,8	(0,0-4,7)	1,0	(0,2-5,2)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,3	(1,1-5,6)	2,7	(1,2-6,0)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,0	(0,9-5,0)	2,8	(1,4-5,4)	390
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	2,3	(0,2-4,3)	1,9	(0,8-4,7)	287
	<b>2001</b>	1,5	(0,0-3,3)	1,4	(0,4-4,3)	292
	<b>2004</b>	1,7	(0,0-3,7)	1,5	(0,4-4,8)	270
	<b>2008</b>	1,1	(0,0-2,5)	1,0	(0,3-3,3)	241
	<b>2013</b>	2,9	(0,9-4,9)	2,6	(1,3-5,2)	305
	<b>2018</b>	2,6	(1,4-3,7)	2,3	(1,4-3,7)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 214. Pourcentage de la population qui a consulté un psychologue psychothérapeute ou psychiatre au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique

PM03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,9	(6,9-8,9)	7,2	(6,3-8,2)	5587
	<b>Femme</b>	10,4	(9,4-11,5)	9,9	(8,9-11,0)	6021
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	8,9	(7,4-10,4)	8,8	(7,4-10,5)	2917
	<b>25 - 44</b>	12,7	(10,9-14,5)	12,6	(11,0-14,5)	2915
	<b>45 - 64</b>	9,9	(8,6-11,2)	9,8	(8,6-11,2)	3393
	<b>65 +</b>	3,7	(2,7-4,7)	3,6	(2,7-4,7)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,0	(4,6-9,4)	8,6	(6,1-12,0)	810
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,1	(6,1-10,1)	8,6	(6,7-11,0)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,6	(7,2-10,0)	7,9	(6,6-9,3)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,0	(8,8-11,2)	8,8	(7,7-9,9)	5754
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	8,7	(6,5-11,0)	8,1	(6,2-10,6)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	7,5	(5,2-9,9)	7,0	(5,1-9,5)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	7,4	(5,4-9,4)	7,1	(5,3-9,3)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	9,3	(6,9-11,7)	8,6	(6,6-11,2)	946
	<b>Limbourg</b>	8,2	(4,9-11,5)	7,7	(5,1-11,5)	425
	<b>Bruxelles</b>	11,2	(9,8-12,6)	9,9	(8,6-11,3)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	9,8	(5,5-14,2)	9,1	(5,7-14,3)	361
	<b>Hainaut</b>	9,7	(7,8-11,6)	8,9	(7,2-10,9)	1119
	<b>Liège</b>	12,1	(8,6-15,6)	11,3	(8,4-15,0)	704
	<b>Luxembourg</b>	6,0	(3,5-8,5)	5,5	(3,6-8,4)	592
	<b>Namur</b>	7,7	(5,0-10,4)	7,2	(5,1-10,2)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,1	(3,4-6,7)	4,7	(3,4-6,5)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	9,2	(8,4-10,0)			11608

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 215. Pourcentage de la population qui a consulté un psychologue psychothérapeute ou psychiatre au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

PM03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,4	(2,4-6,4)	3,9	(2,5-6,2)	456
	<b>Femme</b>	5,7	(3,1-8,4)	5,2	(3,3-8,2)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	4,0	(1,4-6,6)	4,0	(2,0-7,5)	216
	<b>25 - 44</b>	8,9	(3,8-14,0)	8,8	(4,9-15,2)	185
	<b>45 - 64</b>	5,2	(2,5-8,0)	5,2	(3,1-8,7)	296
	<b>65 +</b>	1,9	(0,2-3,5)	1,8	(0,7-4,4)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	4,1	(0,0-10,2)	5,3	(1,2-20,5)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	7,2	(1,5-12,9)	7,5	(3,2-16,6)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,2	(3,0-9,5)	4,9	(2,7-8,9)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,6	(1,5-5,8)	2,8	(1,5-5,2)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	5,1	(3,4-6,7)			928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

### 13. Contacts avec des prestataires de thérapies non-conventionnelles

Contrairement à la médecine conventionnelle, la médecine non conventionnelle est un traitement pour lequel aucune preuve scientifique d'efficacité médicale n'a jamais été fournie. Dans ce rapport, il est question de consulter un prestataire de thérapie non conventionnelle, et en particulier les quatre types déterminés dans la "loi Colla" : homéopathie, acupuncture, chiropraxie et ostéopathie. En 2014, certains aspects de cette loi sont entrés en vigueur. Seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes peuvent porter le titre complémentaire d'homéopathe. Pour les autres pratiques d'une médecine non conventionnelle par un non-médecin, celles-ci constituent encore à ce jour un exercice illégal de la médecine.

En Communauté Germanophone en 2018, 18,9% de la population a consulté un/e praticien/ne de médecine non-conventionnelle au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

Il n'y a pas de différence significative selon le sexe dans le pourcentage de personnes qui a consulté un/e praticien/ne de médecine non-conventionnelle, mais on trouve une différence significative selon l'âge : ce taux est plus élevé chez les 45-64 ans (27,3%) que chez les 0-24 ans (14,4%).

Concernant le niveau d'éducation, les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (22,9%) consultent significativement plus souvent un/e praticien/ne de médecine non-conventionnelle que les personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur (7,8%).

Le pourcentage de personnes qui ont consulté un/e praticien/ne de médecine non-conventionnelle en Communauté Germanophone :

- est significativement plus élevé par rapport aux provinces d'Anvers (9,9%), du Brabant Flamand (6,6%), de Flandre Occidentale (12,4%), de Flandre Orientale (11,6%), du Limbourg (6,6%), de Bruxelles (11,2%), du Hainaut (11,9%) et de Namur (9,7%) ;
- est resté stable entre 2001 et 2018.

**Tableau B 216. Pourcentage de la population qui a consulté un/e prestataire de thérapie non-conventionnelle au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

NC_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	9,6	(8,5-10,7)	8,9	(7,9-10,0)	5588
	<b>Femme</b>	12,8	(11,6-14,0)	12,1	(10,9-13,5)	6023
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	6,5	(5,1-7,8)	6,4	(5,2-7,9)	2917
	<b>25 - 44</b>	15,6	(13,7-17,6)	15,6	(13,7-17,6)	2916
	<b>45 - 64</b>	14,5	(12,8-16,2)	14,4	(12,8-16,2)	3395
	<b>65 +</b>	7,7	(6,3-9,0)	7,4	(6,2-8,9)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,6	(1,3-3,8)	2,6	(1,6-4,2)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,9	(3,4-6,4)	4,6	(3,3-6,3)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,8	(7,3-10,2)	8,2	(7,0-9,6)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	15,4	(13,9-16,9)	14,4	(12,9-16,0)	5755
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	9,9	(7,5-12,3)	9,2	(7,2-11,7)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	6,6	(4,6-8,6)	6,1	(4,5-8,3)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	12,4	(9,8-15,0)	11,7	(9,4-14,4)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	11,6	(9,0-14,2)	10,7	(8,5-13,5)	947
	<b>Limbourg</b>	6,6	(3,9-9,4)	6,2	(4,1-9,3)	425
	<b>Bruxelles</b>	11,2	(9,8-12,5)	10,1	(8,9-11,5)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	18,4	(11,6-25,2)	17,7	(11,9-25,3)	361
	<b>Hainaut</b>	11,9	(9,1-14,8)	11,0	(8,5-14,1)	1119
	<b>Liège</b>	15,5	(11,4-19,5)	14,6	(11,1-18,9)	704
	<b>Luxembourg</b>	13,3	(9,2-17,4)	12,7	(9,2-17,3)	594
	<b>Namur</b>	9,7	(6,7-12,7)	9,1	(6,6-12,5)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	18,9	(15,6-22,2)	17,8	(14,8-21,4)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	10,3	(9,4-11,2)	9,6	(8,8-10,5)	12111
	<b>2004</b>	10,5	(9,5-11,5)	9,8	(8,9-10,8)	12945
	<b>2008</b>	10,8	(9,9-11,8)	10,2	(9,3-11,1)	11254
	<b>2013</b>	8,3	(7,4-9,1)	7,8	(7,0-8,6)	10829
	<b>2018</b>	11,2	(10,3-12,1)	10,7	(9,8-11,6)	11611

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 217. Pourcentage de la population qui a consulté un/e prestataire de thérapie non-conventionnelle au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

NC_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,4	(12,3-20,5)	14,9	(11,4-19,3)	456
	<b>Femme</b>	21,2	(16,8-25,7)	20,0	(15,9-24,7)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	14,4	(8,6-20,2)	14,3	(9,4-21,2)	216
	<b>25 - 44</b>	21,8	(14,9-28,7)	21,7	(15,6-29,3)	185
	<b>45 - 64</b>	27,3	(21,0-33,6)	27,2	(21,3-33,9)	296
	<b>65 +</b>	8,4	(4,6-12,2)	8,2	(5,1-12,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,7	(0,8-12,7)	8,0	(3,2-18,3)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,1	(3,9-14,2)	7,8	(4,2-14,2)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	21,9	(15,0-28,8)	19,9	(14,2-27,3)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	22,9	(17,2-28,5)	21,2	(16,3-27,1)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	14,7	(8,4-21,0)	13,6	(8,7-20,6)	294
	<b>2004</b>	12,7	(6,9-18,6)	11,6	(7,2-18,2)	271
	<b>2008</b>	16,5	(9,9-23,1)	15,8	(10,4-23,4)	241
	<b>2013</b>	14,7	(9,1-20,2)	13,6	(9,1-19,9)	306
	<b>2018</b>	18,9	(15,6-22,2)	17,7	(14,7-21,2)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 14. Hospitalisation

Les évolutions technologiques dans le domaine médical ont permis des changements dans la prise en charge hospitalière des patients, avec le développement des alternatives à l'hospitalisation classique. Ainsi, ces dernières années, on tend à réaliser un nombre croissant d'interventions dans le cadre d'une hospitalisation de jour, qui est défini comme une admission de courte durée pendant laquelle une chambre et un lit sont octroyés, mais le patient retourne chez lui le même jour, sans y passer la nuit.

Au sein de la Communauté Germanophone, autant de personnes ont déclaré avoir été admises à l'hôpital pour une hospitalisation classique (10,9%) que pour une hospitalisation de jour (9,8%), au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

Il n'y a pas de différence dans les hospitalisations classiques selon le sexe, mais bien selon l'âge. La proportion de personnes hospitalisées pour au moins une nuit augmente significativement avec l'âge : de 5,2% des 0-24 ans à un taux de 21,9% pour les 65 ans et plus. Aussi, le taux diminue significativement quand le niveau d'instruction augmente : de 24,4% parmi les personnes n'ayant pas de diplôme ou tout au plus un diplôme d'études primaires contre 7,3% parmi celles ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (7,3%). On ne trouve pas de différence notable selon la province ou l'année d'enquête.

Pour les hospitalisations de jour aussi, on ne trouve pas de différence selon le sexe. Par rapport à l'âge, la proportion de personnes hospitalisées de jour augmente de 6,4% chez les 0-24 ans à 12,7% chez les 65 ans et plus, mais ces différences ne sont pas statistiquement significatives. Les hospitalisations de jour varient selon le niveau d'instruction avec une proportion moins élevée de personnes hospitalisées de jour chez les moins diplômées (7,2% des diplômées de l'enseignement supérieur contre 16,2% des diplômées du secondaire inférieur). Le pourcentage de personnes qui rapportent avoir été admises à l'hôpital pour une hospitalisation de jour a augmenté entre 2013 (5,7%) et 2018 (9,8%). Finalement, on ne trouve pas de différence notable selon la province.

**Tableau B 218. Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pendant au moins une nuit au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

HO01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,1	(9,0-11,2)	9,7	(8,7-10,9)	5586
	<b>Femme</b>	10,6	(9,5-11,6)	9,7	(8,7-10,8)	6023
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	6,6	(5,3-8,0)	6,6	(5,4-8,1)	2917
	<b>25 - 44</b>	7,7	(6,4-9,0)	7,7	(6,5-9,1)	2915
	<b>45 - 64</b>	10,8	(9,4-12,2)	10,8	(9,4-12,2)	3394
	<b>65 +</b>	19,2	(17,1-21,4)	19,3	(17,2-21,5)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	17,0	(13,6-20,5)	12,6	(9,9-15,9)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	13,0	(10,6-15,5)	10,5	(8,6-12,8)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	12,4	(10,9-14,0)	12,0	(10,5-13,6)	3401
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,6	(6,6-8,5)	7,7	(6,8-8,8)	5755
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	10,9	(8,7-13,1)	10,2	(8,3-12,5)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	10,3	(7,4-13,1)	9,6	(7,3-12,6)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	12,0	(9,8-14,2)	10,6	(8,7-12,8)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	10,4	(8,2-12,6)	9,7	(7,8-12,0)	946
	<b>Limbourg</b>	12,2	(8,6-15,9)	11,2	(8,2-15,1)	425
	<b>Bruxelles</b>	8,4	(7,3-9,5)	8,5	(7,5-9,7)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	11,3	(7,7-14,9)	10,7	(7,7-14,8)	361
	<b>Hainaut</b>	9,6	(7,4-11,7)	9,2	(7,2-11,6)	1119
	<b>Liège</b>	10,5	(7,6-13,4)	9,9	(7,4-13,1)	703
	<b>Luxembourg</b>	9,6	(6,8-12,3)	9,2	(6,9-12,1)	594
	<b>Namur</b>	7,8	(5,4-10,2)	7,2	(5,3-9,7)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	10,9	(8,4-13,3)	10,1	(8,0-12,6)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	9,4	(8,7-10,2)	9,0	(8,3-9,8)	12839
	<b>2008</b>	9,7	(8,9-10,5)	9,1	(8,4-9,9)	11166
	<b>2013</b>	8,7	(8,0-9,5)	8,2	(7,5-8,9)	10804
	<b>2018</b>	10,3	(9,6-11,1)	9,6	(8,8-10,4)	11609

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 219. Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pendant au moins une nuit au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HO01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,9	(7,5-14,3)	9,9	(6,7-14,4)	456
	<b>Femme</b>	10,8	(7,7-13,9)	9,3	(6,7-12,8)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	5,2	(1,4-8,9)	5,1	(2,5-10,4)	216
	<b>25 - 44</b>	8,0	(3,4-12,6)	8,0	(4,5-13,9)	185
	<b>45 - 64</b>	11,4	(7,1-15,8)	11,4	(7,7-16,5)	296
	<b>65 +</b>	21,9	(15,7-28,2)	22,0	(16,4-28,8)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	24,4	(13,2-35,7)	16,2	(9,5-26,2)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	15,2	(8,6-21,8)	11,7	(6,9-19,3)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,1	(4,5-13,8)	9,1	(5,2-15,5)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,3	(4,3-10,2)	7,7	(5,1-11,6)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	8,6	(4,4-12,9)	7,8	(4,6-12,9)	271
	<b>2008</b>	11,7	(6,6-16,8)	9,9	(6,2-15,4)	240
	<b>2013</b>	11,7	(7,6-15,8)	10,3	(7,1-14,8)	305
	<b>2018</b>	10,9	(8,4-13,3)	9,4	(7,2-12,2)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 220. Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pour une hospitalisation de jour au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HO03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,8	(9,7-12,0)	10,7	(9,6-11,9)	5585
	<b>Femme</b>	10,7	(9,6-11,7)	10,3	(9,3-11,3)	6022
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	7,8	(6,4-9,3)	7,8	(6,5-9,4)	2917
	<b>25 - 44</b>	8,6	(7,2-10,0)	8,6	(7,3-10,1)	2915
	<b>45 - 64</b>	13,1	(11,4-14,7)	13,1	(11,5-14,8)	3394
	<b>65 +</b>	14,9	(13,0-16,9)	15,0	(13,1-17,0)	2381
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,3	(5,1-9,6)	5,8	(4,2-8,0)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	11,0	(8,8-13,2)	9,5	(7,6-11,7)	1433
	<b>Secondaire supérieur</b>	12,5	(11,0-14,1)	12,2	(10,7-13,8)	3401
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,9	(8,8-11,0)	10,1	(9,0-11,3)	5755
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	14,1	(11,7-16,5)	13,7	(11,5-16,2)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	10,8	(7,8-13,8)	10,5	(7,9-13,8)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	12,4	(10,1-14,7)	11,7	(9,6-14,1)	1074
	<b>Flandre Orientale</b>	12,4	(9,8-15,0)	12,0	(9,7-14,8)	946
	<b>Limbourg</b>	13,1	(9,3-16,8)	12,6	(9,5-16,5)	425
	<b>Bruxelles</b>	8,4	(7,3-9,4)	8,6	(7,6-9,7)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	7,6	(4,7-10,4)	7,4	(5,0-10,7)	361
	<b>Hainaut</b>	7,3	(5,5-9,0)	7,1	(5,6-9,0)	1119
	<b>Liège</b>	9,4	(6,8-12,1)	9,2	(6,9-12,2)	702
	<b>Luxembourg</b>	6,5	(4,2-8,9)	6,4	(4,5-9,1)	594
	<b>Namur</b>	10,1	(6,9-13,3)	9,8	(7,1-13,4)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	9,8	(7,6-12,1)	9,4	(7,5-11,8)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	6,8	(6,2-7,5)	6,8	(6,1-7,5)	12709
	<b>2008</b>	7,1	(6,5-7,8)	7,0	(6,4-7,7)	11162
	<b>2013</b>	7,1	(6,4-7,8)	6,9	(6,3-7,7)	10826
	<b>2018</b>	10,8	(10,0-11,5)	10,5	(9,7-11,3)	11607

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 221. Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pour une hospitalisation de jour au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

HO03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	9,7	(6,6-12,8)	9,3	(6,7-12,9)	456
	<b>Femme</b>	10,0	(6,8-13,2)	9,5	(6,7-13,3)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	6,4	(2,8-9,9)	6,4	(3,6-11,0)	216
	<b>25 - 44</b>	8,7	(3,7-13,7)	8,7	(4,9-15,1)	185
	<b>45 - 64</b>	12,1	(7,8-16,5)	12,1	(8,4-17,2)	296
	<b>65 +</b>	12,7	(7,8-17,6)	12,7	(8,5-18,4)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	10,0	(1,2-18,8)	8,8	(3,1-22,7)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	16,2	(8,3-24,1)	14,1	(8,4-22,5)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	11,4	(7,3-15,6)	11,2	(7,7-16,1)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,2	(4,3-10,1)	7,3	(4,7-11,1)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	7,0	(3,1-10,8)	7,0	(4,0-11,9)	264
	<b>2008</b>	6,4	(2,5-10,4)	6,4	(3,4-11,6)	241
	<b>2013</b>	5,7	(2,9-8,5)	5,7	(3,5-9,2)	305
	<b>2018</b>	9,8	(7,6-12,1)	9,7	(7,7-12,2)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 15. Services à domicile et d'aide à domicile

En Belgique, il existe un réseau étendu de services de soins et d'aide à domicile, Ces services répondent au vieillissement de la population.

En 2018, en Communauté Germanophone, 9,0% de la population a fait usage d'un service d'aide ou de soins à domicile au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête.

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes. Par contre, ce taux est significativement plus élevé chez les personnes de 65 ans et plus (25,2%) par rapport aux groupes d'âges plus jeunes (2,8% à 7,3%).

Concernant le niveau d'instruction, les personnes ayant un diplôme de l'enseignement primaire ou n'ayant pas de diplôme (32,6%) ont fait significativement plus souvent usage d'un service d'aide ou de soins à domicile au cours des 12 mois qui ont précédé l'enquête que les personnes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur (4,5%).

Le pourcentage de personnes qui ont fait usage d'un service d'aide ou de soins à domicile au cours des 12 derniers mois en Communauté Germanophone:

- n'est pas différent de celui observé dans les autres provinces belges ;
- est resté stable par rapport à 2013 (10,2%).

Tableau B 222. Pourcentage de la population qui a eu recours à des services de soins et d'aide à domicile au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique

HS01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,9	(7,8-10,1)	8,1	(7,0-9,5)	5586
	<b>Femme</b>	13,4	(12,1-14,6)	11,6	(10,4-13,0)	6023
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	5,3	(3,8-6,8)	5,3	(4,0-7,0)	2917
	<b>25 - 44</b>	8,8	(7,3-10,3)	8,7	(7,4-10,3)	2916
	<b>45 - 64</b>	10,2	(8,7-11,7)	10,1	(8,6-11,7)	3393
	<b>65 +</b>	25,2	(22,7-27,7)	24,6	(22,2-27,1)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	20,7	(16,5-24,9)	12,8	(10,2-16,1)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	14,2	(11,4-16,9)	9,8	(7,8-12,2)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	11,7	(9,8-13,5)	10,6	(8,8-12,6)	3401
	<b>Enseignement supérieur</b>	8,8	(7,6-10,0)	8,6	(7,4-10,0)	5755
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	9,8	(7,6-12,1)	8,5	(6,7-10,7)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	11,2	(7,6-14,9)	9,8	(6,7-14,0)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	12,0	(9,4-14,5)	9,5	(7,6-11,8)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	13,0	(10,2-15,8)	11,4	(9,0-14,4)	946
	<b>Limbourg</b>	11,7	(7,6-15,8)	9,8	(6,8-14,0)	425
	<b>Bruxelles</b>	8,2	(6,9-9,5)	7,8	(6,6-9,2)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	17,4	(10,2-24,5)	16,0	(10,1-24,5)	360
	<b>Hainaut</b>	10,8	(8,3-13,2)	9,7	(7,6-12,3)	1119
	<b>Liège</b>	13,6	(9,8-17,5)	12,1	(8,6-16,7)	704
	<b>Luxembourg</b>	10,6	(7,0-14,3)	9,6	(6,8-13,5)	594
	<b>Namur</b>	6,8	(4,0-9,6)	5,7	(3,7-8,6)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	9,0	(6,6-11,4)	7,6	(5,8-10,1)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	8,6	(7,8-9,4)	7,2	(6,4-7,9)	10824
	<b>2018</b>	11,2	(10,3-12,1)	9,4	(8,4-10,5)	11609

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 223. Pourcentage de la population qui a eu recours à des services de soins et d'aide à domicile au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HS01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,6	(4,8-10,5)	6,2	(4,0-9,4)	456
	<b>Femme</b>	10,3	(7,1-13,6)	7,9	(5,1-12,1)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	2,8	(0,1-5,5)	2,8	(1,1-7,1)	216
	<b>25 - 44</b>	7,3	(2,8-11,9)	7,3	(3,9-13,3)	185
	<b>45 - 64</b>	6,9	(3,2-10,7)	6,9	(3,9-11,8)	296
	<b>65 +</b>	23,7	(16,2-31,1)	23,3	(16,8-31,5)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	32,6	(17,8-47,5)	16,7	(9,0-29,1)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,8	(4,1-15,6)	6,3	(2,8-13,3)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,3	(3,5-11,1)	6,8	(3,9-11,7)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,5	(1,8-7,3)	4,7	(2,5-8,9)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	10,2	(5,1-15,3)	7,7	(4,7-12,5)	306
	<b>2018</b>	9,0	(6,6-11,4)	6,6	(4,5-9,5)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 16. Consommation de médicaments

En 2018, en Communauté Germanophone, 48,8% de la population déclare avoir utilisé un médicament prescrit par un médecin au cours des deux dernières semaines. Ce taux s'élève à 30,5% pour les médicaments non prescrits.

Les femmes utilisent plus souvent des médicaments (prescrits ou non) que les hommes. On observe par ailleurs une augmentation de l'utilisation des médicaments prescrits avec l'âge, alors que ce n'est pas le cas pour les médicaments non prescrits.

La consommation de médicaments prescrits est la plus élevée chez les personnes sans diplôme ou ayant tout au plus un diplôme d'études primaires (82,0%). Au fur et à mesure que le niveau d'instruction augmente, ce pourcentage diminue jusqu'à 37,9% chez les personnes les plus diplômées. Les différences socio-économiques persistent après standardisation pour l'âge et le sexe. La consommation de médicaments non prescrits ne varie pas en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent avoir utilisé des médicaments prescrits par un médecin :

- est similaire ou moins élevé à ce que l'on observe dans l'ensemble des provinces belges ainsi qu'à Bruxelles ;
- est resté stable entre 2004 et 2018.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui déclarent avoir utilisé des médicaments non prescrits :

- est plus élevé à ce que l'on observe dans la plupart des provinces belges ;
- est resté stable entre 1997 et 2018.

**Tableau B 224. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament prescrit, Enquête de santé 2018 - Belgique**

DR01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	45,9	(44,0-47,7)	47,9	(45,8-50,0)	5585
	<b>Femme</b>	57,1	(55,2-58,9)	59,2	(57,1-61,2)	6022
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	25,0	(22,8-27,2)	25,0	(22,8-27,3)	2916
	<b>25 - 44</b>	41,9	(39,3-44,5)	41,9	(39,4-44,5)	2915
	<b>45 - 64</b>	64,1	(61,8-66,5)	64,4	(62,0-66,7)	3393
	<b>65 +</b>	88,2	(86,6-89,9)	88,1	(86,4-89,7)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	69,6	(64,8-74,5)	59,3	(53,0-65,3)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	61,7	(58,1-65,4)	55,0	(50,9-59,1)	1433
	<b>Secondaire supérieur</b>	53,8	(51,3-56,3)	57,1	(54,4-59,8)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	45,5	(43,5-47,6)	50,6	(48,3-52,8)	5753
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	49,3	(45,5-53,2)	50,3	(46,1-54,5)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	45,8	(40,6-51,1)	46,2	(40,9-51,6)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	55,2	(51,3-59,0)	54,0	(49,9-58,0)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	55,4	(51,3-59,5)	57,8	(53,1-62,3)	946
	<b>Limbourg</b>	57,1	(50,8-63,4)	59,2	(52,5-65,5)	425
	<b>Bruxelles</b>	46,0	(43,9-48,1)	51,7	(49,4-54,0)	3098
	<b>Brabant Wallon</b>	55,5	(47,8-63,1)	59,3	(50,8-67,3)	361
	<b>Hainaut</b>	50,0	(45,9-54,1)	52,9	(48,8-57,0)	1119
	<b>Liège</b>	57,2	(51,9-62,5)	61,1	(55,4-66,5)	704
	<b>Luxembourg</b>	47,1	(41,3-52,9)	49,9	(43,9-56,0)	592
	<b>Namur</b>	48,9	(43,1-54,7)	49,9	(43,8-55,9)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	48,8	(44,6-53,1)	48,7	(44,3-53,2)	928
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	40,8	(39,3-42,4)	45,8	(44,1-47,5)	10156
	<b>2001</b>	47,7	(46,3-49,1)	51,1	(49,6-52,6)	12062
	<b>2004</b>	47,3	(45,9-48,8)	50,5	(48,9-52,2)	12881
	<b>2008</b>	50,7	(49,2-52,3)	54,0	(52,4-55,6)	11193
	<b>2013</b>	51,4	(49,8-52,9)	54,3	(52,6-55,9)	10821
	<b>2018</b>	51,6	(50,1-53,0)	53,9	(52,4-55,4)	11607

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 225. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament prescrit, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

DR01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	45,5	(39,8-51,1)	44,9	(38,9-51,1)	456
	<b>Femme</b>	52,0	(46,9-57,2)	51,1	(45,2-57,1)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	17,9	(11,5-24,2)	17,8	(12,3-25,1)	216
	<b>25 - 44</b>	39,8	(31,4-48,3)	39,8	(31,9-48,3)	185
	<b>45 - 64</b>	61,4	(55,1-67,6)	61,4	(55,0-67,5)	296
	<b>65 +</b>	85,3	(79,5-91,1)	85,2	(78,4-90,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	82,0	(70,2-93,8)	69,0	(50,0-83,2)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	69,1	(58,6-79,5)	58,7	(46,2-70,2)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	42,9	(34,5-51,4)	44,4	(35,6-53,6)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	37,9	(32,3-43,5)	42,7	(36,4-49,3)	390
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	32,0	(25,3-38,7)	35,6	(28,1-44,0)	294
	<b>2001</b>	43,3	(35,9-50,6)	47,0	(39,0-55,2)	293
	<b>2004</b>	50,0	(41,0-59,0)	53,4	(44,5-62,1)	271
	<b>2008</b>	49,1	(38,6-59,5)	45,8	(36,4-55,4)	241
	<b>2013</b>	51,8	(45,3-58,3)	52,7	(44,8-60,6)	306
	<b>2018</b>	48,8	(44,6-53,1)	48,4	(43,8-52,9)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 226. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament non prescrit°, Enquête de santé 2018 - Belgique**

DR04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	21,9	(20,3-23,5)	21,2	(19,7-22,9)	5585
	<b>Femme</b>	28,7	(27,1-30,3)	28,1	(26,5-29,7)	6021
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	15,2	(13,4-17,0)	15,2	(13,4-17,1)	2916
	<b>25 - 44</b>	34,2	(31,6-36,7)	34,1	(31,6-36,8)	2915
	<b>45 - 64</b>	29,0	(26,8-31,2)	28,9	(26,8-31,1)	3392
	<b>65 +</b>	23,7	(21,3-26,1)	23,2	(20,9-25,6)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	16,3	(12,7-19,8)	15,5	(12,4-19,3)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	17,6	(14,8-20,4)	16,4	(13,8-19,4)	1433
	<b>Secondaire supérieur</b>	23,9	(21,8-26,1)	23,2	(21,1-25,5)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	29,3	(27,5-31,0)	28,6	(26,8-30,5)	5752
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	26,8	(23,6-30,1)	26,0	(22,9-29,4)	1140
	<b>Brabant Flamand</b>	29,1	(24,6-33,7)	28,5	(24,2-33,3)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	23,6	(20,4-26,9)	22,7	(19,6-26,1)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	34,3	(30,4-38,2)	33,5	(29,7-37,5)	946
	<b>Limbourg</b>	22,5	(18,0-26,9)	21,8	(17,6-26,6)	425
	<b>Bruxelles</b>	27,8	(25,8-29,9)	26,7	(24,6-28,8)	3098
	<b>Brabant Wallon</b>	24,2	(18,8-29,7)	23,8	(18,8-29,5)	361
	<b>Hainaut</b>	15,2	(12,4-17,9)	14,3	(11,9-17,1)	1119
	<b>Liège</b>	27,3	(22,8-31,8)	26,6	(22,2-31,5)	704
	<b>Luxembourg</b>	22,4	(17,5-27,3)	22,0	(17,5-27,3)	592
	<b>Namur</b>	14,8	(10,7-18,9)	14,2	(10,6-18,8)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	30,5	(26,6-34,3)	29,7	(25,9-33,8)	928
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	33,2	(31,8-34,7)	32,3	(30,8-33,8)	10145
	<b>2001</b>	27,1	(25,9-28,3)	26,6	(25,4-27,8)	11961
	<b>2004</b>	24,2	(23,0-25,4)	23,6	(22,4-24,9)	12750
	<b>2008</b>	22,3	(21,0-23,6)	21,8	(20,5-23,1)	11039
	<b>2013</b>	16,7	(15,6-17,7)	16,2	(15,2-17,3)	10821
	<b>2018</b>	25,4	(24,2-26,6)	25,0	(23,8-26,2)	11606

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé,

Tableau B 227. Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament non prescrit°, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

DR04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	26,6	(21,3-31,9)	26,3	(21,4-31,8)	456
	<b>Femme</b>	34,1	(29,2-39,0)	34,0	(29,2-39,2)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	26,8	(18,7-35,0)	26,8	(19,5-35,5)	216
	<b>25 - 44</b>	33,1	(25,4-40,8)	33,0	(25,8-41,1)	185
	<b>45 - 64</b>	34,7	(28,0-41,5)	34,7	(28,1-41,8)	296
	<b>65 +</b>	25,7	(19,2-32,2)	25,2	(19,3-32,1)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	24,5	(14,0-34,9)	24,3	(15,2-36,4)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	25,2	(16,6-33,8)	24,2	(16,5-34,1)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	31,4	(23,9-39,0)	30,9	(23,9-38,9)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	31,7	(25,5-37,9)	31,7	(25,9-38,1)	390
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	25,5	(18,4-32,5)	23,9	(17,7-31,3)	294
	<b>2001</b>	30,7	(24,0-37,4)	30,4	(24,1-37,4)	290
	<b>2004</b>	21,7	(14,4-29,0)	21,1	(14,8-29,2)	269
	<b>2008</b>	24,7	(15,8-33,6)	24,4	(16,7-34,3)	239
	<b>2013</b>	27,7	(21,9-33,5)	27,4	(22,0-33,5)	306
	<b>2018</b>	30,5	(26,6-34,3)	30,2	(26,4-34,2)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

°Il s'agit aussi bien de médicaments classiques que d'autres produits de santé,

## 17. Accessibilité financière aux soins de santé

En Communauté Germanophone, 7,6% des ménages considèrent les dépenses de santé (soins médicaux, soins dentaires, achat de médicaments prescrits et non prescrits) comme une charge financière lourde, un pourcentage nettement inférieur à celui constaté pour la Belgique (15,1%).

En particulier, les ménages ayant une femme (10,1%) ou une personne jeune (28,8%) comme personne de référence et les ménages appartenant au quintile de revenu le plus bas (14,0%) sont plus nombreux à considérer les dépenses de santé comme une lourde charge financière.

Enfin, 5,1% des ménages de la Communauté Germanophone indiquent qu'ils doivent reporter le recours aux services de soins de santé pour des raisons financières, un pourcentage inférieur à celui applicable à l'ensemble du pays (9,1%).

**Tableau B 228. Pourcentage des ménages indiquant que les dépenses de santé sont lourdes à supporter, Enquête de santé 2018 - Belgique**

AC_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	12,5	(11,0-13,9)	12,0	(10,6-13,5)	3463
	<b>Femme</b>	20,5	(18,1-22,9)	20,4	(18,1-22,9)	2024
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,8	(0,5-11,0)	5,2	(2,1-12,7)	71
	<b>25 - 44</b>	15,0	(12,5-17,5)	14,9	(12,6-17,7)	1636
	<b>45 - 64</b>	17,3	(15,2-19,3)	17,4	(15,4-19,6)	2170
	<b>65 +</b>	12,6	(10,5-14,8)	11,9	(10,0-14,1)	1610
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	22,1	(16,8-27,3)	23,5	(18,3-29,6)	478
	<b>Secondaire inférieur</b>	20,8	(17,3-24,4)	21,2	(17,6-25,3)	768
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,9	(15,5-20,3)	17,0	(14,8-19,5)	1627
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,5	(7,9-11,1)	8,6	(7,2-10,4)	2489
<b>REVENU EQUIVALENT</b>	<b>1° quintile</b>	27,7	(24,0-31,5)	26,9	(23,2-31,0)	1034
	<b>2° quintile</b>	15,5	(12,7-18,3)	15,0	(12,5-18,0)	965
	<b>3° quintile</b>	15,5	(12,7-18,2)	14,6	(12,1-17,4)	994
	<b>4° quintile</b>	12,7	(10,1-15,3)	11,8	(9,4-14,7)	1030
	<b>5° quintile</b>	6,3	(3,8-8,9)	5,5	(3,6-8,4)	993
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,6	(4,9-10,2)	7,3	(5,1-10,4)	521
	<b>Brabant Flamand</b>	12,2	(7,9-16,4)	11,7	(8,1-16,5)	321
	<b>Flandre Occidentale</b>	12,8	(9,2-16,4)	12,8	(9,5-16,9)	495
	<b>Flandre Orientale</b>	8,5	(5,6-11,3)	8,2	(5,8-11,4)	448
	<b>Limbourg</b>	8,9	(3,1-14,6)	9,0	(4,7-16,6)	189
	<b>Bruxelles</b>	20,5	(18,2-22,9)	19,0	(16,8-21,5)	1551
	<b>Brabant Wallon</b>	25,8	(18,3-33,2)	25,5	(18,7-33,8)	160
	<b>Hainaut</b>	23,6	(19,3-27,8)	22,3	(18,4-26,7)	539
	<b>Liège</b>	21,7	(16,2-27,3)	20,6	(15,7-26,6)	351
	<b>Luxembourg</b>	20,5	(14,2-26,7)	20,4	(14,7-27,6)	244
	<b>Namur</b>	18,0	(12,7-23,3)	17,7	(13,0-23,6)	225
	<b>Communauté Germanophone</b>	7,6	(4,7-10,6)	7,5	(5,0-10,9)	443
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	15,1	(13,8-16,4)			5487

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 229. Pourcentage des ménages indiquant que les dépenses de santé sont lourdes à supporter, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AC_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,7	(3,1-10,2)	5,9	(3,3-10,3)	307
	<b>Femme</b>	10,1	(4,8-15,3)	9,9	(5,9-16,1)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	28,8	(0,0-59,8)	28,3	(10,8-56,3)	13
	<b>25 - 44</b>	7,7	(2,7-12,8)	7,8	(4,1-14,7)	95
	<b>45 - 64</b>	9,6	(4,0-15,2)	10,0	(5,5-17,5)	181
	<b>65 +</b>	3,9	(0,6-7,1)	3,7	(1,5-8,9)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,4	(0,0-13,7)	9,9	(2,7-30,3)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	17,0	(5,3-28,8)	16,8	(7,8-32,5)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,2	(4,5-13,9)	7,6	(4,1-13,5)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,6	(0,6-6,7)	3,0	(1,1-7,5)	154
<b>REVENU EQUIVALENT</b>	<b>1° quintile</b>	14,0	(4,9-23,1)	14,3	(7,2-26,3)	103
	<b>2° quintile</b>	8,8	(2,5-15,2)	9,1	(4,1-19,1)	73
	<b>3° quintile</b>	11,0	(2,0-19,9)	9,9	(3,8-23,4)	56
	<b>4° quintile</b>	2,6	(0,0-6,3)	2,0	(0,4-8,5)	70
	<b>5° quintile</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	71
<b>ANNEE</b>	<b>2018</b>	7,6	(4,7-10,6)			443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 230. Pourcentage des ménages qui indiquent avoir dû reporter des soins de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

AC_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	7,0	(5,9-8,0)	6,4	(5,4-7,5)	3464
	Femme	13,4	(11,5-15,3)	13,2	(11,4-15,2)	2027
GROUPE D'AGE	15 - 24	8,0	(1,3-14,7)	7,0	(2,8-16,4)	72
	25 - 44	10,1	(8,3-11,9)	9,9	(8,2-11,9)	1637
	45 - 64	11,4	(9,7-13,1)	11,3	(9,7-13,1)	2172
	65 +	5,1	(3,8-6,4)	4,6	(3,5-6,0)	1610
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	13,6	(9,3-17,9)	15,8	(11,6-21,2)	479
	Secondaire inférieur	13,3	(10,2-16,3)	13,7	(10,7-17,5)	769
	Secondaire supérieur	10,6	(8,8-12,4)	9,2	(7,7-11,0)	1628
	Enseignement supérieur	5,5	(4,5-6,5)	4,4	(3,5-5,5)	2489
REVENU EQUIVALENT	1° quintile	18,4	(15,3-21,5)	17,7	(14,6-21,4)	1036
	2° quintile	10,8	(8,3-13,3)	10,4	(8,2-12,9)	965
	3° quintile	11,2	(8,7-13,6)	9,8	(7,7-12,5)	994
	4° quintile	5,0	(3,4-6,5)	4,2	(3,0-5,8)	1030
	5° quintile	2,5	(1,5-3,5)	1,9	(1,2-2,9)	993
PROVINCE	Anvers	4,0	(2,1-5,9)	3,7	(2,3-6,0)	521
	Brabant Flamand	5,4	(2,7-8,2)	5,0	(3,0-8,2)	321
	Flandre Occidentale	6,2	(3,5-8,9)	6,2	(4,0-9,5)	495
	Flandre Orientale	6,3	(4,2-8,5)	5,9	(4,1-8,3)	449
	Limbourg	5,0	(2,0-7,9)	5,1	(2,8-9,2)	189
	Bruxelles	16,1	(13,8-18,3)	13,5	(11,5-15,8)	1552
	Brabant Wallon	14,5	(8,4-20,5)	14,1	(9,0-21,5)	160
	Hainaut	13,4	(9,9-16,9)	11,8	(9,0-15,4)	539
	Liège	13,5	(9,5-17,4)	12,1	(8,9-16,2)	351
	Luxembourg	12,9	(7,5-18,2)	12,4	(7,9-19,1)	246
	Namur	8,2	(4,5-11,9)	7,8	(4,9-12,4)	225
Communauté Germanophone	5,1	(3,0-7,2)	4,8	(3,2-7,3)	443	
ANNEE	2001	10,1	(9,1-11,1)	10,0	(9,0-11,0)	5351
	2004	9,7	(8,7-10,7)	9,3	(8,4-10,4)	5971
	2008	12,4	(11,3-13,6)	11,9	(10,8-13,1)	5383
	2013	8,4	(7,4-9,4)	7,8	(6,9-8,9)	4881
	2018	9,1	(8,1-10,0)	8,4	(7,5-9,3)	5491

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 231. Pourcentage des ménages qui indiquent avoir dû reporter des soins de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AC_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	2,5	(0,8-4,2)	2,2	(1,1-4,5)	307
	<b>Femme</b>	11,9	(5,8-17,9)	11,2	(6,5-18,5)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	28,8	(0,0-59,8)	25,4	(10,8-49,0)	13
	<b>25 - 44</b>	9,9	(3,7-16,2)	8,8	(4,5-16,7)	95
	<b>45 - 64</b>	2,9	(0,7-5,1)	2,7	(1,1-6,2)	181
	<b>65 +</b>	3,3	(0,1-6,4)	2,3	(0,9-6,1)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,5	(0,0-11,9)	5,3	(1,2-20,5)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,7	(1,2-12,1)	6,1	(2,5-14,0)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,3	(3,0-13,5)	5,8	(2,7-11,9)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,0	(0,0-5,9)	2,2	(0,6-7,6)	154
<b>REVENU EQUIVALENT</b>	<b>1° quintile</b>	11,1	(4,6-17,5)	9,2	(4,7-17,5)	103
	<b>2° quintile</b>	8,5	(1,9-15,1)	5,5	(1,7-16,5)	73
	<b>3° quintile</b>	6,6	(0,0-13,3)	5,8	(2,0-15,5)	56
	<b>4° quintile</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	70
	<b>5° quintile</b>	1,0	(0,0-3,1)	0,7	(0,1-5,1)	71
<b>ANNEE</b>	<b>2001</b>	5,4	(0,0-11,2)	5,7	(1,9-16,0)	119
	<b>2004</b>	4,3	(0,2-8,3)	4,6	(1,8-11,3)	126
	<b>2008</b>	5,4	(0,6-10,1)	5,8	(2,3-13,6)	116
	<b>2013</b>	5,0	(1,8-8,2)	5,3	(2,8-9,7)	139
	<b>2018</b>	5,1	(3,0-7,2)	4,9	(3,2-7,4)	443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

# SANTÉ ET SOCIÉTÉ

## 1. Environnement, logement et tabagisme passif

Cette thématique examine la perception de la population à l'égard des caractéristiques de l'environnement bâti, c'est à-dire tout élément de l'environnement physique créé ou modifié par l'intervention humaine. Les caractéristiques de l'environnement bâti prises en compte dans l'enquête sont, d'une part, la qualité du milieu de vie local, et d'autre part, la qualité du logement.

### 1.1. QUALITÉ DU MILIEU DE VIE LOCAL

Au sein de la Communauté Germanophone, 9,5% de la population de 15 ans et plus vit dans un quartier où le volume et/ou la vitesse du trafic posent un sérieux problème, 2,6% dans un quartier où l'accumulation d'immondices pose un sérieux problème, 0,4% dans un quartier où le vandalisme, les graffitis, ou l'endommagement délibéré de biens posent un sérieux problème et 0,9% dans un quartier où le manque d'accès à des parcs ou à d'autres espaces publics verts ou récréatifs pose un sérieux problème. Lorsqu'on prend en compte les 5 items simultanément, il ressort que 11,4% de la population de 15 ans et plus vit dans un quartier où au moins une de ces nuisances environnementales pose un sérieux problème. Ce pourcentage est significativement moins élevé en Communauté Germanophone que dans toutes les autres provinces (taux variant entre 18,6% et 36,0%) sauf les provinces de la Flandre occidentale (13,6%) et de Namur (13,0%), où il n'y a pas de différence significative.

Aussi, en Communauté Germanophone, 6,0% des personnes (de 15 ans et plus) sont gênées à leur domicile par la pollution de l'air, 6,5% par les mauvaises odeurs, 4,1% par les vibrations et 13,2% par le bruit. Lorsqu'on prend en compte toutes les sources de nuisance simultanément, il ressort que 19,8% de la population (de 15 ans et plus) est gênée par au moins une de ces sources de pollution. Ce pourcentage est significativement moins élevé que toutes les autres provinces (taux variant entre 27,8% et 53,0%) sauf les provinces de la Flandre occidentale (21,5%) et de Namur (18,2%), où il n'y a pas de différence significative.

Comme pour le niveau national, on trouve pour ces deux indicateurs des différences selon l'âge, où les jeunes et les personnes âgées sont moins nombreux à rapporter des nuisances environnementales. Ces différences ne sont, néanmoins, pas significatives, probablement à cause de la taille de l'échantillon. Pour le niveau d'instruction aussi, on trouve chez les personnes moins diplômées, comme au niveau national, un taux plus élevé de personnes rapportant des nuisances environnementales. Mais, les différences selon le niveau d'instruction ne sont significatives que pour les nuisances environnementales perçues à domicile.

### 1.2. QUALITÉ DU LOGEMENT

En ce qui concerne le logement en Communauté Germanophone, 0,5% des ménages sont en situation de surpeuplement, 2,5% n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement et 1,7% rapportent des problèmes d'humidité ou de moisissures. Si l'on prend en compte les 3 items simultanément, il ressort que 4,3% des ménages sont confrontés à au moins un de ces problèmes dans leur logement. Cette proportion est significativement moins élevée que les taux au Limbourg (11,4%), Bruxelles (17,7%), Hainaut (11,0%) et Liège (10,4%), et comparable aux taux dans les autres provinces.

16,2% des ménages en Communauté Germanophone comportent au moins une personne qui fume régulièrement à l'intérieur du logement, et il n'y a pas de différence notable par rapport aux autres provinces.

L'usage du tabac à l'intérieur du logement est restreint d'une manière ou d'une autre dans 69,0% des ménages de la Communauté Germanophone. Parmi les ménages qui imposent des restrictions, 93,9% interdisent

complètement l'usage du tabac à l'intérieur, 5,5% limitent l'usage à certaines pièces, et 0,6% l'interdisent en présence de jeunes enfants.

Les ménages dont la personne de référence est une femme sont plus nombreux à vivre dans un logement ayant un ou plusieurs problèmes, et à avoir quelqu'un qui fume régulièrement à l'intérieur. Aussi, les ménages dont la personne de référence est jeune sont plus nombreux à avoir quelqu'un qui fume régulièrement à l'intérieur.

**Tableau B 232. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE0101_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	16,6	(15,1-18,2)	16,1	(14,6-17,8)	4181
	<b>Femme</b>	15,5	(14,1-16,9)	15,0	(13,6-16,6)	4639
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,7	(6,5-12,9)	9,7	(6,9-13,4)	795
	<b>25 - 44</b>	18,9	(16,7-21,2)	18,9	(16,8-21,3)	2640
	<b>45 - 64</b>	16,6	(14,6-18,5)	16,6	(14,7-18,6)	3176
	<b>65 +</b>	14,4	(12,3-16,6)	14,5	(12,5-16,7)	2209
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	11,6	(8,1-15,0)	11,8	(8,7-16,0)	638
	<b>Secondaire inférieur</b>	16,4	(13,0-19,8)	16,2	(13,0-20,1)	1122
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,1	(14,9-19,4)	16,7	(14,6-19,1)	2647
	<b>Enseignement supérieur</b>	15,6	(13,9-17,3)	15,0	(13,3-16,8)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	15,8	(12,5-19,2)	15,3	(12,3-18,9)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	18,0	(13,5-22,6)	17,5	(13,3-22,7)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	8,9	(6,3-11,4)	8,6	(6,4-11,4)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	18,0	(14,0-21,9)	17,5	(13,9-21,7)	751
	<b>Limbourg</b>	14,1	(8,9-19,3)	13,6	(9,4-19,3)	315
	<b>Bruxelles</b>	23,0	(20,8-25,2)	22,1	(20,0-24,4)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	13,0	(7,8-18,1)	12,8	(8,5-18,9)	283
	<b>Hainaut</b>	18,6	(14,9-22,2)	18,1	(14,7-22,1)	877
	<b>Liège</b>	14,1	(10,5-17,8)	13,8	(10,6-17,7)	523
	<b>Luxembourg</b>	13,1	(8,8-17,4)	12,7	(9,1-17,5)	379
	<b>Namur</b>	9,3	(5,3-13,4)	9,1	(5,9-13,8)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	9,5	(6,2-12,7)	9,2	(6,5-13,0)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	18,0	(16,6-19,4)	17,5	(16,1-18,9)	7892
	<b>2018</b>	16,0	(14,8-17,3)	15,6	(14,4-16,9)	8820

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 233. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE0101_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,3	(4,7-11,8)	7,4	(4,5-11,7)	383
	<b>Femme</b>	10,6	(6,8-14,4)	9,5	(6,3-14,3)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	2,9	(0,0-8,2)	2,9	(0,5-15,9)	86
	<b>25 - 44</b>	11,9	(5,7-18,1)	11,8	(6,9-19,4)	178
	<b>45 - 64</b>	11,8	(6,3-17,4)	11,8	(7,2-18,5)	290
	<b>65 +</b>	6,3	(2,3-10,3)	6,2	(3,2-11,5)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,3	(0,0-11,7)	6,0	(1,8-18,6)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	13,4	(2,0-24,8)	12,0	(4,7-27,1)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,7	(3,8-15,7)	8,4	(4,4-15,4)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	9,1	(4,1-14,0)	7,5	(3,9-13,9)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	10,5	(4,4-16,6)	9,7	(5,3-17,0)	249
	<b>2018</b>	9,5	(6,2-12,7)	8,6	(5,9-12,4)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 234. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE0102_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,9	(6,7-9,0)	7,6	(6,5-8,8)	4182
	<b>Femme</b>	7,9	(6,9-8,9)	7,6	(6,7-8,7)	4639
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,2	(2,9-7,5)	5,2	(3,4-8,0)	795
	<b>25 - 44</b>	9,6	(7,9-11,3)	9,6	(8,0-11,5)	2641
	<b>45 - 64</b>	8,6	(7,1-10,1)	8,6	(7,2-10,2)	3176
	<b>65 +</b>	5,9	(4,5-7,3)	5,9	(4,6-7,4)	2209
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	9,0	(5,9-12,1)	10,0	(7,0-14,2)	638
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,4	(6,0-10,7)	8,6	(6,4-11,4)	1122
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,6	(6,0-9,2)	7,3	(5,9-9,1)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,7	(6,4-9,1)	7,2	(6,0-8,5)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,7	(5,4-10,1)	7,4	(5,5-10,0)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	5,6	(2,1-9,1)	5,4	(2,8-10,1)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	3,3	(1,8-4,8)	3,2	(2,0-5,0)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	8,6	(5,3-11,9)	8,3	(5,6-12,1)	752
	<b>Limbourg</b>	5,5	(2,7-8,2)	5,3	(3,2-8,7)	315
	<b>Bruxelles</b>	20,9	(18,8-23,0)	20,0	(18,0-22,3)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	1,4	(0,0-3,6)	1,4	(0,3-6,4)	283
	<b>Hainaut</b>	9,0	(6,1-11,8)	8,7	(6,3-11,9)	877
	<b>Liège</b>	5,6	(3,2-8,1)	5,5	(3,5-8,4)	523
	<b>Luxembourg</b>	4,8	(0,8-8,8)	4,7	(2,0-10,3)	379
	<b>Namur</b>	1,6	(0,3-2,8)	1,5	(0,7-3,3)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	2,6	(0,8-4,4)	2,5	(1,2-5,0)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	6,8	(6,0-7,6)	6,6	(5,8-7,4)	7892
	<b>2018</b>	7,9	(7,0-8,8)	7,7	(6,8-8,6)	8821

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 235. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE0102_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,6	(1,1-6,0)	3,2	(1,6-6,2)	383
	<b>Femme</b>	1,7	(0,2-3,1)	1,4	(0,6-3,4)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,7	(0,0-1,8)	0,7	(0,2-2,8)	86
	<b>25 - 44</b>	1,9	(0,0-4,1)	1,7	(0,5-5,6)	178
	<b>45 - 64</b>	3,3	(0,1-6,5)	3,1	(1,2-8,0)	290
	<b>65 +</b>	3,4	(0,1-6,6)	3,2	(1,2-8,7)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	4,9	(0,0-14,3)	3,8	(0,4-26,7)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	2,8	(0,3-5,4)	2,5	(0,9-6,6)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,6	(0,3-2,9)	1,3	(0,6-2,9)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	2,2	(0,4-4,0)	1,8	(0,8-4,0)	249
	<b>2018</b>	2,6	(0,8-4,4)	2,2	(1,0-4,4)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 236. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique

HE0103_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,8	(4,0-5,6)	4,7	(3,9-5,6)	4182
	<b>Femme</b>	4,9	(4,2-5,7)	4,9	(4,1-5,7)	4638
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	3,6	(1,5-5,7)	3,6	(2,0-6,4)	795
	<b>25 - 44</b>	5,5	(4,5-6,5)	5,5	(4,6-6,6)	2641
	<b>45 - 64</b>	5,1	(4,0-6,1)	5,1	(4,1-6,2)	3176
	<b>65 +</b>	4,3	(3,3-5,4)	4,3	(3,4-5,6)	2208
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,3	(3,6-9,1)	6,8	(4,2-10,7)	637
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,8	(4,2-7,4)	5,9	(4,4-7,8)	1122
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,1	(3,8-6,3)	5,0	(3,9-6,3)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,2	(3,3-5,0)	4,0	(3,2-5,0)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	4,1	(2,3-5,9)	4,0	(2,6-6,1)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	3,1	(0,3-5,9)	3,1	(1,2-7,6)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	1,9	(0,7-3,2)	1,9	(1,0-3,6)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	1,6	(0,5-2,8)	1,6	(0,8-3,2)	752
	<b>Limbourg</b>	3,4	(0,9-6,0)	3,4	(1,6-6,9)	315
	<b>Bruxelles</b>	16,4	(14,5-18,3)	16,2	(14,3-18,2)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	3,3	(0,8-5,8)	3,2	(1,5-6,8)	283
	<b>Hainaut</b>	6,0	(4,0-8,0)	5,9	(4,2-8,3)	876
	<b>Liège</b>	4,3	(2,0-6,5)	4,2	(2,5-7,0)	523
	<b>Luxembourg</b>	6,5	(3,0-10,1)	6,4	(3,7-10,9)	379
	<b>Namur</b>	2,3	(0,7-3,8)	2,2	(1,1-4,4)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	0,4	(0,0-0,9)	0,4	(0,2-1,2)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	6,2	(5,4-6,9)	6,1	(5,4-6,9)	7892
	<b>2018</b>	4,9	(4,2-5,5)	4,8	(4,2-5,5)	8820

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 237. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE0103_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	0,2	(0,0-0,7)	0,1	(0,0-0,4)	383
	<b>Femme</b>	0,6	(0,0-1,4)	0,1	(0,1-0,4)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	86
	<b>25 - 44</b>	0,4	(0,0-1,3)	0,4	(0,0-4,1)	178
	<b>45 - 64</b>	0,7	(0,0-1,6)	0,6	(0,2-2,1)	290
	<b>65 +</b>	0,3	(0,0-1,0)	0,3	(0,0-1,9)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,6	(0,0-1,7)	0,0	(0,0-0,1)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	0,7	(0,0-1,6)	0,0	(0,0-0,1)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	0,2	(0,0-0,5)	0,0	(0,0-0,3)	249
	<b>2018</b>	0,4	(0,0-0,9)	0,1	(0,0-0,3)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 238. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le manque d'accès à des parcs ou d'autres espaces publics verts ou récréatives pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE0104_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,0	(3,2-4,8)	3,9	(3,2-4,7)	4182
	<b>Femme</b>	4,7	(3,9-5,5)	4,6	(3,9-5,5)	4638
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,1	(2,2-5,9)	4,1	(2,6-6,4)	795
	<b>25 - 44</b>	5,7	(4,5-6,9)	5,7	(4,6-7,0)	2640
	<b>45 - 64</b>	4,0	(3,1-4,9)	4,0	(3,1-5,0)	3176
	<b>65 +</b>	3,3	(2,2-4,4)	3,3	(2,4-4,5)	2209
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,6	(3,1-8,1)	6,5	(4,1-10,3)	637
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,7	(4,4-9,0)	7,1	(5,0-10,1)	1122
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,3	(3,1-5,4)	4,1	(3,1-5,4)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,7	(2,8-4,5)	3,3	(2,6-4,2)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	3,0	(1,6-4,4)	2,9	(1,8-4,6)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	3,4	(1,0-5,7)	3,3	(1,6-6,6)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	1,8	(0,5-3,0)	1,8	(0,9-3,6)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	3,0	(1,6-4,4)	2,9	(1,8-4,6)	752
	<b>Limbourg</b>	2,1	(0,5-3,7)	2,1	(1,0-4,4)	315
	<b>Bruxelles</b>	6,6	(5,3-7,9)	6,2	(5,1-7,6)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	4,9	(0,9-8,9)	4,9	(2,2-10,6)	283
	<b>Hainaut</b>	9,0	(6,2-11,7)	8,7	(6,3-11,9)	877
	<b>Liège</b>	5,2	(2,7-7,7)	5,1	(3,2-8,2)	523
	<b>Luxembourg</b>	3,9	(1,5-6,2)	3,8	(2,1-6,8)	378
	<b>Namur</b>	4,1	(1,4-6,9)	4,1	(2,1-7,7)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	0,9	(0,0-2,0)	0,9	(0,3-2,7)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	5,1	(4,3-6,0)	4,9	(4,2-5,8)	7890
	<b>2018</b>	4,4	(3,7-5,0)	4,2	(3,6-4,9)	8820

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 239. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le manque d'accès à des parcs ou d'autres espaces publics verts ou récréatives pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE0104_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	0,5	(0,0-1,4)	0,0	(0,0-0,0)	383
	<b>Femme</b>	1,4	(0,0-2,9)	0,0	(0,0-0,0)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	86
	<b>25 - 44</b>	3,4	(0,0-7,1)	2,9	(0,8-10,2)	178
	<b>45 - 64</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	290
	<b>65 +</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	1,9	(0,0-4,3)	0,0	(0,0-0,0)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	1,0	(0,0-2,9)	0,0	(0,0-0,0)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	1,0	(0,0-2,6)	0,0	(0,0-0,1)	249
	<b>2018</b>	0,9	(0,0-2,0)	0,0	(0,0-0,0)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 240. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence\*, Enquête de santé 2018 - Belgique

HE01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	24,1	(22,3-25,9)	23,5	(21,7-25,4)	4181
	<b>Femme</b>	23,1	(21,4-24,7)	22,6	(20,9-24,3)	4637
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	15,5	(11,9-19,1)	15,5	(12,2-19,5)	795
	<b>25 - 44</b>	27,8	(25,2-30,4)	27,8	(25,2-30,5)	2639
	<b>45 - 64</b>	24,1	(21,8-26,3)	24,1	(21,9-26,4)	3176
	<b>65 +</b>	21,0	(18,6-23,5)	21,1	(18,7-23,7)	2208
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	20,0	(15,5-24,4)	21,0	(16,6-26,3)	636
	<b>Secondaire inférieur</b>	28,1	(23,9-32,2)	28,4	(24,2-33,0)	1122
	<b>Secondaire supérieur</b>	24,2	(21,6-26,8)	23,7	(21,2-26,4)	2647
	<b>Enseignement supérieur</b>	22,3	(20,2-24,3)	21,3	(19,4-23,4)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	23,3	(19,4-27,1)	22,6	(19,0-26,7)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	22,6	(17,4-27,8)	22,1	(17,3-27,8)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	13,6	(10,5-16,7)	13,3	(10,5-16,6)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	23,3	(19,0-27,7)	22,8	(18,9-27,4)	751
	<b>Limbourg</b>	18,6	(13,0-24,2)	18,1	(13,3-24,0)	315
	<b>Bruxelles</b>	36,0	(33,4-38,5)	34,9	(32,4-37,5)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	19,8	(13,3-26,3)	19,7	(14,1-26,9)	283
	<b>Hainaut</b>	30,7	(26,1-35,3)	30,2	(25,7-35,1)	876
	<b>Liège</b>	22,2	(17,5-26,9)	21,8	(17,6-26,7)	523
	<b>Luxembourg</b>	21,1	(15,1-27,1)	20,7	(15,5-27,1)	378
	<b>Namur</b>	13,0	(8,6-17,5)	12,8	(9,0-17,8)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	11,4	(8,0-14,8)	11,2	(8,2-15,0)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	25,0	(23,4-26,6)	24,4	(22,9-26,1)	7890
	<b>2018</b>	23,6	(22,1-25,0)	23,1	(21,7-24,5)	8818

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 241. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence\*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

HE01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	10,0	(6,2-13,7)	9,0	(6,0-13,4)	383
	Femme	12,8	(8,7-16,8)	11,6	(8,1-16,4)	386
GROUPE D'AGE	15 - 24	3,6	(0,0-9,0)	3,6	(0,8-14,5)	86
	25 - 44	14,1	(7,5-20,7)	14,0	(8,7-21,8)	178
	45 - 64	14,0	(8,2-19,8)	13,9	(9,1-20,7)	290
	65 +	8,2	(3,7-12,6)	8,0	(4,6-13,6)	215
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	5,3	(0,0-11,7)	5,7	(1,7-17,7)	72
	Secondaire inférieur	14,0	(2,5-25,4)	12,5	(5,1-27,4)	128
	Secondaire supérieur	13,4	(6,8-19,9)	11,9	(7,1-19,3)	214
	Enseignement supérieur	10,6	(5,4-15,8)	9,1	(5,2-15,7)	302
ANNEE	2013	12,1	(5,7-18,4)	11,1	(6,4-18,6)	249
	2018	11,4	(8,0-14,8)	10,4	(7,5-14,3)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 242. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par la pollution de l'air, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE0201_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	13,3	(11,8-14,7)	12,7	(11,3-14,2)	4173
	<b>Femme</b>	13,7	(12,4-15,1)	13,2	(11,8-14,7)	4626
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	7,5	(4,7-10,4)	7,6	(5,2-10,9)	793
	<b>25 - 44</b>	16,2	(14,0-18,4)	16,2	(14,1-18,5)	2638
	<b>45 - 64</b>	14,7	(12,9-16,5)	14,7	(13,0-16,6)	3170
	<b>65 +</b>	11,0	(9,1-12,8)	10,9	(9,2-12,9)	2198
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	8,1	(5,6-10,5)	8,3	(6,1-11,4)	635
	<b>Secondaire inférieur</b>	12,9	(9,9-15,9)	12,8	(10,0-16,3)	1120
	<b>Secondaire supérieur</b>	10,4	(8,6-12,2)	10,0	(8,4-12,0)	2647
	<b>Enseignement supérieur</b>	16,1	(14,3-18,0)	15,3	(13,5-17,2)	4233
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	17,0	(13,5-20,5)	16,3	(13,1-20,0)	890
	<b>Brabant Flamand</b>	13,3	(9,0-17,6)	12,8	(9,1-17,7)	528
	<b>Flandre Occidentale</b>	6,0	(3,8-8,1)	5,8	(4,0-8,2)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	15,6	(11,8-19,3)	15,0	(11,7-18,9)	746
	<b>Limbourg</b>	7,8	(4,1-11,5)	7,4	(4,6-11,8)	315
	<b>Bruxelles</b>	28,1	(25,7-30,5)	26,9	(24,6-29,4)	2282
	<b>Brabant Wallon</b>	4,0	(1,1-6,8)	3,9	(1,9-7,7)	283
	<b>Hainaut</b>	11,4	(8,0-14,8)	10,9	(8,0-14,7)	872
	<b>Liège</b>	11,1	(7,3-14,9)	10,6	(7,4-15,0)	523
	<b>Luxembourg</b>	8,9	(5,1-12,8)	8,6	(5,5-13,0)	379
	<b>Namur</b>	5,9	(2,9-8,9)	5,7	(3,4-9,3)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	6,0	(3,4-8,6)	5,8	(3,7-8,8)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	11,9	(10,8-12,9)	11,5	(10,5-12,6)	8276
	<b>2013</b>	7,0	(6,1-7,8)	6,7	(5,9-7,6)	7879
	<b>2018</b>	13,5	(12,3-14,7)	13,1	(12,0-14,3)	8799

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 243. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par la pollution de l'air, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE0201_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,1	(4,3-11,9)	7,6	(4,7-12,0)	383
	<b>Femme</b>	4,0	(1,8-6,2)	3,7	(2,2-6,4)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	4,3	(0,0-10,7)	4,0	(1,0-15,0)	86
	<b>25 - 44</b>	4,7	(1,3-8,1)	4,5	(2,1-9,2)	178
	<b>45 - 64</b>	8,3	(3,4-13,2)	7,9	(4,3-14,0)	290
	<b>65 +</b>	4,6	(1,3-7,9)	4,4	(2,1-9,0)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,7	(0,0-2,1)	0,8	(0,1-5,8)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	11,9	(0,0-23,7)	10,9	(4,0-26,3)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,9	(1,3-8,4)	4,1	(1,9-8,8)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,4	(2,3-8,6)	4,4	(2,3-8,1)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	3,7	(0,5-6,9)	3,4	(1,4-7,9)	192
	<b>2013</b>	1,5	(0,0-3,1)	1,3	(0,5-3,7)	249
	<b>2018</b>	6,0	(3,4-8,6)	5,3	(3,3-8,3)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 244. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE0202_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,1	(6,1-8,1)	6,9	(5,9-8,1)	4182
	<b>Femme</b>	7,5	(6,5-8,5)	7,3	(6,4-8,4)	4638
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,6	(3,1-8,1)	5,6	(3,6-8,6)	795
	<b>25 - 44</b>	7,1	(5,8-8,5)	7,1	(5,9-8,6)	2641
	<b>45 - 64</b>	8,6	(7,1-10,1)	8,6	(7,2-10,2)	3176
	<b>65 +</b>	6,3	(5,0-7,7)	6,3	(5,1-7,8)	2208
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,1	(3,9-8,4)	6,3	(4,3-9,1)	638
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,1	(5,8-10,3)	8,0	(6,0-10,6)	1121
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,2	(5,7-8,7)	7,1	(5,7-8,7)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,2	(6,0-8,5)	7,0	(5,9-8,4)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,0	(4,6-9,4)	6,8	(4,8-9,6)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	6,9	(3,4-10,3)	6,7	(4,0-11,0)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	4,3	(2,8-5,8)	4,2	(2,9-6,0)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	6,7	(4,6-8,8)	6,6	(4,8-9,0)	751
	<b>Limbourg</b>	9,5	(5,1-13,9)	9,4	(5,8-14,7)	315
	<b>Bruxelles</b>	10,9	(9,3-12,4)	10,7	(9,3-12,4)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	5,0	(2,0-8,1)	4,9	(2,7-8,9)	283
	<b>Hainaut</b>	8,1	(5,6-10,6)	7,9	(5,8-10,7)	877
	<b>Liège</b>	6,8	(3,7-9,9)	6,6	(4,2-10,4)	523
	<b>Luxembourg</b>	13,7	(8,7-18,7)	13,4	(9,3-19,1)	379
	<b>Namur</b>	3,5	(0,6-6,4)	3,4	(1,5-7,7)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	6,5	(4,1-8,9)	6,3	(4,3-9,1)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	10,6	(9,6-11,7)	10,3	(9,3-11,4)	8146
	<b>2013</b>	7,1	(6,2-8,0)	6,9	(6,1-7,8)	7891
	<b>2018</b>	7,3	(6,4-8,1)	7,1	(6,3-8,0)	8820

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 245. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE0202_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,9	(3,7-10,1)	6,4	(4,0-10,2)	383
	<b>Femme</b>	6,1	(3,4-8,8)	5,7	(3,6-8,8)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	5,2	(0,0-10,5)	5,1	(1,8-13,7)	86
	<b>25 - 44</b>	4,2	(0,9-7,4)	4,2	(1,9-8,9)	178
	<b>45 - 64</b>	8,9	(4,3-13,6)	8,9	(5,3-14,8)	290
	<b>65 +</b>	5,9	(2,2-9,7)	5,9	(3,1-11,0)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	1,8	(0,0-4,4)	1,6	(0,4-7,0)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,2	(0,0-18,0)	6,9	(1,7-23,8)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,6	(2,6-10,6)	6,4	(3,5-11,7)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,0	(3,5-10,6)	6,9	(4,1-11,2)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	7,9	(2,4-13,4)	7,1	(3,6-13,7)	191
	<b>2013</b>	4,1	(0,0-8,5)	3,8	(1,3-10,3)	249
	<b>2018</b>	6,5	(4,1-8,9)	6,0	(4,0-8,9)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 246. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Enquête de santé 2018 - Belgique

HE0203_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	11,5	(10,2-12,9)	11,3	(10,0-12,7)	4182
	<b>Femme</b>	11,2	(9,9-12,4)	11,0	(9,8-12,3)	4639
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	9,0	(6,0-12,1)	9,0	(6,5-12,5)	795
	<b>25 - 44</b>	14,0	(11,9-16,0)	14,0	(12,1-16,1)	2641
	<b>45 - 64</b>	11,2	(9,6-12,8)	11,2	(9,7-12,9)	3176
	<b>65 +</b>	9,2	(7,5-10,8)	9,2	(7,7-11,0)	2209
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	8,7	(6,2-11,1)	9,4	(6,9-12,7)	638
	<b>Secondaire inférieur</b>	12,8	(9,6-16,0)	13,3	(10,2-17,1)	1122
	<b>Secondaire supérieur</b>	11,9	(9,9-13,8)	11,6	(9,8-13,7)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,8	(9,3-12,3)	10,3	(8,9-11,9)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	8,1	(5,7-10,6)	8,0	(5,8-10,8)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	10,6	(6,8-14,3)	10,4	(7,2-14,8)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	5,8	(3,6-7,9)	5,7	(3,9-8,3)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	11,7	(8,2-15,2)	11,5	(8,5-15,4)	752
	<b>Limbourg</b>	8,0	(3,8-12,2)	7,8	(4,6-13,1)	315
	<b>Bruxelles</b>	20,2	(18,1-22,3)	19,4	(17,4-21,5)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	9,6	(4,8-14,4)	9,6	(5,8-15,5)	283
	<b>Hainaut</b>	17,6	(13,8-21,4)	17,3	(13,9-21,4)	877
	<b>Liège</b>	10,6	(6,9-14,3)	10,5	(7,3-14,7)	523
	<b>Luxembourg</b>	8,3	(4,8-11,8)	8,2	(5,3-12,3)	379
	<b>Namur</b>	5,9	(2,8-9,0)	5,8	(3,4-9,7)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	4,1	(1,9-6,4)	4,1	(2,3-7,0)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	10,0	(8,9-11,1)	9,7	(8,7-10,9)	8282
	<b>2013</b>	9,7	(8,7-10,8)	9,5	(8,5-10,6)	7893
	<b>2018</b>	11,4	(10,3-12,4)	11,1	(10,1-12,2)	8821

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 247. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE0203_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,8	(1,1-6,4)	3,0	(1,4-6,2)	383
	<b>Femme</b>	4,5	(1,8-7,1)	3,6	(2,0-6,3)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,5	(0,0-1,4)	0,5	(0,1-3,4)	86
	<b>25 - 44</b>	7,4	(2,3-12,5)	7,4	(3,7-14,3)	178
	<b>45 - 64</b>	3,4	(0,0-6,7)	3,4	(1,2-8,9)	290
	<b>65 +</b>	3,5	(0,9-6,0)	3,4	(1,6-7,1)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	,	0,0	(0,0-0,0)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	8,8	(0,0-19,6)	8,0	(2,1-26,3)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	5,3	(1,5-9,2)	4,0	(1,9-8,2)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,7	(0,2-5,2)	1,9	(0,7-4,9)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	5,7	(1,1-10,2)	5,2	(2,3-11,4)	191
	<b>2013</b>	5,6	(1,2-10,0)	5,1	(2,2-11,5)	249
	<b>2018</b>	4,1	(1,9-6,4)	3,7	(2,1-6,3)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 248. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par le bruit toutes sources confondues\*, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	26,8	(24,9-28,7)	26,3	(24,4-28,3)	4182
	<b>Femme</b>	26,8	(25,0-28,6)	26,5	(24,7-28,3)	4639
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	21,4	(17,0-25,8)	21,4	(17,4-26,1)	795
	<b>25 - 44</b>	31,3	(28,5-34,2)	31,3	(28,5-34,2)	2641
	<b>45 - 64</b>	27,2	(24,8-29,6)	27,2	(24,9-29,7)	3176
	<b>65 +</b>	22,6	(20,0-25,2)	22,6	(20,1-25,3)	2209
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	20,7	(16,4-25,1)	22,2	(17,8-27,4)	638
	<b>Secondaire inférieur</b>	28,2	(23,8-32,6)	28,9	(24,5-33,7)	1122
	<b>Secondaire supérieur</b>	27,0	(24,1-29,9)	26,6	(23,8-29,7)	2648
	<b>Enseignement supérieur</b>	26,7	(24,5-28,9)	25,8	(23,6-28,0)	4249
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	20,6	(16,9-24,4)	20,3	(16,8-24,2)	891
	<b>Brabant Flamand</b>	31,3	(25,5-37,0)	30,9	(25,4-36,9)	530
	<b>Flandre Occidentale</b>	16,3	(12,7-19,9)	16,2	(12,9-20,1)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	27,4	(22,6-32,3)	27,1	(22,6-32,1)	752
	<b>Limbourg</b>	20,3	(14,1-26,4)	20,0	(14,5-26,8)	315
	<b>Bruxelles</b>	42,8	(40,1-45,5)	41,8	(39,1-44,5)	2290
	<b>Brabant Wallon</b>	25,1	(18,4-31,9)	25,1	(19,0-32,4)	283
	<b>Hainaut</b>	32,6	(27,8-37,5)	32,2	(27,6-37,2)	877
	<b>Liège</b>	29,6	(23,5-35,7)	29,3	(23,5-35,9)	523
	<b>Luxembourg</b>	16,2	(11,3-21,1)	15,9	(11,7-21,3)	379
	<b>Namur</b>	15,3	(10,4-20,2)	15,2	(10,9-20,6)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	13,2	(9,8-16,7)	13,1	(10,1-16,8)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	20,9	(19,4-22,3)	20,4	(19,0-21,9)	8002
	<b>2013</b>	20,2	(18,8-21,7)	19,8	(18,4-21,3)	7892
	<b>2018</b>	26,8	(25,2-28,3)	26,4	(24,8-28,0)	8821

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 249. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par le bruit toutes sources confondues\*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE02_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	14,1	(9,8-18,5)	13,4	(9,6-18,5)	383
	<b>Femme</b>	12,4	(8,4-16,4)	11,8	(8,5-16,2)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	6,1	(0,0-12,6)	6,0	(2,1-16,4)	86
	<b>25 - 44</b>	18,9	(11,8-25,9)	18,8	(12,8-26,9)	178
	<b>45 - 64</b>	13,3	(7,9-18,7)	13,3	(8,7-19,7)	290
	<b>65 +</b>	10,3	(4,7-15,8)	10,3	(5,9-17,3)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,6	(0,1-13,1)	6,8	(2,3-18,3)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	16,0	(3,7-28,2)	16,4	(7,4-32,6)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,8	(10,8-24,8)	16,7	(10,4-25,7)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,4	(6,1-14,7)	9,2	(6,1-13,6)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	15,9	(8,6-23,2)	15,5	(9,6-24,2)	190
	<b>2013</b>	16,4	(8,6-24,2)	15,8	(9,8-24,4)	249
	<b>2018</b>	13,2	(9,8-16,7)	12,6	(9,6-16,3)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 250. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par au moins une nuisance environnementale\*, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	33,3	(31,3-35,4)	32,7	(30,7-34,8)	4173
	<b>Femme</b>	33,8	(31,9-35,7)	33,4	(31,5-35,4)	4626
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	24,9	(20,4-29,4)	24,9	(20,7-29,7)	793
	<b>25 - 44</b>	38,2	(35,2-41,1)	38,2	(35,3-41,1)	2638
	<b>45 - 64</b>	35,3	(32,7-37,9)	35,3	(32,8-38,0)	3170
	<b>65 +</b>	29,0	(26,2-31,8)	28,9	(26,2-31,8)	2198
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	25,8	(21,1-30,5)	27,1	(22,3-32,5)	635
	<b>Secondaire inférieur</b>	33,2	(28,6-37,7)	33,5	(29,0-38,4)	1120
	<b>Secondaire supérieur</b>	32,6	(29,6-35,6)	32,1	(29,1-35,3)	2647
	<b>Enseignement supérieur</b>	35,0	(32,6-37,3)	34,0	(31,6-36,4)	4233
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	30,4	(26,1-34,7)	29,8	(25,7-34,2)	890
	<b>Brabant Flamand</b>	35,8	(29,9-41,7)	35,3	(29,6-41,4)	528
	<b>Flandre Occidentale</b>	21,5	(17,7-25,3)	21,2	(17,6-25,3)	854
	<b>Flandre Orientale</b>	34,5	(29,6-39,5)	34,0	(29,3-39,1)	746
	<b>Limbourg</b>	28,6	(21,8-35,5)	28,1	(21,8-35,5)	315
	<b>Bruxelles</b>	53,0	(50,2-55,7)	52,1	(49,3-54,9)	2282
	<b>Brabant Wallon</b>	28,0	(21,0-35,0)	28,0	(21,6-35,4)	283
	<b>Hainaut</b>	38,1	(33,1-43,1)	37,6	(32,8-42,7)	872
	<b>Liège</b>	34,0	(27,7-40,2)	33,5	(27,5-40,1)	523
	<b>Luxembourg</b>	27,8	(21,5-34,1)	27,4	(21,7-33,9)	379
	<b>Namur</b>	18,2	(12,8-23,7)	17,9	(13,2-23,8)	358
	<b>Communauté Germanophone</b>	19,8	(16,0-23,7)	19,5	(16,0-23,6)	769
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	30,7	(29,0-32,4)	30,2	(28,5-31,9)	7917
	<b>2013</b>	26,8	(25,2-28,4)	26,3	(24,7-27,9)	7877
	<b>2018</b>	33,6	(31,9-35,2)	33,1	(31,5-34,8)	8799

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 251. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par au moins une nuisance environnementale\*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE02_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	21,1	(16,1-26,0)	20,5	(16,0-25,8)	383
	<b>Femme</b>	18,7	(14,2-23,3)	18,2	(14,1-23,0)	386
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	11,4	(3,4-19,4)	11,3	(5,6-21,6)	86
	<b>25 - 44</b>	22,3	(14,8-29,9)	22,3	(15,7-30,7)	178
	<b>45 - 64</b>	22,6	(16,1-29,1)	22,6	(16,8-29,7)	290
	<b>65 +</b>	17,0	(10,5-23,5)	17,0	(11,5-24,5)	215
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,7	(0,8-14,6)	7,9	(3,1-18,7)	72
	<b>Secondaire inférieur</b>	23,7	(10,7-36,8)	23,3	(12,8-38,5)	128
	<b>Secondaire supérieur</b>	22,9	(15,6-30,2)	22,5	(15,8-31,0)	214
	<b>Enseignement supérieur</b>	18,6	(13,1-24,1)	17,8	(13,0-23,8)	302
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	22,6	(14,2-31,0)	21,9	(14,8-31,2)	190
	<b>2013</b>	19,3	(11,3-27,3)	18,6	(12,1-27,4)	249
	<b>2018</b>	19,8	(16,0-23,7)	19,1	(15,5-23,2)	769

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 252. Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Enquête de santé 2018 - Belgique

LO04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,5	(1,1-1,8)	0,0	(0,0-0,0)	3460
	<b>Femme</b>	1,0	(0,6-1,5)	0,0	(0,0-0,0)	2019
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	72
	<b>25 - 44</b>	3,1	(2,2-3,9)	3,0	(2,3-4,0)	1631
	<b>45 - 64</b>	1,1	(0,7-1,5)	1,1	(0,7-1,5)	2166
	<b>65 +</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	1610
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	2,5	(1,3-3,7)	0,1	(0,1-0,2)	478
	<b>Secondaire inférieur</b>	1,0	(0,3-1,8)	0,0	(0,0-0,1)	767
	<b>Secondaire supérieur</b>	1,6	(1,1-2,0)	0,0	(0,0-0,0)	1624
	<b>Enseignement supérieur</b>	0,9	(0,5-1,3)	0,0	(0,0-0,0)	2483
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	0,6	(0,0-1,2)	0,0	(0,0-0,0)	522
	<b>Brabant Flamand</b>	1,3	(0,0-2,7)	0,0	(0,0-0,1)	319
	<b>Flandre Occidentale</b>	0,8	(0,0-1,6)	0,0	(0,0-0,1)	493
	<b>Flandre Orientale</b>	0,5	(0,0-1,1)	0,0	(0,0-0,0)	447
	<b>Limbourg</b>	1,4	(0,0-3,2)	0,0	(0,0-0,1)	189
	<b>Bruxelles</b>	6,8	(5,4-8,2)	0,1	(0,1-0,2)	1548
	<b>Brabant Wallon</b>	0,2	(0,0-0,4)	0,0	(0,0-0,0)	160
	<b>Hainaut</b>	0,2	(0,0-0,4)	0,0	(0,0-0,0)	538
	<b>Liège</b>	0,1	(0,0-0,2)	0,0	(0,0-0,0)	350
	<b>Luxembourg</b>	0,9	(0,0-2,2)	0,0	(0,0-0,1)	245
	<b>Namur</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	225
	<b>Communauté Germanophone</b>	0,5	(0,0-1,1)	0,0	(0,0-0,0)	443
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	0,7	(0,4-0,9)	0,2	(0,1-0,3)	4636
	<b>2013</b>	1,4	(1,1-1,7)	0,5	(0,3-0,7)	4860
	<b>2018</b>	1,3	(1,0-1,6)	0,5	(0,3-0,7)	5479

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 253. Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

LO04_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	0,7	(0,0-1,6)	0,0	(0,0-0,1)	307
	<b>Femme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	13
	<b>25 - 44</b>	1,1	(0,0-3,2)	0,0	(0,0-0,2)	95
	<b>45 - 64</b>	0,5	(0,0-1,5)	0,0	(0,0-0,1)	181
	<b>65 +</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	0,8	(0,0-2,5)	0,0	(0,0-0,0)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	0,7	(0,0-2,2)	0,0	(0,0-0,0)	154
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	0,7	(0,0-2,2)	0,0	(0,0-0,0)	128
	<b>2013</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	139
	<b>2018</b>	0,5	(0,0-1,1)	0,0	(0,0-0,0)	443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 254. Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Enquête de santé 2018 - Belgique

LO05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	3,7	(2,8-4,6)	3,5	(2,7-4,5)	3461
	<b>Femme</b>	8,6	(6,8-10,4)	8,6	(6,9-10,7)	2028
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	10,6	(0,0-21,6)	9,0	(2,8-25,0)	71
	<b>25 - 44</b>	5,6	(4,2-7,1)	5,4	(4,1-7,0)	1635
	<b>45 - 64</b>	6,2	(4,7-7,7)	6,0	(4,7-7,8)	2171
	<b>65 +</b>	3,6	(2,2-5,0)	3,1	(2,1-4,6)	1612
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	9,4	(5,6-13,2)	9,8	(6,4-14,7)	480
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,6	(3,8-9,4)	6,5	(4,1-10,2)	768
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,1	(4,5-7,8)	5,4	(4,0-7,2)	1629
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,2	(2,4-4,1)	2,7	(2,0-3,7)	2485
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	2,1	(0,2-3,9)	1,9	(0,8-4,7)	522
	<b>Brabant Flamand</b>	4,0	(1,8-6,2)	3,8	(2,1-6,6)	321
	<b>Flandre Occidentale</b>	1,7	(0,1-3,3)	1,7	(0,6-4,3)	497
	<b>Flandre Orientale</b>	4,3	(2,1-6,5)	4,1	(2,4-6,8)	449
	<b>Limbourg</b>	8,5	(2,8-14,3)	9,1	(4,6-17,2)	189
	<b>Bruxelles</b>	7,0	(5,5-8,4)	5,6	(4,4-7,0)	1548
	<b>Brabant Wallon</b>	4,3	(0,6-7,9)	4,2	(1,8-9,4)	160
	<b>Hainaut</b>	8,4	(5,2-11,7)	7,4	(5,1-10,7)	539
	<b>Liège</b>	9,6	(5,9-13,2)	8,6	(5,7-12,6)	351
	<b>Luxembourg</b>	4,9	(1,9-7,9)	4,8	(2,6-8,9)	245
	<b>Namur</b>	4,2	(1,3-7,1)	4,0	(2,0-8,1)	225
	<b>Communauté Germanophone</b>	2,5	(0,8-4,1)	2,4	(1,2-4,6)	443
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	6,4	(5,5-7,3)	6,2	(5,3-7,3)	4885
	<b>2018</b>	5,3	(4,4-6,2)	5,1	(4,3-6,0)	5489

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 255. Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

LO05_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,4	(0,2-2,6)	0,9	(0,3-2,8)	307
	<b>Femme</b>	5,2	(0,2-10,2)	3,5	(1,5-8,2)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	24,6	(0,0-60,5)	22,0	(3,2-70,6)	13
	<b>25 - 44</b>	6,0	(0,2-11,9)	5,5	(2,5-11,8)	95
	<b>45 - 64</b>	1,1	(0,0-2,3)	1,1	(0,3-3,3)	181
	<b>65 +</b>	0,5	(0,0-1,5)	0,4	(0,0-3,4)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	1,3	(0,0-3,2)	1,0	(0,1-6,5)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,7	(0,0-7,8)	2,1	(0,7-6,4)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,9	(0,0-6,0)	1,8	(0,6-5,8)	154
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	3,2	(0,0-7,3)	3,3	(0,8-11,8)	139
	<b>2018</b>	2,5	(0,8-4,1)	2,1	(1,2-3,8)	443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 256. Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Belgique

LO_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	2,8	(2,1-3,4)	2,6	(2,0-3,3)	3464
	<b>Femme</b>	6,8	(5,3-8,3)	6,8	(5,4-8,5)	2028
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	2,9	(0,0-6,5)	2,4	(0,7-7,9)	72
	<b>25 - 44</b>	5,2	(3,7-6,6)	4,9	(3,7-6,4)	1637
	<b>45 - 64</b>	4,4	(3,3-5,4)	4,2	(3,2-5,4)	2171
	<b>65 +</b>	2,7	(1,6-3,9)	2,3	(1,6-3,5)	1612
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,2	(4,0-10,3)	7,5	(4,6-11,9)	480
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,1	(2,9-7,3)	5,0	(3,3-7,7)	769
	<b>Secondaire supérieur</b>	3,8	(2,6-5,1)	3,3	(2,4-4,5)	1629
	<b>Enseignement supérieur</b>	3,4	(2,6-4,3)	2,8	(2,1-3,8)	2487
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	4,5	(2,2-6,8)	4,2	(2,5-7,0)	522
	<b>Brabant Flamand</b>	3,7	(1,3-6,0)	3,4	(1,7-6,4)	321
	<b>Flandre Occidentale</b>	2,1	(0,8-3,3)	2,1	(1,1-3,7)	497
	<b>Flandre Orientale</b>	4,2	(2,3-6,1)	3,9	(2,4-6,1)	449
	<b>Limbourg</b>	1,7	(0,2-3,2)	1,8	(0,7-4,3)	189
	<b>Bruxelles</b>	6,9	(5,5-8,2)	5,4	(4,2-6,8)	1550
	<b>Brabant Wallon</b>	4,3	(1,2-7,5)	4,2	(2,0-8,7)	160
	<b>Hainaut</b>	4,6	(2,5-6,7)	3,9	(2,5-6,1)	539
	<b>Liège</b>	3,8	(1,6-5,9)	3,3	(1,8-5,8)	351
	<b>Luxembourg</b>	3,0	(0,9-5,1)	3,0	(1,5-5,9)	246
	<b>Namur</b>	3,4	(1,0-5,8)	3,3	(1,6-6,6)	225
	<b>Communauté Germanophone</b>	1,7	(0,3-3,0)	1,6	(0,7-3,6)	443
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	5,4	(4,6-6,1)	5,0	(4,3-5,9)	4887
	<b>2018</b>	4,1	(3,4-4,8)	3,8	(3,2-4,5)	5492

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 257. Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

<b>LO_1</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	1,0	(0,0-2,2)	0,7	(0,2-2,8)	307
	<b>Femme</b>	3,5	(0,0-7,2)	2,9	(1,1-7,6)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	13
	<b>25 - 44</b>	2,3	(0,0-5,7)	2,0	(0,3-11,4)	95
	<b>45 - 64</b>	1,9	(0,0-4,2)	1,9	(0,7-5,4)	181
	<b>65 +</b>	1,0	(0,0-2,4)	0,8	(0,2-3,8)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	0,9	(0,0-2,6)	0,5	(0,0-5,3)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	2,5	(0,0-5,6)	1,8	(0,6-5,3)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	2,5	(0,0-5,5)	2,0	(0,6-7,0)	154
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	3,0	(0,0-7,1)	2,4	(0,6-8,6)	139
	<b>2018</b>	1,7	(0,3-3,0)	1,3	(0,5-3,1)	443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 258. Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Belgique

LO_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,9	(5,8-8,0)	6,5	(5,5-7,6)	3456
	<b>Femme</b>	14,1	(11,9-16,3)	14,1	(12,0-16,6)	2017
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	13,5	(2,1-25,0)	11,8	(4,6-27,1)	71
	<b>25 - 44</b>	11,9	(9,9-13,9)	11,6	(9,8-13,8)	1629
	<b>45 - 64</b>	10,1	(8,3-11,8)	10,0	(8,3-11,9)	2164
	<b>65 +</b>	5,6	(3,9-7,3)	5,0	(3,7-6,7)	1609
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	15,3	(10,9-19,7)	17,4	(12,9-23,1)	478
	<b>Secondaire inférieur</b>	10,9	(7,6-14,3)	11,4	(8,3-15,5)	766
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,9	(8,0-11,9)	8,7	(7,0-10,8)	1624
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,9	(5,7-8,1)	5,7	(4,6-7,0)	2478
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,0	(4,0-9,9)	6,6	(4,3-10,1)	522
	<b>Brabant Flamand</b>	7,9	(4,6-11,2)	7,5	(4,8-11,5)	319
	<b>Flandre Occidentale</b>	4,2	(2,1-6,3)	4,3	(2,6-7,0)	493
	<b>Flandre Orientale</b>	7,9	(5,1-10,7)	7,5	(5,2-10,7)	447
	<b>Limbourg</b>	11,4	(5,3-17,4)	12,2	(7,0-20,4)	189
	<b>Bruxelles</b>	17,7	(15,6-19,8)	14,6	(12,6-16,8)	1543
	<b>Brabant Wallon</b>	8,2	(3,6-12,8)	8,2	(4,7-14,0)	160
	<b>Hainaut</b>	11,0	(7,6-14,5)	9,9	(7,2-13,3)	538
	<b>Liège</b>	10,4	(6,7-14,2)	9,4	(6,5-13,5)	350
	<b>Luxembourg</b>	7,2	(3,7-10,7)	7,2	(4,4-11,6)	244
	<b>Namur</b>	5,7	(2,4-9,0)	5,6	(3,1-10,0)	225
	<b>Communauté Germanophone</b>	4,3	(2,2-6,5)	4,2	(2,5-6,9)	443
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	11,3	(10,2-12,5)	10,9	(9,7-12,2)	4859
	<b>2018</b>	9,3	(8,3-10,3)	8,8	(7,8-9,9)	5473

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 259. Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

<b>LO_2</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	2,8	(1,0-4,7)	2,3	(1,1-4,7)	307
	<b>Femme</b>	8,2	(2,2-14,1)	7,2	(3,5-14,6)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	24,6	(0,0-60,5)	22,6	(3,8-68,5)	13
	<b>25 - 44</b>	8,7	(1,9-15,5)	8,4	(3,9-17,3)	95
	<b>45 - 64</b>	3,2	(0,5-5,8)	3,2	(1,4-7,1)	181
	<b>65 +</b>	1,5	(0,0-3,2)	1,3	(0,4-4,3)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	0,0	(0,0-0,0)	0,0	(0,0-0,0)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	2,1	(0,0-4,7)	1,9	(0,5-7,5)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,4	(1,3-11,6)	5,2	(2,4-11,2)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,7	(1,3-10,1)	5,1	(2,4-10,4)	154
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	4,1	(0,0-8,5)	4,5	(1,4-13,3)	139
	<b>2018</b>	4,3	(2,2-6,5)	4,0	(2,3-6,6)	443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 260. Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 - Belgique**

HE03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	15,1	(13,5-16,7)	14,6	(13,0-16,2)	3465
	<b>Femme</b>	17,3	(15,1-19,6)	17,5	(15,2-19,9)	2029
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	36,9	(20,5-53,3)	36,4	(23,0-52,3)	72
	<b>25 - 44</b>	15,7	(13,3-18,0)	15,7	(13,5-18,3)	1637
	<b>45 - 64</b>	19,6	(17,4-21,8)	19,7	(17,6-22,1)	2172
	<b>65 +</b>	10,6	(8,5-12,7)	10,5	(8,6-12,7)	1613
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	22,3	(16,7-27,9)	26,7	(20,7-33,7)	480
	<b>Secondaire inférieur</b>	23,6	(19,6-27,5)	25,6	(21,5-30,2)	769
	<b>Secondaire supérieur</b>	20,0	(17,5-22,5)	18,7	(16,4-21,3)	1629
	<b>Enseignement supérieur</b>	8,8	(7,4-10,3)	7,9	(6,5-9,5)	2489
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	12,4	(8,9-15,8)	12,1	(9,0-16,1)	522
	<b>Brabant Flamand</b>	11,1	(7,2-15,1)	11,0	(7,6-15,6)	321
	<b>Flandre Occidentale</b>	10,8	(7,7-13,9)	11,1	(8,3-14,7)	497
	<b>Flandre Orientale</b>	13,9	(10,1-17,7)	13,7	(10,4-17,8)	449
	<b>Limbourg</b>	10,4	(5,4-15,3)	10,6	(6,6-16,8)	189
	<b>Bruxelles</b>	22,0	(19,5-24,5)	20,7	(18,3-23,3)	1552
	<b>Brabant Wallon</b>	18,5	(11,7-25,2)	18,4	(12,6-26,0)	160
	<b>Hainaut</b>	19,1	(15,2-23,0)	18,4	(14,9-22,6)	539
	<b>Liège</b>	23,5	(18,0-29,0)	22,9	(17,9-28,9)	351
	<b>Luxembourg</b>	20,5	(14,5-26,5)	20,1	(15,0-26,5)	246
	<b>Namur</b>	13,3	(8,5-18,1)	13,2	(9,1-18,8)	225
	<b>Communauté Germanophone</b>	16,2	(12,0-20,4)	15,8	(12,0-20,3)	443
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	30,8	(29,2-32,5)	29,8	(28,2-31,5)	6142
	<b>2008</b>	26,8	(25,1-28,4)	25,8	(24,1-27,6)	5294
	<b>2013</b>	23,1	(21,5-24,7)	22,3	(20,8-23,9)	4890
	<b>2018</b>	15,9	(14,6-17,2)	15,2	(14,0-16,6)	5494

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 261. Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE03_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	14,1	(9,2-18,9)	13,2	(9,3-18,5)	307
	<b>Femme</b>	21,7	(13,3-30,2)	22,0	(14,6-31,7)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	47,1	(11,3-83,0)	46,8	(18,1-77,8)	13
	<b>25 - 44</b>	15,4	(7,9-22,9)	15,7	(9,6-24,6)	95
	<b>45 - 64</b>	19,2	(11,4-27,0)	20,1	(13,2-29,5)	181
	<b>65 +</b>	11,3	(6,0-16,6)	10,9	(6,5-17,5)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	13,1	(4,0-22,2)	16,2	(7,3-32,3)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	29,1	(16,0-42,2)	28,9	(17,7-43,5)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	17,9	(9,6-26,2)	16,8	(10,2-26,4)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	10,3	(4,3-16,2)	9,7	(5,1-17,7)	154
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	31,9	(22,2-41,6)	33,5	(24,2-44,3)	126
	<b>2008</b>	25,0	(14,3-35,6)	26,9	(17,3-39,2)	115
	<b>2013</b>	22,8	(14,1-31,5)	23,8	(15,8-34,3)	139
	<b>2018</b>	16,2	(12,0-20,4)	16,1	(12,3-20,8)	443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 262. Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 – Belgique**

HE04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	73,4	(71,4-75,4)	73,5	(71,4-75,5)	3465
	<b>Femme</b>	74,2	(71,5-76,8)	74,7	(72,0-77,2)	2028
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	60,9	(46,7-75,1)	60,8	(44,7-74,8)	72
	<b>25 - 44</b>	79,4	(76,6-82,3)	79,5	(76,5-82,2)	1637
	<b>45 - 64</b>	72,7	(70,1-75,2)	72,7	(70,1-75,2)	2171
	<b>65 +</b>	69,7	(66,7-72,7)	69,6	(66,5-72,5)	1613
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	65,8	(60,0-71,6)	66,9	(60,6-72,6)	480
	<b>Secondaire inférieur</b>	62,0	(57,5-66,6)	63,0	(58,2-67,6)	768
	<b>Secondaire supérieur</b>	69,8	(66,7-72,8)	70,0	(66,8-73,0)	1629
	<b>Enseignement supérieur</b>	82,4	(80,4-84,3)	82,2	(80,2-84,2)	2489
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	78,1	(74,0-82,3)	78,4	(74,0-82,3)	522
	<b>Brabant Flamand</b>	78,1	(72,4-83,8)	78,5	(72,5-83,5)	321
	<b>Flandre Occidentale</b>	83,5	(79,7-87,2)	84,1	(80,2-87,4)	497
	<b>Flandre Orientale</b>	70,7	(65,8-75,7)	70,9	(65,8-75,6)	449
	<b>Limbourg</b>	57,5	(49,0-65,9)	58,6	(50,1-66,6)	189
	<b>Bruxelles</b>	74,2	(71,5-76,8)	73,2	(70,4-75,9)	1552
	<b>Brabant Wallon</b>	76,7	(69,2-84,2)	77,6	(69,6-84,0)	160
	<b>Hainaut</b>	72,8	(68,3-77,4)	73,0	(68,2-77,3)	539
	<b>Liège</b>	67,9	(61,8-74,1)	68,0	(61,4-73,9)	350
	<b>Luxembourg</b>	67,0	(60,0-74,1)	67,6	(60,2-74,2)	246
	<b>Namur</b>	68,0	(61,0-75,0)	68,8	(61,5-75,2)	225
	<b>Communauté Germanophone</b>	69,0	(63,9-74,1)	69,8	(64,5-74,6)	443
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	40,2	(38,5-42,0)	39,3	(37,5-41,0)	5918
	<b>2008</b>	62,4	(60,6-64,2)	62,1	(60,3-63,9)	5219
	<b>2013</b>	66,6	(64,7-68,4)	66,5	(64,6-68,3)	4888
	<b>2018</b>	73,7	(72,1-75,3)	73,9	(72,2-75,5)	5493

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 263. Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

HE04_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	70,6	(64,7-76,6)	70,7	(64,3-76,3)	307
	<b>Femme</b>	65,0	(54,9-75,0)	65,7	(55,3-74,8)	136
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	69,2	(35,8-100,0)	69,4	(36,9-89,8)	13
	<b>25 - 44</b>	72,5	(62,2-82,8)	72,2	(61,0-81,2)	95
	<b>45 - 64</b>	70,3	(62,0-78,5)	69,7	(60,6-77,4)	181
	<b>65 +</b>	64,5	(55,9-73,1)	64,6	(55,7-72,6)	154
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	63,7	(48,2-79,1)	67,1	(49,4-81,0)	54
	<b>Secondaire inférieur</b>	67,0	(54,9-79,1)	67,4	(54,5-78,2)	82
	<b>Secondaire supérieur</b>	71,5	(62,2-80,8)	70,6	(60,3-79,1)	119
	<b>Enseignement supérieur</b>	73,1	(64,8-81,3)	71,4	(62,0-79,3)	154
<b>ANNEE</b>	<b>2004</b>	33,1	(22,5-43,8)	32,5	(22,9-43,9)	123
	<b>2008</b>	37,6	(26,1-49,1)	37,6	(26,6-50,1)	115
	<b>2013</b>	57,0	(46,5-67,4)	57,6	(47,0-67,5)	139
	<b>2018</b>	69,0	(63,9-74,1)	69,5	(64,0-74,5)	443

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 264. Distribution des ménages qui imposent des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur selon le type de restriction, Enquête de santé 2018 - Belgique

HE05_1		Interdiction totale	Interdit excepté dans certaines pièces	Interdit en présence de jeunes enfants	Autres restrictions	N
SEXE	Homme	94,8	4,2	0,8	0,2	2535
	Femme	92,2	6,3	1,5	0,0	1528
GROUPE D'AGE	15 - 24	85,9	13,7	0,4	0,0	46
	25 - 44	93,7	5,0	0,9	0,4	1308
	45 - 64	92,5	6,5	0,9	0,0	1587
	65 +	96,3	2,4	1,2	0,0	1122
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	92,7	7,1	0,2	0,0	321
	Secondaire inférieur	92,6	5,8	1,6	0,0	472
	Secondaire supérieur	93,0	5,8	0,8	0,4	1159
	Enseignement supérieur	95,2	3,6	1,1	0,0	2027
PROVINCE	Anvers	94,1	5,1	0,8	0,0	410
	Brabant Flamand	97,0	1,3	0,7	0,9	250
	Flandre Occidentale	95,6	3,7	0,8	0,0	412
	Flandre Orientale	94,2	4,3	1,2	0,3	315
	Limbourg	95,2	4,8	0,0	0,0	106
	Bruxelles	92,4	6,7	0,8	0,1	1183
	Brabant Wallon	84,7	15,3	0,0	0,0	127
	Hainaut	95,7	3,2	1,1	0,0	398
	Liège	88,6	8,8	2,5	0,0	227
	Luxembourg	93,0	6,8	0,1	0,0	167
	Namur	96,8	2,0	1,2	0,0	153
Communauté Germanophone	93,9	5,5	0,6	0,0	315	
ANNEE	2004	79,0	18,0	1,8	1,2	2332
	2008	82,3	13,7	2,9	1,1	3423
	2013	89,2	8,3	1,9	0,6	3309
	2018	93,9	4,9	1,0	0,1	4063

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

Tableau B 265. Distribution des ménages qui imposent des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur selon le type de restriction, Enquête de santé 2018 - Communauté germanophone

HE05_1		Interdiction totale	Interdit excepté dans certaines pièces	Interdit en présence de jeunes enfants	Autres restrictions	N
SEXE	Homme	94,0	5,2	0,8	0,0	218
	Femme	93,6	6,4	0,0	0,0	97
GROUPE D'AGE	15 - 24	58,5	41,5	0,0	0,0	10
	25 - 44	92,0	8,0	0,0	0,0	70
	45 - 64	93,4	5,3	1,3	0,0	133
	65 +	98,2	1,8	0,0	0,0	102
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	100,0	0,0	0,0	0,0	37
	Secondaire inférieur	86,4	13,6	0,0	0,0	56
	Secondaire supérieur	90,4	7,5	2,1	0,0	86
	Enseignement supérieur	98,1	1,9	0,0	0,0	115
ANNEE	2004	55,5	44,5	0,0	0,0	38
	2008	75,8	18,7	5,5	0,0	47
	2013	82,7	15,5	1,2	0,7	79
	2018	93,9	5,5	0,6	0,0	315

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

## 2. Accidents

Les accidents constituent un problème majeur de santé publique. En plus des décès qu'ils provoquent, il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent de blessures graves, souvent avec des conséquences sanitaires de grande envergure. L'enquête de santé 2018 s'intéresse aux accidents ayant requis des soins médicaux et portant sur trois types d'accidents dans la population générale : les accidents de la circulation, les accidents domestiques et les accidents ayant eu lieu pendant les loisirs.

En Communauté Germanophone en 2018, 9,1% de la population déclare avoir été blessée au cours des 12 mois précédant l'enquête en raison d'un accident ayant requis des soins médicaux.

Il n'y a pas de différence significative selon le sexe dans la proportion de la population qui déclare avoir été blessée au cours des 12 mois précédant l'enquête en raison d'un accident ayant requis des soins médicaux, par contre, cette proportion est plus élevée chez les personnes âgées de 0 à 24 ans (12,7%).

Il n'y a pas de différence significative (après ajustement pour l'âge et le sexe) à ce sujet en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui ont été blessé dans un accident ayant requis des soins médicaux :

- n'est pas différent de celui observé dans les provinces belges ;
- est resté stable par rapport à 2013 (7,1%).

**Tableau B 266. Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident ayant requis des soins médicaux au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

<b>AI_4</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	7,4	(6,4-8,3)	7,3	(6,4-8,3)	5588
	<b>Femme</b>	6,7	(5,9-7,6)	6,7	(5,9-7,6)	6023
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	7,9	(6,6-9,2)	7,9	(6,7-9,3)	2917
	<b>25 - 44</b>	6,1	(4,9-7,3)	6,0	(5,0-7,4)	2916
	<b>45 - 64</b>	7,0	(5,8-8,3)	7,0	(5,9-8,4)	3395
	<b>65 +</b>	7,1	(5,8-8,5)	7,1	(5,9-8,6)	2383
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	6,5	(4,1-8,9)	6,3	(4,3-9,1)	811
	<b>Secondaire inférieur</b>	5,6	(4,1-7,2)	5,6	(4,2-7,3)	1434
	<b>Secondaire supérieur</b>	6,6	(5,3-7,8)	6,5	(5,4-7,9)	3402
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,8	(6,8-8,7)	7,8	(6,8-8,8)	5755
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	7,9	(6,1-9,8)	7,9	(6,2-9,9)	1141
	<b>Brabant Flamand</b>	5,5	(3,6-7,5)	5,5	(3,9-7,7)	708
	<b>Flandre Occidentale</b>	6,9	(5,2-8,6)	6,9	(5,4-8,7)	1075
	<b>Flandre Orientale</b>	8,9	(6,5-11,2)	8,8	(6,7-11,4)	947
	<b>Limbourg</b>	6,7	(3,9-9,5)	6,7	(4,4-10,0)	425
	<b>Bruxelles</b>	6,2	(5,2-7,3)	6,2	(5,3-7,4)	3099
	<b>Brabant Wallon</b>	7,3	(3,7-10,8)	7,2	(4,4-11,5)	361
	<b>Hainaut</b>	5,0	(3,2-6,7)	4,9	(3,4-7,0)	1119
	<b>Liège</b>	8,9	(6,3-11,5)	8,8	(6,6-11,8)	704
	<b>Luxembourg</b>	9,4	(6,2-12,6)	9,3	(6,6-13,0)	594
	<b>Namur</b>	4,6	(2,5-6,7)	4,5	(2,9-7,1)	510
	<b>Communauté Germanophone</b>	9,1	(6,8-11,4)	9,0	(7,0-11,6)	928
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	5,6	(4,9-6,2)	5,6	(5,0-6,2)	10828
	<b>2018</b>	7,1	(6,4-7,7)	7,0	(6,4-7,7)	11611

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 267. Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident ayant requis des soins médicaux au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

AI_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	9,1	(5,7-12,4)	8,8	(5,9-12,8)	456
	<b>Femme</b>	9,1	(6,2-12,0)	9,0	(6,6-12,2)	472
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>0 - 24</b>	12,7	(7,4-17,9)	12,7	(8,3-18,9)	216
	<b>25 - 44</b>	9,2	(5,0-13,4)	9,2	(5,8-14,3)	185
	<b>45 - 64</b>	7,2	(3,0-11,5)	7,2	(4,0-12,7)	296
	<b>65 +</b>	6,7	(3,0-10,3)	6,7	(3,8-11,4)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	3,8	(0,0-8,7)	4,7	(1,3-15,1)	81
	<b>Secondaire inférieur</b>	11,5	(3,4-19,6)	12,9	(6,1-25,3)	146
	<b>Secondaire supérieur</b>	11,5	(6,6-16,3)	10,9	(7,1-16,4)	255
	<b>Enseignement supérieur</b>	8,5	(5,3-11,6)	7,7	(5,2-11,1)	390
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	7,1	(3,8-10,4)	6,7	(4,2-10,6)	306
	<b>2018</b>	9,1	(6,8-11,4)	8,8	(6,7-11,4)	928

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

### 3. Violence

L'Organisation mondiale de la santé définit la violence comme « l'utilisation intentionnelle de la force ou du pouvoir, sous la forme d'une menace ou d'un acte, et ce, contre soi-même, autrui, un groupe ou une communauté, et qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une blessure, un traumatisme ou la mort ». Le module sur la violence de l'enquête de santé est centré sur la violence dite 'interpersonnelle'. Il est nécessaire de faire la lumière sur les problèmes de violence car ils ont un impact important en santé publique.

En Communauté Germanophone en 2018, 5,1% de la population âgée de 15 ans et plus a été victime de violence (verbale, psychologique, physique ou sexuelle, ou vol) dans les 12 mois qui ont précédé l'enquête

Il n'y a pas de différence significative à ce sujet entre les hommes et les femmes, par contre le pourcentage de personnes ayant été victime de violence est plus élevé chez les 15-24 ans (13,6%).

Il n'y a pas de différence significative (après ajustement pour l'âge et le sexe) à ce sujet en fonction du niveau d'éducation.

Le pourcentage de personnes en Communauté Germanophone qui ont été victime de violence (verbale, psychologique, physique ou sexuelle, ou vol) :

- est significativement moins élevé que les taux dans les provinces de Flandre Orientale (11,1%), Bruxelles (13,1%), et le reste de Liège (10,2%) ;
- est resté stable par rapport aux enquêtes précédentes.

**Tableau B 268. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant été victime de violence (psychologique, physique ou sexuelle, ou vol) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique**

VI01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,9	(7,6-10,1)	8,0	(6,9-9,3)	3682
	<b>Femme</b>	10,5	(9,1-11,8)	9,8	(8,6-11,1)	4046
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	14,9	(11,3-18,6)	15,0	(11,7-19,0)	715
	<b>25 - 44</b>	12,1	(10,1-14,0)	12,0	(10,2-14,0)	2298
	<b>45 - 64</b>	9,6	(7,9-11,2)	9,5	(8,0-11,3)	2829
	<b>65 +</b>	3,8	(2,9-4,7)	3,7	(2,9-4,8)	1886
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	5,2	(2,7-7,8)	6,6	(4,0-10,6)	439
	<b>Secondaire inférieur</b>	6,1	(4,2-8,0)	6,8	(5,0-9,3)	926
	<b>Secondaire supérieur</b>	9,7	(7,9-11,5)	8,9	(7,4-10,7)	2303
	<b>Enseignement supérieur</b>	11,0	(9,5-12,5)	9,6	(8,3-11,0)	3916
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	8,7	(6,3-11,2)	7,9	(5,9-10,5)	820
	<b>Brabant Flamand</b>	10,3	(6,7-13,9)	9,3	(6,5-13,3)	493
	<b>Flandre Occidentale</b>	8,6	(6,0-11,2)	8,4	(6,2-11,3)	820
	<b>Flandre Orientale</b>	11,1	(7,9-14,4)	10,1	(7,6-13,4)	699
	<b>Limbourg</b>	9,6	(5,0-14,2)	9,2	(5,7-14,6)	288
	<b>Bruxelles</b>	13,1	(11,2-15,0)	11,5	(9,8-13,5)	1768
	<b>Brabant Wallon</b>	8,8	(4,3-13,2)	7,8	(4,6-13,0)	254
	<b>Hainaut</b>	9,2	(6,5-11,9)	8,2	(6,1-11,1)	785
	<b>Liège</b>	10,2	(6,8-13,6)	9,4	(6,7-13,1)	470
	<b>Luxembourg</b>	6,9	(3,5-10,2)	6,2	(3,8-10,1)	327
	<b>Namur</b>	4,9	(2,1-7,7)	4,5	(2,5-7,9)	311
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,1	(3,3-6,9)	4,6	(3,2-6,5)	693
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	11,1	(10,0-12,2)	10,3	(9,3-11,3)	7219
	<b>2013</b>	10,2	(9,1-11,2)	9,6	(8,6-10,6)	6235
	<b>2018</b>	9,7	(8,7-10,7)	9,1	(8,3-10,1)	7728

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 269. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant été victime de violence (psychologique, physique ou sexuelle, ou vol) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

VI01_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	4,9	(2,2-7,5)	4,0	(2,2-7,3)	345
	<b>Femme</b>	5,4	(2,9-7,9)	4,7	(3,0-7,3)	348
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	13,6	(5,0-22,3)	13,7	(7,2-24,4)	82
	<b>25 - 44</b>	5,5	(1,7-9,3)	5,5	(2,7-10,9)	159
	<b>45 - 64</b>	3,1	(1,2-5,1)	3,1	(1,7-5,7)	275
	<b>65 +</b>	2,5	(0,2-4,8)	2,5	(1,0-6,1)	177
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	4,5	(0,0-9,4)	5,4	(1,7-15,3)	60
	<b>Secondaire inférieur</b>	2,6	(0,0-6,8)	3,0	(0,6-14,5)	112
	<b>Secondaire supérieur</b>	4,7	(1,7-7,8)	3,7	(1,7-7,6)	198
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,2	(3,9-10,6)	5,8	(3,5-9,6)	278
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	5,6	(1,7-9,6)	4,7	(2,3-9,2)	168
	<b>2013</b>	10,3	(5,2-15,4)	8,9	(5,2-14,9)	209
	<b>2018</b>	5,1	(3,3-6,9)	4,3	(2,9-6,3)	693

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 4. Santé sociale

Cette section traite d'une troisième dimension de la "santé", à savoir la santé sociale. Celle-ci est identifiée par trois indicateurs : la satisfaction à l'égard des relations sociales, le nombre de contacts sociaux et la qualité perçue du soutien social.

### 4.1. INSATISFACTION VIS-À-VIS DES CONTACTS SOCIAUX

Au sein de la Communauté Germanophone, 5,6% de la population (de 15 ans et plus), se dit insatisfaite de ses contacts sociaux. Ce pourcentage est inférieur par rapport au résultat national (8,4%). Une comparaison avec les provinces indique que le pourcentage d'insatisfaction en matière de contacts sociaux est identique à celui observé au Luxembourg (5,6%) et moins élevé par rapport aux résultats dans les autres provinces (pourcentages variant entre 6,3% et 10,7%). Cependant, les différences entre les provinces ne sont pas statistiquement significatives après ajustement pour l'âge et le sexe.

Tout comme au niveau national, le pourcentage des personnes qui sont insatisfaites de leurs contacts sociaux dans la Communauté Germanophone est resté stable en comparaison avec les résultats de l'enquête de 2013 (7,1%). Il n'y a pas non plus de différence significative entre les hommes (6,8%) et les femmes (4,5%) tout comme en Belgique. En outre, les jeunes et les jeunes adultes de 15 à 44 ans de la Communauté sont les principaux insatisfaits vis-à-vis de leurs contacts sociaux (9%) tandis que les personnes de 45-64 ans sont les moins insatisfaits (3,1%). Ces différences sont statistiquement significatives après ajustement pour le sexe. Un résultat qui contraste avec celui observé au niveau national où ce sont alors plutôt les jeunes de 15 à 24 ans et les personnes de 65 ans et plus qui sont les moins insatisfaits. Contrairement au résultat national, le pourcentage de personnes insatisfaites de leurs relations sociales ne varie pas en fonction du niveau d'éducation.

### 4.2. CONTACTS SOCIAUX PEU FRÉQUENTS (MOINS D'UNE FOIS PAR SEMAINE)

Un peu moins de 9% des habitants de la Communauté Germanophone déclarent avoir moins d'un contact social par semaine. Ce pourcentage est inférieur au pourcentage national (12,1%) et les chiffres provinciaux montrent également que ce pourcentage est inférieur à ceux constatés dans toutes les provinces (9,1%-14,2%). Toutefois, ces différences provinciales ne sont pas statistiquement significatives après ajustement pour l'âge et le sexe.

Un certain nombre de tendances sont similaires aux tendances nationales : le pourcentage de personnes déclarant moins d'un contact social par semaine est resté stable par rapport à 2013 (10,8%) dans la Communauté Germanophone ; plus d'hommes (10,4%) que de femmes (6,8%) rapportent avoir des contacts sociaux moins d'une fois par semaine (différence significative après ajustement pour l'âge) ; et ce pourcentage est moins élevé chez les jeunes de 15-24 ans (2,0%) que chez les personnes plus âgées (8,7%-13,1%). Contrairement aux résultats nationaux, il n'y a pas de différence liée au niveau d'éducation en Communauté Germanophone.

### 4.3. NIVEAU DU SOUTIEN SOCIAL PERÇU

Environ 10% de la population de la Communauté Germanophone estime que le niveau de soutien qu'elle reçoit de son environnement est faible, un pourcentage inférieur à celui constaté au niveau national (15,7%). Après ajustement pour l'âge et le sexe, ce pourcentage est nettement inférieur aux pourcentages observés dans le Brabant flamand (14,4%), à Bruxelles (19,5%), dans le Brabant wallon (16,4%), dans le Hainaut (21,8%), à Liège (18,9%), au Luxembourg (15,8%) et à Namur (19,3%).

Alors que le pourcentage de personnes ayant un faible niveau de soutien social est resté stable sur l'ensemble de la Belgique, en Communauté Germanophone, on observe une baisse statistiquement significative par

rapport à 2013 (16,9%). Comme au niveau national, aucune différence de sexe et d'âge ne peut être observée en ce qui concerne la qualité perçue du soutien sociale. Toutefois, comme au niveau national, on peut noter que les personnes très instruites (6,7%) sont moins susceptibles de déclarer un faible niveau de soutien social que les personnes ayant tout au plus un niveau d'éducation secondaire inférieure (pas de diplôme ou niveau primaire : 17,0% ; diplôme du secondaire inférieure : 19,7%).

Tableau B 270. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui est insatisfaite de ses contacts sociaux, Enquête de santé 2018 - Belgique

SO_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	8,3	(7,0-9,6)	8,1	(6,9-9,5)	3748
	<b>Femme</b>	8,4	(7,2-9,6)	8,2	(7,2-9,4)	4150
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	6,3	(3,5-9,2)	6,3	(4,0-9,9)	720
	<b>25 - 44</b>	10,0	(8,1-11,8)	10,0	(8,3-12,0)	2323
	<b>45 - 64</b>	8,6	(7,3-10,0)	8,6	(7,3-10,1)	2888
	<b>65 +</b>	6,8	(5,3-8,3)	6,8	(5,4-8,4)	1967
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	14,8	(10,1-19,5)	16,8	(12,1-22,8)	471
	<b>Secondaire inférieur</b>	9,7	(7,1-12,4)	10,3	(7,8-13,6)	971
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,6	(6,9-10,3)	8,3	(6,7-10,2)	2367
	<b>Enseignement supérieur</b>	7,2	(6,1-8,4)	6,7	(5,7-7,9)	3936
<b>PROVINCE</b>	<b>Anvers</b>	8,0	(5,6-10,4)	7,8	(5,8-10,5)	841
	<b>Brabant Flamand</b>	8,2	(5,4-10,9)	8,0	(5,7-11,0)	514
	<b>Flandre Occidentale</b>	7,2	(5,1-9,3)	7,1	(5,3-9,5)	822
	<b>Flandre Orientale</b>	8,0	(5,4-10,6)	7,8	(5,7-10,8)	711
	<b>Limbourg</b>	6,3	(3,5-9,1)	6,2	(3,9-9,5)	295
	<b>Bruxelles</b>	10,3	(8,7-11,9)	9,8	(8,4-11,6)	1809
	<b>Brabant Wallon</b>	8,4	(4,3-12,5)	8,4	(5,1-13,4)	258
	<b>Hainaut</b>	8,5	(5,9-11,1)	8,3	(6,1-11,1)	800
	<b>Liège</b>	10,7	(6,8-14,6)	10,5	(7,1-15,2)	480
	<b>Luxembourg</b>	5,6	(3,2-8,0)	5,4	(3,5-8,3)	333
	<b>Namur</b>	9,5	(5,6-13,5)	9,4	(6,2-14,0)	310
	<b>Communauté Germanophone</b>	5,6	(3,6-7,6)	5,5	(3,9-7,9)	725
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	6,0	(5,3-6,8)	6,0	(5,3-6,8)	7743
	<b>2001</b>	7,4	(6,6-8,2)	7,3	(6,5-8,1)	9148
	<b>2004</b>	6,9	(6,1-7,6)	6,8	(6,1-7,6)	8868
	<b>2008</b>	6,3	(5,5-7,0)	6,2	(5,5-6,9)	7341
	<b>2013</b>	8,6	(7,7-9,6)	8,5	(7,6-9,4)	6307
	<b>2018</b>	8,4	(7,5-9,3)	8,2	(7,3-9,1)	7898

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 271. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui est insatisfaite de ses contacts sociaux, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone

SO_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	6,8	(3,7-9,9)	6,3	(4,0-9,7)	363
	<b>Femme</b>	4,5	(2,0-6,9)	4,2	(2,4-7,3)	362
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	8,8	(1,4-16,3)	8,6	(3,6-19,1)	83
	<b>25 - 44</b>	9,1	(3,7-14,5)	8,9	(4,9-15,7)	162
	<b>45 - 64</b>	3,1	(1,2-5,0)	3,0	(1,6-5,6)	278
	<b>65 +</b>	3,7	(0,9-6,6)	3,7	(1,7-7,9)	202
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,6	(0,4-14,8)	8,7	(2,9-23,1)	66
	<b>Secondaire inférieur</b>	2,4	(0,0-5,1)	2,9	(1,0-8,2)	123
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,5	(3,0-12,1)	6,5	(3,7-11,3)	207
	<b>Enseignement supérieur</b>	5,0	(1,9-8,1)	4,1	(2,1-7,7)	279
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	4,0	(1,1-6,9)	3,7	(1,8-7,7)	231
	<b>2001</b>	3,3	(0,8-5,9)	3,1	(1,4-6,9)	211
	<b>2004</b>	6,0	(1,9-10,0)	5,8	(2,9-11,1)	180
	<b>2008</b>	1,4	(0,0-2,9)	1,4	(0,5-4,0)	179
	<b>2013</b>	7,1	(3,0-11,3)	7,1	(3,9-12,4)	217
	<b>2018</b>	5,6	(3,6-7,6)	5,6	(3,9-8,0)	725

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 272. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a des contacts sociaux moins souvent qu'une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique

SO_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	13,6	(12,1-15,1)	12,8	(11,5-14,3)	3750
	Femme	10,6	(9,3-11,9)	9,9	(8,7-11,3)	4162
GROUPE D'AGE	15 - 24	4,8	(3,0-6,5)	4,7	(3,2-6,8)	720
	25 - 44	13,1	(11,2-15,1)	13,1	(11,2-15,1)	2323
	45 - 64	13,4	(11,6-15,3)	13,3	(11,6-15,3)	2890
	65 +	12,1	(10,1-14,0)	12,1	(10,3-14,2)	1979
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	16,0	(11,1-20,9)	15,9	(11,3-21,7)	477
	Secondaire inférieur	14,6	(11,4-17,7)	13,8	(10,9-17,3)	973
	Secondaire supérieur	14,3	(12,2-16,4)	13,4	(11,5-15,6)	2374
	Enseignement supérieur	9,5	(8,3-10,7)	8,7	(7,6-10,0)	3935
PROVINCE	Anvers	13,0	(10,2-15,9)	12,1	(9,7-15,0)	847
	Brabant Flamand	11,5	(8,1-15,0)	10,8	(7,9-14,5)	518
	Flandre Occidentale	13,9	(10,9-17,0)	13,0	(10,3-16,1)	819
	Flandre Orientale	12,1	(8,8-15,3)	11,3	(8,6-14,8)	713
	Limbourg	14,2	(9,4-19,0)	13,2	(9,3-18,3)	297
	Bruxelles	13,7	(11,7-15,6)	12,8	(11,0-14,8)	1806
	Brabant Wallon	12,7	(7,7-17,8)	12,3	(8,1-18,2)	258
	Hainaut	9,1	(6,7-11,5)	8,6	(6,5-11,2)	803
	Liège	10,9	(7,4-14,3)	10,2	(7,3-14,0)	480
	Luxembourg	9,9	(6,1-13,6)	9,3	(6,3-13,5)	337
	Namur	11,5	(7,2-15,7)	10,8	(7,4-15,6)	312
	Communauté Germanophone	8,6	(5,9-11,3)	8,1	(5,9-11,0)	722
ANNEE	1997	8,4	(7,4-9,5)	8,2	(7,2-9,3)	7766
	2001	6,9	(6,2-7,7)	6,6	(5,9-7,4)	9193
	2004	7,1	(6,3-7,8)	6,7	(6,0-7,5)	8932
	2008	9,6	(8,7-10,6)	9,1	(8,3-10,1)	7390
	2013	13,4	(12,2-14,6)	12,6	(11,5-13,8)	6314
	2018	12,1	(11,0-13,1)	11,3	(10,4-12,4)	7912

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 273. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a des contacts sociaux moins souvent qu'une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

SO_2		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	10,4	(6,6-14,1)	9,5	(6,5-13,7)	363
	<b>Femme</b>	6,8	(3,9-9,7)	6,0	(3,8-9,4)	359
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	2,0	(0,0-4,5)	1,9	(0,5-6,8)	83
	<b>25 - 44</b>	8,7	(3,5-13,8)	8,4	(4,6-14,9)	162
	<b>45 - 64</b>	8,3	(4,2-12,4)	8,1	(4,9-13,0)	276
	<b>65 +</b>	13,1	(6,9-19,4)	13,1	(8,0-20,8)	201
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	7,6	(0,3-14,8)	5,0	(1,7-13,5)	65
	<b>Secondaire inférieur</b>	17,8	(6,1-29,6)	15,4	(7,1-30,2)	122
	<b>Secondaire supérieur</b>	8,2	(4,4-12,0)	7,8	(4,7-12,7)	207
	<b>Enseignement supérieur</b>	4,8	(1,9-7,7)	4,5	(2,5-8,0)	278
<b>ANNEE</b>	<b>1997</b>	8,5	(3,9-13,1)	8,7	(4,9-15,0)	236
	<b>2001</b>	9,3	(4,8-13,8)	8,9	(5,4-14,2)	214
	<b>2004</b>	6,4	(2,8-10,1)	6,1	(3,5-10,7)	185
	<b>2008</b>	8,8	(2,2-15,4)	8,3	(4,0-16,3)	181
	<b>2013</b>	10,8	(5,8-15,8)	10,2	(6,0-16,9)	215
	<b>2018</b>	8,6	(5,9-11,3)	8,0	(5,7-11,0)	722

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

Tableau B 274. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant niveau de soutien social qualifié de faible, Enquête de santé 2018 - Belgique

SO_4		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	15,1	(13,5-16,6)	14,9	(13,5-16,5)	3708
	Femme	16,3	(14,8-17,8)	16,0	(14,6-17,6)	4082
GROUPE D'AGE	15 - 24	11,7	(8,7-14,6)	11,7	(9,0-15,0)	711
	25 - 44	16,0	(13,8-18,3)	16,0	(13,9-18,4)	2288
	45 - 64	15,8	(13,9-17,6)	15,7	(14,0-17,6)	2864
	65 +	17,2	(14,8-19,5)	17,1	(14,9-19,6)	1927
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	22,5	(17,2-27,9)	22,7	(17,6-28,7)	465
	Secondaire inférieur	22,0	(18,5-25,5)	21,8	(18,4-25,7)	961
	Secondaire supérieur	18,1	(15,9-20,3)	17,9	(15,8-20,3)	2318
	Enseignement supérieur	11,6	(10,2-13,1)	11,4	(10,0-13,0)	3897
PROVINCE	Anvers	12,9	(10,0-15,7)	12,7	(10,1-15,8)	834
	Brabant Flamand	14,4	(10,7-18,0)	14,2	(11,0-18,2)	506
	Flandre Occidentale	13,3	(10,5-16,2)	13,0	(10,5-16,0)	824
	Flandre Orientale	11,4	(8,8-14,0)	11,3	(9,0-14,1)	703
	Limbourg	14,1	(9,3-19,0)	13,8	(9,7-19,2)	286
	Bruxelles	19,5	(17,3-21,7)	19,3	(17,2-21,6)	1781
	Brabant Wallon	16,4	(11,3-21,6)	16,4	(11,9-22,3)	251
	Hainaut	21,8	(17,6-26,0)	21,7	(17,8-26,2)	783
	Liège	18,9	(14,2-23,6)	18,6	(14,4-23,6)	477
	Luxembourg	15,8	(10,5-21,1)	15,7	(11,1-21,6)	333
	Namur	19,3	(13,6-25,1)	19,1	(14,1-25,3)	309
	Communauté Germanophone	9,8	(7,4-12,3)	9,8	(7,6-12,5)	703
ANNEE	2008	15,5	(14,3-16,7)	15,4	(14,2-16,6)	7310
	2013	17,4	(16,0-18,8)	17,1	(15,8-18,6)	6253
	2018	15,7	(14,5-16,9)	15,4	(14,3-16,6)	7790

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 275. Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant niveau de soutien social qualifié de faible, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

<b>SO_4</b>		<b>Taux brut (%)</b>	<b>IC 95% brut</b>	<b>Taux stand*</b>	<b>IC 95% stand</b>	<b>N</b>
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	9,3	(5,6-12,9)	9,2	(6,1-13,7)	348
	<b>Femme</b>	10,4	(7,0-13,8)	10,2	(7,2-14,2)	355
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	6,2	(0,5-12,0)	6,2	(2,5-14,8)	81
	<b>25 - 44</b>	9,8	(3,9-15,6)	9,7	(5,3-17,3)	156
	<b>45 - 64</b>	9,6	(6,2-13,0)	9,6	(6,7-13,6)	278
	<b>65 +</b>	12,9	(7,2-18,6)	12,8	(8,2-19,5)	188
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	17,0	(5,3-28,7)	17,3	(8,1-33,2)	62
	<b>Secondaire inférieur</b>	19,7	(11,1-28,3)	19,9	(11,9-31,4)	119
	<b>Secondaire supérieur</b>	7,0	(3,3-10,7)	7,0	(4,1-11,8)	197
	<b>Enseignement supérieur</b>	6,7	(3,5-9,9)	6,6	(4,0-10,7)	278
<b>ANNEE</b>	<b>2008</b>	7,0	(3,3-10,7)	6,7	(4,0-11,0)	179
	<b>2013</b>	16,9	(10,1-23,6)	16,3	(10,7-24,0)	214
	<b>2018</b>	9,8	(7,4-12,3)	9,3	(7,1-12,3)	703

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

## 5. Soins informels

Bien que le terme "soins informels" soit défini de différentes manières, il présente un certain nombre de caractéristiques récurrentes : 1) il s'agit d'une aide ou de soins fournis en dehors d'un cadre professionnel ; 2) cette aide ou ces soins ne sont en principe pas rémunérés financièrement ; et 3) elle/ils sont apportés à des personnes de l'entourage social immédiat de l'aidant. Dans ce rapport, nous examinons l'indicateur relatif à l'offre de soins informels, à savoir, le pourcentage de personnes qui prodiguent une aide ou des soins de façon informelle au moins une fois par semaine.

Un peu plus de 20,0% de la population (de 15 ans et plus) en Communauté Germanophone prodiguent une aide ou des soins informels hebdomadaires, un pourcentage nettement supérieur au taux national (12,2%). Les chiffres provinciaux montrent que le nombre d'aidants informels est plus élevé en Communauté Germanophone que dans les autres provinces (pourcentage variant entre 7,8% et 17,9%). Seules les différences avec le Hainaut (16,3%) et le Luxembourg (17,9%) ne sont pas statistiquement significatives après ajustement pour l'âge et le sexe.

Comme au niveau national, on constate en Communauté Germanophone une augmentation du nombre de personnes qui fournissent des soins informels hebdomadaires par rapport à l'enquête de 2013 (6,9%). Cette augmentation est cependant bien plus prononcée que celle constatée au niveau national. Il est utile de noter que la question a légèrement changé entre les deux enquêtes ; en 2018, la question incluait explicitement une référence aux soins pour des « personnes souffrant de troubles liés à l'âge », ce qui n'était pas le cas en 2013. Cela a pu avoir un impact sur les chiffres de la prévalence des soins informels.

Conformément aux résultats nationaux, les femmes de la Communauté Germanophone sont significativement plus nombreuses que les hommes à prodiguer des soins informels hebdomadaires (respectivement 25,4% et 15,4%). Le pourcentage de personnes prodiguant des soins informels est le plus élevé chez les 45-64 ans en Communauté Germanophone (30,5%), une différence significative par rapport aux 25-44 ans (12,3%) et aux 65 ans et plus (15,4%). Les résultats nationaux vont dans le même sens.

Dans la Communauté Germanophone, le nombre d'aidants informels est le plus élevé parmi les personnes ayant un diplôme du secondaire inférieur (28,3%) et le plus bas parmi les personnes sans diplôme ou ayant tout au plus un diplôme de l'école primaire (12,0%) ; les différences ne sont toutefois pas statistiquement significatives après ajustement pour l'âge et le sexe. Les résultats nationaux ont montré un effet significatif du niveau d'éducation : le nombre d'aidants informels est plus élevé parmi les personnes très instruites que parmi les personnes peu instruites.

Tableau B 276. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui prodigue une aide ou des soins à titre non-professionnel au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique

IC_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
SEXE	Homme	10,1	(8,8-11,3)	9,5	(8,3-10,8)	4671
	Femme	14,2	(12,8-15,5)	13,4	(12,1-14,9)	5077
GROUPE D'AGE	15 - 24	6,8	(4,4-9,2)	6,7	(4,7-9,6)	1057
	25 - 44	8,2	(6,6-9,7)	8,1	(6,7-9,7)	2916
	45 - 64	18,1	(16,1-20,2)	18,0	(16,0-20,2)	3394
	65 +	12,3	(10,6-14,1)	12,0	(10,3-13,8)	2381
NIVEAU D'INSTRUCTION	Primaire/sans diplôme	8,0	(5,5-10,5)	6,8	(4,9-9,4)	723
	Secondaire inférieur	9,6	(7,5-11,8)	8,2	(6,5-10,5)	1276
	Secondaire supérieur	12,6	(10,7-14,6)	11,8	(10,0-14,0)	2891
	Enseignement supérieur	13,0	(11,5-14,6)	12,4	(10,9-14,0)	4680
PROVINCE	Anvers	7,9	(6,0-9,8)	7,2	(5,6-9,1)	980
	Brabant Flamand	7,8	(5,1-10,5)	7,0	(5,0-9,9)	568
	Flandre Occidentale	13,6	(10,7-16,5)	12,4	(9,9-15,5)	933
	Flandre Orientale	13,6	(10,1-17,1)	12,6	(9,6-16,3)	790
	Limbourg	11,4	(7,5-15,3)	10,4	(7,4-14,5)	363
	Bruxelles	10,6	(9,2-12,0)	10,4	(9,0-12,0)	2513
	Brabant Wallon	12,8	(8,6-17,0)	11,9	(8,6-16,4)	313
	Hainaut	16,3	(12,6-20,0)	15,4	(12,1-19,3)	962
	Liège	14,2	(10,2-18,2)	13,2	(9,7-17,7)	600
	Luxembourg	17,9	(13,1-22,8)	17,1	(12,7-22,5)	489
	Namur	12,4	(8,5-16,3)	11,5	(8,3-15,7)	429
	Communauté Germanophone	20,6	(17,0-24,2)	19,0	(15,8-22,6)	808
ANNEE	2013	9,4	(8,5-10,3)	8,8	(7,9-9,7)	9107
	2018	12,2	(11,2-13,2)	11,4	(10,4-12,5)	9748

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

**Tableau B 277. Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui prodigue une aide ou des soins à titre non-professionnel au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone**

IC_1		Taux brut (%)	IC 95% brut	Taux stand*	IC 95% stand	N
<b>SEXE</b>	<b>Homme</b>	15,4	(10,9-19,8)	13,7	(10,2-18,2)	400
	<b>Femme</b>	25,4	(20,5-30,4)	23,8	(19,2-29,2)	408
<b>GROUPE D'AGE</b>	<b>15 - 24</b>	19,1	(9,8-28,4)	18,6	(11,0-29,7)	96
	<b>25 - 44</b>	12,3	(7,4-17,1)	11,8	(7,9-17,3)	185
	<b>45 - 64</b>	30,5	(23,8-37,2)	30,1	(23,7-37,4)	296
	<b>65 +</b>	15,4	(9,8-21,0)	14,5	(9,9-20,7)	231
<b>NIVEAU D'INSTRUCTION</b>	<b>Primaire/sans diplôme</b>	12,0	(3,2-20,7)	13,1	(6,0-26,1)	79
	<b>Secondaire inférieur</b>	28,3	(17,7-38,8)	24,9	(15,9-36,8)	140
	<b>Secondaire supérieur</b>	19,5	(12,9-26,1)	17,2	(12,0-24,0)	218
	<b>Enseignement supérieur</b>	19,0	(13,5-24,5)	17,0	(12,5-22,9)	318
<b>ANNEE</b>	<b>2013</b>	6,9	(3,0-10,9)	5,7	(3,2-10,1)	264
	<b>2018</b>	20,6	(17,0-24,2)	18,4	(15,2-22,1)	808

Source: Enquête de Santé, Belgique, 2018

\*Correction pour âge et/ou sexe sur base d'un modèle de régression logistique (Population belge de 2018 comme référence)

# LISTE DES TABLEAUX

Tableau B 1.	Pourcentage de la population (âgée de 15 ans ou plus) avec une mauvaise (très mauvaise à moyenne) santé subjective, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	8
Tableau B 2.	Pourcentage de la population (âgée de 15 ans ou plus) avec une mauvaise (très mauvaise à moyenne) santé subjective, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	9
Tableau B 3.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare souffrir d'une maladie ou d'une affection chronique, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	13
Tableau B 4.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare souffrir d'une maladie ou d'une affection chronique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	14
Tableau B 5.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec allergie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	15
Tableau B 6.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec allergie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	16
Tableau B 7.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au (bas du) dos au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	17
Tableau B 8.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au (bas du) dos au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	18
Tableau B 9.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrose (dégénérescence des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	19
Tableau B 10.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrose (dégénérescence des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	20
Tableau B 11.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au niveau de la nuque ou du cou au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	21
Tableau B 12.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec affection persistante au niveau de la nuque ou du cou au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	22
Tableau B 13.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrite rhumatoïde (inflammation des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	23
Tableau B 14.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec arthrite rhumatoïde (inflammation des articulations) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	24
Tableau B 15.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec tension artérielle élevée (hypertension) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	25
Tableau B 16.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec tension artérielle élevée (hypertension) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	26
Tableau B 17.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec hypercholestérolémie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	27
Tableau B 18.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec hypercholestérolémie au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	28
Tableau B 19.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec dépression sérieuse au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	29
Tableau B 20.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec dépression sérieuse au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	30

Tableau B 21.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec maux de tête grave (p,e, migraine) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	31
Tableau B 22.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec maux de tête grave (p,e, migraine) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	32
Tableau B 23.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec asthme au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	33
Tableau B 24.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec asthme au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	34
Tableau B 25.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec bronchite chronique, maladies pulmonaires chroniques obstructives, emphysème au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	35
Tableau B 26.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec bronchite chronique, maladies pulmonaires chroniques obstructives, emphysème au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	36
Tableau B 27.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec diabète au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	37
Tableau B 28.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec diabète au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	38
Tableau B 29.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec ostéoporose au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	39
Tableau B 30.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec ostéoporose au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	40
Tableau B 31.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles de la thyroïde au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	41
Tableau B 32.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles de la thyroïde au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	42
Tableau B 33.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles intestinaux graves au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	43
Tableau B 34.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec troubles intestinaux graves au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	44
Tableau B 35.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec cataracte au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	45
Tableau B 36.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec cataracte au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	46
Tableau B 37.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec incontinence urinaire au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	47
Tableau B 38.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec incontinence urinaire au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	48
Tableau B 39.	Pourcentage de la population masculine de 25 ans et plus avec troubles prostatiques au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	49
Tableau B 40.	Pourcentage de la population masculine de 25 ans et plus avec troubles prostatiques au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	50
Tableau B 41.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec multimorbidité**, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	51
Tableau B 42.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec multimorbidité**, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	52

Tableau B 43.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui est fragile**, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	54
Tableau B 44.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui est fragile**, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	55
Tableau B 45.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Belgique.....	57
Tableau B 46.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	58
Tableau B 47.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Belgique.....	59
Tableau B 48.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations liées à des problèmes de santé (GALI), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	60
Tableau B 49.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	61
Tableau B 50.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	62
Tableau B 51.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	63
Tableau B 52.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	64
Tableau B 53.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	65
Tableau B 54.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	66
Tableau B 55.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	67
Tableau B 56.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des restrictions motrices, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	68
Tableau B 57.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	69
Tableau B 58.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus avec des limitations fonctionnelles, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	70
Tableau B 59.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	71
Tableau B 60.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	72
Tableau B 61.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	73
Tableau B 62.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les activités élémentaires, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	74
Tableau B 63.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activités élémentaires du quotidien, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	75
Tableau B 64.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à effectuer les activités élémentaires du quotidien, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	76
Tableau B 65.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	77

Tableau B 66.	Distribution (%) de la population de 65 ans et plus selon la sévérité des incapacités dans les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	78
Tableau B 67.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	79
Tableau B 68.	Pourcentage de la population de 65 ans et plus qui a des difficultés à accomplir les tâches domestiques, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	80
Tableau B 69.	Score moyen de douleur physique mesuré par le SF-36 au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	82
Tableau B 70.	Score moyen de douleur physique mesuré par le SF-36 au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	83
Tableau B 71.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes de mobilité selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	85
Tableau B 72.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes de mobilité selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	86
Tableau B 73.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes d'autonomie selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	87
Tableau B 74.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes d'autonomie selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	88
Tableau B 75.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes pour accomplir leurs activités courantes selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	89
Tableau B 76.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des problèmes pour accomplir leurs activités courantes selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	90
Tableau B 77.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des douleurs ou de la gêne selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	91
Tableau B 78.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir des douleurs ou de la gêne selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	92
Tableau B 79.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir de l'anxiété ou de la dépression selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	93
Tableau B 80.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir de l'anxiété ou de la dépression selon le EQ-5D, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	94
Tableau B 81.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui ne déclare aucun problème de santé (état de santé 11111), Enquête de santé 2018 - Belgique .....	95
Tableau B 82.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui ne déclare aucun problème de santé (état de santé 11111), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	96
Tableau B 83.	Score EQ-5D moyen au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	97
Tableau B 84.	Score EQ-5D moyen au sein de la population de 15 ans et plus, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	98
Tableau B 85.	Pourcentage de la population active ayant rapporté une absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	100
Tableau B 86.	Pourcentage de la population active ayant rapporté une absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	101
Tableau B 87.	Nombre moyen de jours d'absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois au sein de la population active, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	102
Tableau B 88.	Nombre moyen de jours d'absence du travail pour des raisons de santé au cours des 12 derniers mois au sein de la population active, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	103

Tableau B 89.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui est en surpoids (BMI >= 25), Enquête de santé 2018 – Belgique .....	105
Tableau B 90.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui est en surpoids (BMI >= 25), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	106
Tableau B 91.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui souffre d'obésité (BMI >= 30), Enquête de santé 2018 - Belgique .....	107
Tableau B 92.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui souffre d'obésité (BMI >= 30), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	108
Tableau B 93.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	111
Tableau B 94.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	112
Tableau B 95.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée (non liées au travail) et/ou qui fait des activités qui demandent au moins un effort physique modéré au travail, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	113
Tableau B 96.	Pourcentage de la population de 18 ans et plus qui passe au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques d'intensité au moins modérée (non liées au travail) et/ou qui fait des activités qui demandent au moins un effort physique modéré au travail, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	114
Tableau B 97.	Temps moyen (minutes) que la population de 15 ans et plus passe en position assise ou couchée au cours d'une journée, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	115
Tableau B 98.	Temps moyen (minutes) que la population de 15 ans et plus passe en position assise ou couchée au cours d'une journée, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	116
Tableau B 99.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui court un risque de santé en raison du manque d'activité physique de loisirs, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	117
Tableau B 100.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui court un risque de santé en raison du manque d'activité physique de loisirs, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	118
Tableau B 101.	Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	121
Tableau B 102.	Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	122
Tableau B 103.	Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	123
Tableau B 104.	Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des légumes, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	124
Tableau B 105.	Pourcentage de la population qui consomme quotidiennement des fruits, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	125
Tableau B 106.	Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	126
Tableau B 107.	Pourcentage de la population qui souffre d'une allergie ou d'une intolérance alimentaire, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	127
Tableau B 108.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	130
Tableau B 109.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a consommé des boissons alcoolisées au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	131

Tableau B 110.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons alcoolisées, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	132
Tableau B 111.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme quotidiennement des boissons alcoolisées, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	133
Tableau B 112.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est considérée excessive (F >14, M > 21 verres par semaine), Enquête de santé 2018 - Belgique .....	134
Tableau B 113.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la consommation hebdomadaire d'alcool est considérée excessive (F >14 verres, M > 21 verres par semaine), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	135
Tableau B 114.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par occasion au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	136
Tableau B 115.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui consomme 6+ boissons alcoolisées par occasion au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	137
Tableau B 116.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Enquête de santé 2018 - Belgique .....	138
Tableau B 117.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon la fréquence du "binge drinking" (soit boire 4+ (femmes) ou 6+ (hommes) boissons alcoolisées en 2 heures), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	139
Tableau B 118.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté un usage problématique de l'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Belgique .....	140
Tableau B 119.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a présenté un usage problématique de l'alcool au cours des 12 derniers mois (CAGE, seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	141
Tableau B 120.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le comportement tabagique, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	143
Tableau B 121.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le comportement tabagique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	144
Tableau B 122.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui fume actuellement tous les jours, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	145
Tableau B 123.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui fume actuellement tous les jours, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	146
Tableau B 124.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà essayé la cigarette électronique au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	148
Tableau B 125.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà essayé la cigarette électronique au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	149
Tableau B 126.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'usage de la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	150
Tableau B 127.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'usage de la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	151
Tableau B 128.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui utilise actuellement* la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	152
Tableau B 129.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui utilise actuellement* la cigarette électronique, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	153
Tableau B 130.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	156

Tableau B 131.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a déjà consommé du cannabis au cours de son existence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	157
Tableau B 132.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	158
Tableau B 133.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	159
Tableau B 134.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	160
Tableau B 135.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans ayant présenté une consommation problématique de cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	161
Tableau B 136.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	162
Tableau B 137.	Pourcentage de la population de 15 à 64 ans qui a consommé une drogue autre que le cannabis au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	163
Tableau B 138.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir misé au moins une fois sur un jeu de hasard au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	166
Tableau B 139.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir misé au moins une fois sur un jeu de hasard au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	167
Tableau B 140.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué hors ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	168
Tableau B 141.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué hors ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	169
Tableau B 142.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué en ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	170
Tableau B 143.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir joué en ligne au moins une fois au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	171
Tableau B 144.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare jouer à des jeux d'argent et de hasard au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	172
Tableau B 145.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare jouer à des jeux d'argent et de hasard au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	173
Tableau B 146.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui dépense 40€ par mois ou plus pour des jeux d'argent et de hasard, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	174
Tableau B 147.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui dépense 40€ ou plus par mois pour des jeux d'argent et de hasard, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	175
Tableau B 148.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'importance du risque de présenter une dépendance pathologique aux jeux, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	176
Tableau B 149.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon l'importance du risque de présenter une dépendance pathologique aux jeux, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	177
Tableau B 150.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'avoir un partenaire sexuel unique fidèle et non-infecté protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	179
Tableau B 151.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'avoir un partenaire sexuel unique fidèle et non-infecté protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	180
Tableau B 152.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que l'usage d'un préservatif lors des rapports sexuels protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	181

Tableau B 153.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que l'usage d'un préservatif lors des rapports sexuels protège contre le VIH, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	182
Tableau B 154.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'une personne paraissant en bonne santé peut en fait être infectée par le VIH, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	183
Tableau B 155.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait qu'une personne paraissant en bonne santé peut en fait être infectée par le VIH, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	184
Tableau B 156.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en prenant dans ses bras ou en serrant la main d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	185
Tableau B 157.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en prenant dans ses bras ou en serrant la main d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	186
Tableau B 158.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en buvant dans le verre d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	187
Tableau B 159.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui sait que le VIH ne se transmet pas en buvant dans le verre d'une personne atteinte du sida, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	188
Tableau B 160.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a une connaissance étendue et correcte* sur le VIH/sida, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	189
Tableau B 161.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a une connaissance étendue et correcte* sur le VIH/sida, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	190
Tableau B 162.	Distribution de la population de 15 ans et plus selon le niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	192
Tableau B 163.	Distribution de la population de 15 ans et plus selon le niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Communauté germanophone.....	193
Tableau B 164.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant un faible niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	194
Tableau B 165.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant un faible niveau de littératie en santé, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	195
Tableau B 166.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir eu un test de détection du sang fécal occulte au cours des deux dernières années, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	197
Tableau B 167.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir eu un test de détection du sang fécal occulte au cours des deux dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	198
Tableau B 168.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir passé une colonoscopie au cours des dix dernières années, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	199
Tableau B 169.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare avoir passé une colonoscopie au cours des dix dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	200
Tableau B 170.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	202
Tableau B 171.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus vaccinée contre la grippe au cours des douze derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	203
Tableau B 172.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la tension artérielle a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	205

Tableau B 173.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la tension artérielle a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	206
Tableau B 174.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la cholestérolémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	207
Tableau B 175.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la cholestérolémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des 5 dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	208
Tableau B 176.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la glycémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des trois dernières années, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	209
Tableau B 177.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus dont la glycémie a été contrôlée par un professionnel de la santé au cours des trois dernières années, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	210
Tableau B 178.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	217
Tableau B 179.	Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon leur niveau de satisfaction de vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	218
Tableau B 180.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une énergie vitale optimale, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	219
Tableau B 181.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente une énergie vitale optimale, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	220
Tableau B 182.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques (score GHQ au seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Belgique .....	221
Tableau B 183.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui présente des difficultés psychologiques (score GHQ au seuil 2+), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	222
Tableau B 184.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ au GAD-7), Enquête de santé 2018 – Belgique .....	223
Tableau B 185.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble anxieux généralisé (seuil de 10+ au GAD-7), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	224
Tableau B 186.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) (PHQ-9), Enquête de santé 2018 – Belgique .....	225
Tableau B 187.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble dépressif (caractérisé ou autres) (PHQ-9), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	226
Tableau B 188.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire (seuil de 2+ au SCOFF), Enquête de santé 2018 - Belgique .....	227
Tableau B 189.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus avec un trouble du comportement alimentaire (seuil de 2+ au SCOFF), Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	228
Tableau B 190.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	229
Tableau B 191.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà eu des pensées suicidaires au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	230
Tableau B 192.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	231
Tableau B 193.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	232
Tableau B 194.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	233
		342

Tableau B 195.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a déjà tenté de se suicider au cours de sa vie, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	234
Tableau B 196.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des tranquillisants ou des somnifères au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	235
Tableau B 197.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des tranquillisants ou des somnifères au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	236
Tableau B 198.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	237
Tableau B 199.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des antidépresseurs au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	238
Tableau B 200.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	239
Tableau B 201.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a pris des médicaments psychotropes au cours des 2 dernières semaines, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	240
Tableau B 202.	Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	242
Tableau B 203.	Pourcentage de la population ayant eu un contact avec le médecin généraliste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	243
Tableau B 204.	Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	245
Tableau B 205.	Pourcentage de la population qui a consulté un médecin spécialiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	246
Tableau B 206.	Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	248
Tableau B 207.	Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) ayant eu une consultation avec un dentiste au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	249
Tableau B 208.	Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un dentiste, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	250
Tableau B 209.	Pourcentage de la population (âgée de 2 ans ou plus) n'ayant jamais eu une consultation avec un dentiste, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	251
Tableau B 210.	Pourcentage de la population qui a consulté un/e kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	254
Tableau B 211.	Pourcentage de la population qui a consulté un/e kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	255
Tableau B 212.	Pourcentage de la population qui a consulté un/e diététicien(ne) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	256
Tableau B 213.	Pourcentage de la population qui a consulté un/e diététicien(ne) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	257
Tableau B 214.	Pourcentage de la population qui a consulté un psychologue psychothérapeute ou psychiatre au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	258
Tableau B 215.	Pourcentage de la population qui a consulté un psychologue psychothérapeute ou psychiatre au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	259
Tableau B 216.	Pourcentage de la population qui a consulté un/e prestataire de thérapie non-conventionnelle au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	261
Tableau B 217.	Pourcentage de la population qui a consulté un/e prestataire de thérapie non-conventionnelle au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	262

Tableau B 218.	Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pendant au moins une nuit au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	264
Tableau B 219.	Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pendant au moins une nuit au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	265
Tableau B 220.	Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pour une hospitalisation de jour au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	266
Tableau B 221.	Pourcentage de la population qui a été admise à l'hôpital pour une hospitalisation de jour au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	267
Tableau B 222.	Pourcentage de la population qui a eu recours à des services de soins et d'aide à domicile au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	269
Tableau B 223.	Pourcentage de la population qui a eu recours à des services de soins et d'aide à domicile au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	270
Tableau B 224.	Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament prescrit, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	272
Tableau B 225.	Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament prescrit, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	273
Tableau B 226.	Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament non prescrit°, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	274
Tableau B 227.	Pourcentage de la population qui a utilisé au cours des deux dernières semaines au moins un médicament non prescrit°, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone.....	275
Tableau B 228.	Pourcentage des ménages indiquant que les dépenses de santé sont lourdes à supporter, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	277
Tableau B 229.	Pourcentage des ménages indiquant que les dépenses de santé sont lourdes à supporter, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	278
Tableau B 230.	Pourcentage des ménages qui indiquent avoir dû reporter des soins de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	279
Tableau B 231.	Pourcentage des ménages qui indiquent avoir dû reporter des soins de santé au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	280
Tableau B 232.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	283
Tableau B 233.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que la vitesse et/ou le volume du trafic posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	284
Tableau B 234.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	285
Tableau B 235.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que l'accumulation d'immondices pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	286
Tableau B 236.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	287
Tableau B 237.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le vandalisme ou l'endommagement délibéré de biens posent un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	288
Tableau B 238.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le manque d'accès à des parcs ou d'autres espaces publics verts ou récréatives pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	289

Tableau B 239.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare que le manque d'accès à des parcs ou d'autres espaces publics verts ou récréatives pose un sérieux problème dans le quartier de résidence, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	290
Tableau B 240.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence*, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	291
Tableau B 241.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui déclare qu'au moins une nuisance environnementale pose un sérieux problème dans le quartier de résidence*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	292
Tableau B 242.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par la pollution de l'air, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	293
Tableau B 243.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par la pollution de l'air, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	294
Tableau B 244.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	295
Tableau B 245.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les mauvaises odeurs venant d'industries proches ou d'autres sources, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	296
Tableau B 246.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	297
Tableau B 247.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par les vibrations dues au trafic ou aux entreprises proches, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	298
Tableau B 248.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par le bruit toutes sources confondues*, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	299
Tableau B 249.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par le bruit toutes sources confondues*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	300
Tableau B 250.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par au moins une nuisance environnementale*, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	301
Tableau B 251.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui au cours des 12 derniers mois a été gênée à domicile par au moins une nuisance environnementale*, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	302
Tableau B 252.	Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	303
Tableau B 253.	Pourcentage des ménages en situation de surpeuplement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	304
Tableau B 254.	Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	305
Tableau B 255.	Pourcentage des ménages qui n'arrivent pas à chauffer convenablement leur logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	306
Tableau B 256.	Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	307
Tableau B 257.	Pourcentage des ménages qui ont un sérieux problème d'humidité ou de moisissure dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	308
Tableau B 258.	Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	309
		345

Tableau B 259.	Pourcentage des ménages qui sont confrontés à au moins un problème dans leur logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	310
Tableau B 260.	Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	311
Tableau B 261.	Pourcentage des ménages où au moins une personne fume régulièrement à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	312
Tableau B 262.	Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	313
Tableau B 263.	Pourcentage des ménages qui imposent des restrictions quant à l'usage du tabac à l'intérieur du logement, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	314
Tableau B 264.	Distribution des ménages qui imposent des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur selon le type de restriction, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	315
Tableau B 265.	Distribution des ménages qui imposent des restrictions à l'usage du tabac à l'intérieur selon le type de restriction, Enquête de santé 2018 - Communauté germanophone .....	316
Tableau B 266.	Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident ayant requis des soins médicaux au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique.....	318
Tableau B 267.	Pourcentage de la population qui a été blessé dans un accident ayant requis des soins médicaux au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	319
Tableau B 268.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant été victime de violence (psychologique, physique ou sexuelle, ou vol) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 – Belgique .....	321
Tableau B 269.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant été victime de violence (psychologique, physique ou sexuelle, ou vol) au cours des 12 derniers mois, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	322
Tableau B 270.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui est insatisfaite de ses contacts sociaux, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	325
Tableau B 271.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui est insatisfaite de ses contacts sociaux, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	326
Tableau B 272.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a des contacts sociaux moins souvent qu'une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	327
Tableau B 273.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui a des contacts sociaux moins souvent qu'une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	328
Tableau B 274.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant niveau de soutien social qualifié de faible, Enquête de santé 2018 - Belgique .....	329
Tableau B 275.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus ayant niveau de soutien social qualifié de faible, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	330
Tableau B 276.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui prodigue une aide ou des soins à titre non-professionnel au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Belgique.....	332
Tableau B 277.	Pourcentage de la population de 15 ans et plus qui prodigue une aide ou des soins à titre non-professionnel au moins une fois par semaine, Enquête de santé 2018 - Communauté Germanophone .....	333

## CONTACT

Sabine Drieskens • T+32 2 642 50 25 • [Sabine.Drieskens@sciensano.be](mailto:Sabine.Drieskens@sciensano.be)

## POUR PLUS D'INFORMATIONS

—

Rendez-vous sur notre site  
web >[www.sciensano.be](http://www.sciensano.be) ou  
contactez-nous à l'adresse